



Амазонская низменность.

Работа выполнена
Киселёвым Георгием Сергеевичем
учеником ГОУ СОШ 604 8^Э класса
Black-corven@mail.ru


Географическое положение.



Находится на северо-востоке Южной Америки.



Климат



Исток Амазонки.

- Исток Амазонки остаётся загадкой, существуют разные мнения:
- 1. Река Апуримак, берущая свое начало в Андах у западного побережья Ю. Америки.(левая)
- 2. Река Укаяли.(задний план)
- 3. Река Апачета .



Тапир

- Тапиры — плотно сложенные звери с коренастым телом, покрытым коротким, густым, обычно бурым или черным волосом. Высота крупного самца в холке 1,2 м, длина 1,8 м, а масса до 275 кг. Морда, включая верхнюю губу, вытянута в небольшой подвижный хоботок, используемый для обрывания листьев или молодых побегов. Глаза мелкие, округлые уши торчат в стороны. Ноги короткие, передние — четырехпалые, задние — трехпалые. Каждый палец оканчивается маленьким копытцем. Хвост очень короткий, как бы обрубленный. Кормятся тапиры водными растениями и листьями лесных кустарников. Они хорошо плавают, ныряют, могут удивительно долго оставаться под водой и при опасности всегда ищут в ней спасения.



Анаконда.

- Анаконда
- (*Eunectes murinus*), змея семейства удавов. Длина обычно 6—7 (редко до 9 указания на 11 не подтверждаются), Чешуя гладкая, блестящая. Окраска сверху оливково-серая, вдоль спины два ряда больших круглых бурьх пятен. Ноздри имеют клапаны. Обитает по берегам рек, озёр и болот в Бразилии и Гвиане. Превосходно плавает и значительное время проводит в воде. Питается рыбами, молодыми аллигаторами, птицами, млекопитающими. Случаи нападения на человека редки. На время засухи зарывается во влажный ил и впадает в оцепенение. Обычно рождает детёнышей (несколько десятков), иногда откладывает яйца. Объект промысла (используются кожа, мясо, жир).



Пиранья



- Пирайя, или, точнее, пиранья - по-португальски “пират”. А в зоологии это название 12-16 видов рыб особого семейства подотряда хараксовидных (отряд карпообразных). Небольшие рыбы: самые крупные из них 30-55 сантиметров. Но бульдожьих их челюсти (нижняя выдается вперед) - словно зазубренная пасть капкана! - сплошь усажены крепкими, с глубокими корнями и столь острыми зубами, что пиранья вмиг перекусит палку толщиной в палец. Отхватит и палец. Пираньи - истинный кошмар. Там, где они водятся в большом числе, редкий человек даже в самую нестерпимую жару рискнет хотя бы по колено войти в воду. А чтобы поплыть, и думать нечего: быстро отпрепарируют до известного анатомического “экспоната”.

Паук-птицеед

- Пауки-птицееды семейство пауков, класса паукообразных типа членистоногих; некоторые представители П.-п., обитают в Южной Америке и в Восточной Африке, при укусе вводят яд, опасный для человека.



БОЙТЕСЬ
МАЛЕНЬКОЙ



РЫБКИ
CANDIRU

Кандиру

- Считается среди местных жителей наиболее страшной рыбой Амазонии, ещё более страшной, чем пиранья. Рыбка не более 15 см в длину, имеет угревидную форму и почти прозрачна.
- Кандиру — паразитирует на другой рыбе. Сомик чувствует потоки выдыхаемой другой рыбой воды и заплывает по ним в жабры. При этом он растопыривает колючие выросты и питается кровью из кровеносных сосудов в жабрах, что дало ему прозвище «Бразильский вампир». Сомик не сосёт кровь — после укуса кровь вытекает из жабр сама и за 30-145 секунд рыбка насыщается и сомик покидает рыбу-хозяина.



Леса



Гевея бразильская



Дерево семейства Молочайные, основной источник натурального каучука.

- Содержание каучука в млечном соке у этого каучукового дерева бассейна Амазонки, достигает 40—50 %. Каучук, добываемый из этого растения, составляет 90—92 % мирового производства натурального каучука.

Какао

- Родиной какао являются тропические леса Амазонки, но в настоящее время оно возделывается во всех тропических странах, лежащих между 20° северной и южной широты. Листья тонкие, вечнозелёные, продолговато-эллиптические.
- Цветы небольшие, розовато-белые, выступающие прямо из коры и крупных ветвей дерева в виде пучков. Число частей в чашечке, венчике и гинецеях в основном пятерное. Лепестки снабжены при основании вогнутыми ложкообразными расширениями, переходящими в узкую ножку, заканчивающуюся плоским, расширенным отгибом. Андроцей состоит из 3 или 4 тычинок и из 5 стаминодий (недоросших тычинок). Завязь содержит в каждом из пяти гнёзд помногу семяпочек.
- Плод крупный, ягодообразный, включает много крупных семян, расположенных в несколько рядов и окружённых мякотью. Питательная ткань в них мало развита, а семядоли складчатые. Плод напоминает крупный огурец или вытянутую дыню, полностью созревает за 4 месяца.



Виктория - регия



- Виктория - регия (лат. *Victória*) — род водных растений семейства Кувшинковые. Родина — река Амазонка (Южная Америка). Имеет огромные плавающие листья и крупные цветки. С успехом разводится в оранжереях, парках и ботанических садах.

Виктория - регия была обнаружена в 1816 году, а затем повторно в 1832 году в Южной Америке немецкими путешественниками. Название своё получила в честь английской королевы Виктории. Известны 2 вида этого рода:

Кебрачо



- Дерево, которое достигает до 20 м в высоту. Встречается в Аргентине, в Перу и в Боливии, и является очень важным растением для шаманов. Древесину жгут и вдыхают дым, или курят (растертую в порошок и перемешанную с табаком).

Население



- Индейцы
- Народы испанского и португальского происхождения
- Метисы
- Китайцы и японцы
- Негры и мулаты





Конец