

**Қазақстан аумағының
геологиялық құрлысы**

Полеозойға дейінгі жыныстар

- Ең ежелгі кезеңдерде қалыптасқан.
- Үгілу нәтижесінде таулы аудандардың пайда болуы.
- Солтүстік Тянь-Шань жоталарында, Мұғалжарда және Сарыарқадағы Ұлытау мен Көкшетауда байқалады.



Палеозой жыныстары

- Таулы аудандарда кездеседі.
- Мұғалжар, Сарыарқа, Жоңғар Алатуы, Тарбағатай және Алтай таулары осы жыныстардан тұрады.
- Оған: әктас, құмтас, қызғылт құмтас, сазды таұтатас жатады.
- Қорғасын, темір, қалайы, алтын осы жынысқа жатады.

Мезазой жыныстары

- Бір шама кездеседі.
- Маңғыстау, Қаратау жотасы, Жем үстіртінде, Іле және Торғай ойыстарында ккп тараған.

Кайнозой шөгінділері

- Қазақстанның барлық жерінде кездеседі
- Олар: палеогендік, неогендік және антропогендік болып бөлінеді.



Палеогендік шөгінділер

- Шу
- Іле
- Зайсан
- Үстірт
- Арал
- Торғай



Неогендік шөгінділер

- Қызыл түсті тас
- Тығыз құмды саздардан
- Малтасты
- Құмды қабатты саздардан
- Неогендік шөгінділер биік тау бөліктерінде кездеседі.

Антропогендік шөгінділер

A photograph of a desert landscape. In the foreground, there is a wide, flat, sandy area with some dark, rocky patches. In the middle ground, there are several prominent, eroded rock formations, including a tall, narrow spire and a smaller, more rounded one. The background shows a valley with more eroded rock walls and a distant horizon under a pale sky.

- Каспий маңы ойпаты
- Қаракұм және Торғай
- Алтай
- Жоңғар Алатауы кездеседі.



