


Мир галактик



Выполнили ученики 9 «А»
класса
Письменская Виктория,
Шебалов Владислав

Состав и строение галактик.

Наша галактика Млечный Путь

Галактики – гигантские звёздные системы – разделены в пространстве огромными расстояниями. В состав галактик входят миллиарды звёзд с планетными системами, облака межзвёздного газа. Галактики – гигантские звёздные системы – разделены в пространстве огромными расстояниями. В состав галактик входят миллиарды звёзд с планетными системами, облака межзвёздного газа, ядро.

Галактика, в которой мы живём, называется Млечный Путь. Она относится к классу спиральных систем. Галактику населяют около 200 млрд. звёзд, а также многочисленные газовые облака. Большая часть звёзд и практически всё межзвёздное вещество сосредоточены в диске диаметром более 100 тыс. световых лет и толщиной около 1000 световых лет. В центре диска расположено шарообразное уплотнение диаметром 30 тыс. световых лет. Галактическая жизнь “кипит”, в осно-




расположено между руками. В центре Млечного Пути

Млечный Путь



Эллиптические галактики



Галактика M31



Галактика M87

Неправильные галактики



M82



Малое Магелланово Облако (ММО)

Расстояние до звезд

Самые близкие к нам звёзды (кроме Солнца) – Альфа Центавра и Проксима Центавра – находятся в 270 тыс. раз дальше от Земли, чем Солнце.

В созвездии Ориона находится звезда Бетельгейзе – красный гигант. В созвездии Ориона находится звезда Бетельгейзе – красный гигант. От нее свет идет к нам 650 лет. Это звезда холоднее Солнца, т. к. она красного цвета. Радиус Бетельгейзе в 900 раз больше радиуса Солнца. Другая знаменитая звезда в Орионе – Ригель. Это голубой гигант, но меньше Бетельгейзе. Ригель излучает в 64000 раз больше света, чем Солнце. Ригель – тройная звезда (вокруг основной звезды – гиганта вращаются пара звезд-спутников).

Свет от Сириуса идет до нас 9 лет, а от Полярной звезды – 600 лет. Если Полярная звезда потухнет, мы узнаем об этом только через 600 лет.

Звёздные величины

Одну из первых попыток пересчитать звёзды и ввести числовую оценку их яркости предпринял во II в. до н. э. древнегреческий астроном Гиппарх. Самым ярким светилам он присвоил 1-ю звёздную величину, а самым слабым – 6-ю. Впоследствии выяснилось, что некоторые звёзды настолько ярки, что в означенные рамки не укладываются. Для них, а также для некоторых планет, астрономам пришлось ввести отрицательные величины. Например, звёздная величина самой яркой на небе звезды, Сириуса, равна -1,4. Венера в максимуме блеска достигает величины -4,5. Величина полной Луны равна -12,6, а Солнца – почти -27. На небе 20 звёзд ярче 1-й величины и около 70 – ярче 2-й. В обычный бинокль можно различить звёзды 8-й – 9-й величин. На современных больших телескопах астрономы наблюдают объекты вплоть до 30-й звёздной величины.



Вега



Сириус

Цвет и температура

Звёзды различаются не только по светимости, но и по цвету: от голубовато-белого до густо-красного. Хорошо заметны яркие красные звёзды – Бетельгейзе в Орионе и Альдебаран в Тельце.

Цвет звезды определяется температурой её поверхности. Самые горячие звёзды – голубые и белые. Температура поверхности голубых сверхгигантов составляет десятки тысяч градусов.

Самые холодные звёзды имеют темно-красный цвет и с трудом поддаются наблюдениям.

Альдебаран



Бетельгейзе



Размеры звёзд


Размеры звёзд астрономы определяют по их светимости и температуре. Чем меньше светимость и температура звезды, тем меньше её размеры. Сравнение Солнца с самыми большими звёздами показывает, что наше светило находится у нижней границы диапазона звёздных размеров. Это заставляет астрономов отнести его к жёлтым карликам. Ещё более холодные звёзды – красные карлики – часто десятикратно уступают Солнцу в размерах. Размеры же самых огромных светил воистину впечатляют. Как правило, большими радиусами обладают холодные массивные звёзды – красные и голубые сверхгиганты. Звезда Бетельгейзе, например, “обогнала” Солнце по размерам в несколько сотен раз. Но есть в Галактике и сверхгиганты, диаметры которых превышают солнечный в 1-2 тыс. раз (т. е. более миллиарда километров). Если такое светило поместить на место нашего Солнца, оно займёт всё пространство почти до орбит Юпитера или Сатурна! Одной из таких звёзд является Мю Цефея, которую астроном Вильям Гершель назвал Гранатовой звездой.

Звёздная эволюция (маломассивные звёзды)



1 – газовое облако, 2 – протозвезда, 3 – основное время жизни звезды, 4 – красный гигант, 5 – сброшенная газовая оболочка звезды, 6 – белый карлик. Таким образом, после расширения маломассивные звезды сбрасывают оболочку и становятся белыми карликами.

Звёздная эволюция (массивные звёзды)



1 – газовое облако, 2 – протозвезда, 3 – основное время жизни звезды, 4 – звезда-сверхгигант, 5 – взрыв сверхновой, 6 – нейтронная звезда, 7 – чёрная дыра. 1 – газовое облако, 2 – протозвезда, 3 – основное время жизни звезды, 4 – звезда-сверхгигант, 5 – взрыв сверхновой, 6 – нейтронная звезда, 7 – чёрная дыра. Самые массивные звёзды в

Звездные скопления

На звездном небе наблюдаются “кучи” звезд, которые астрономы называют скоплениями. Звезды скоплений связаны друг с другом общим происхождением. Россыпи звезд неправильной конфигурации, насчитывающие не более нескольких сотен звезд, называют рассеянными (на фото №1 – Плеяды). Наблюдаются на небе и скопления довольно правильной сферической формы, насчитывающие сотни тысяч звезд. Их называют шаровыми (на фото №2 – скопление M5). По своему возрасту они относятся к числу наиболее старых звездных образований.

№1




№2



Солнце

Солнце – самая яркая звезда на небе, дарующая нам жизнь, тепло и свет. Подсчитано, что расстояние от Солнца до Земли составляет почти 150 млн. км. Диаметр Солнца в 109 раз больше земного и составляет 1,4 млн. км. Температура на поверхности Солнца составляет 6000 градусов, а внутри – 15 млн. градусов, давление – 220 млрд. атмосфер.



От Солнца свет идёт к нам 8 минут 20 секунд

Поверхность Солнца – фотосфера – имеет зернистое строение. В центре звезды – в ядре – кипят ядерные процессы.

Планеты Солнечной системы

В состав Солнечной системы входят 9 [планет](#) со спутниками: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.



Радиус Марса – 3388 км.
Марсианский день длится 24,6 часа, а год – 687 обычных суток.



Диаметр Юпитера – 142700 км, один оборот вокруг Солнца он совершает за 12 земных лет.

Сатурн совершает один оборот по орбите за 30 лет. При наблюдении с земли хорошо видны 3 кольца Сатурна.




Нептун совершает один оборот вокруг Солнца за 165 лет. Средний диаметр планеты – 49,5 тыс. км – в 4 раза больше земного.



Туманность Андромеды

Ясной ночью в Северном полушарии неба можно заметить маленькое светящееся пятнышко. Это туманность Андромеды, единственная в этой части неба галактика, видимая невооруженным глазом. В центре галактики находятся ядра – огромные шаровые сгущения из желтых карликовых звезд. А от них отходят исполинские звездные “ветви”, состоящие из голубых звезд – гигантов.

Большая галактика М31
(Андромеда)



В глубинах галактик

Сpirальная галактика M51 находится на расстоянии 30 млн. световых лет от Земли. Ее размер – 60 тыс. световых лет. M51 – одна из самых ярких галактик, видимых с Земли. M51 включает в себя несколько галактик меньшего размера, а ее спиральность – результат гравитационного взаимодействия с др. галактикой.



M 51

Видимая часть галактики NGC 1232 содержит миллионы звезд(в основном, голубых гигантов). Но часть галактики скрыта огромными пылевыми скоплениями.



Созвездие Скульптора

Несколько галактик в созвездии Скульптора (около 500 млн. световых лет от Солнца), настолько тесно взаимодействуют друг с другом, что астрономы практически считают их одним целым и дали им одно название – “Колесо Фортуны”. Это скопление переживает настоящий Армагеддон – звезды вступили в непосредственный контакт и начали взрываться, уничтожая планеты. Две малые галактики ворвались в гравитационное поле крупной и буквально вырвали оттуда часть звезд. Кольцо вокруг пострадавшей галактики – результат небывалого по своим меркам космического катаклизма.



Звездный коридор между галактиками



Магеллановы Облака являются спутниками Млечного Пути, хотя и значительно удалены от него. Поперечник БМО – 26 тыс. свет. лет, а ММО – 17 тыс. свет. лет. Установить точные границы БМО и ММО невозможно, т. к. они проникают друг в друга.


Недавно было установлено, что к Млечному Пути от БМО протянулся так называемый звездный коридор. Это колоссальная перемычка из звезд.



В 1987 году произошел взрыв сверхновой SN1987A. Это одна из звезд в “коридоре”. Подсчитано, что через 10 млрд. лет Млечный Путь поглотит БМО и ММО, совершив тем самым акт космического каннибализма.

Взрыв сверхновой SN1987A

Далекие галактики



Галактика NGC 2915 удалена от нас на расстояние в 15 млн. световых лет. Снимок имеет специфический голубой оттенок – это светятся атомы кислорода, плотно насыщающего галактику.



Галактика NGC 4945 входит в группу галактик Кентавра, как и галактика M31. Рентгеновский телескоп доказал присутствие гигантской черной дыры в ее центре.

Галактика NGC 4650A состоит из 2 частей. В центре – старые умирающие звезды, по краям – молодые. Окраины изучены “Хабблом” хорошо, но огромные облака раскаленного газа не дают возможности изучать центр.



“Соседки”




Недавно рентгеновская обсерватория “Хаббл” сделала уникальный снимок галактики NGC 6782 с фиолетовым кольцом вокруг ядра, находящейся на расстоянии 183 млн. световых лет от Млечного Пути. Ультрафиолетовый венец показывает наличие молодых звезд.



NGC 6872, “соседка” NGC 6782. Из-за громадного расстояния от Земли (300 млн. световых лет) наши ученые рассматривают сейчас удаленные области Вселенной такими, какими они были миллиарды лет назад.

Туманности

Пространство между звездами заполнено облаками газа и пыли. Соседство молодой горячей звезды с таким облаком подогревает его, и газ начинает светиться. Такое слабосветящееся облако межзвездного газа мы называем газовой туманностью, к числу которых относится туманность Ориона. Светящиеся туманности, которые словно охватывают некоторые старые звезды, по их наружности называются планетарными. Это следы сброшенных звездами газовых оболочек. Темные несветящиеся облака газа с примесью пыли создают впечатление “пустоты” : земному наблюдателю кажется, что звезд в этом месте неба нет. Такие участки неба называют “угольными мешками”. Темные туманности часто имеют очертания, напоминающие хорошо известные предметы, например Конская Голова из созвездия Ориона.



Космические картины




“Портрет” радиогалактики

Ближайшая к нам радиогалактика – Кентавр A.

Причина мощного радиоизлучения из квазара в радиогалактике – скрытые за них массивные черные дыры, окруженные очень плотными пылевыми облаками.


С помощью инфракрасных лучей ученые доказали то, что квазары и радиогалактики – это одно и тоже.

Поскольку радиогалактики и квазары (мощные внегалактические источники рентгеновского Поскольку радиогалактики и квазары (мощные внегалактические источники рентгеновского и Поскольку радиогалактики и квазары (мощные внегалактические источники рентгеновского и радиоизлучения) не похожи друг на друга, то астрономы считали их разными типами космических объектов. Но это не так. В центре и радиогалактики, и квазара есть черная дыра.



Чёрные дыры

Чёрные дыры возникают при сжатии звёзд-сверхгигантов. Чёрные дыры возникают при сжатии звёзд-сверхгигантов. Чёрные дыры – исключительно компактные небесные объекты с очень мощными гравитационными полями. Чёрные дыры являются центрами многих галактик, в том чи



Фонтан энергии из черных дыр



Черная дыра в галактике
MCG 6 – 30 – 15.

Поток раскаленного излучения атомов пробивался с внутренней стороны газопылевого диска, т. е. в таком слое, где безраздельно господствует гравитация черной дыры. Раскаленный газ получил подпитку из мощнейшего источника. Другим объяснением этого странного факта является вращение черной дыры.

В галактике MCG 6 –30 –15 была обнаружена черная дыра, выбрасывающая в космос энергию. Вообще, когда материя приближается к “дыре”, она под действием гравитации проваливается в бездонное “чрево” черной дыры.

Но в этой галактике атомы железа со скоростью 150 тыс. км / час преодолевают неизмеримую силу притяжения черной дыры.

“Невесомые” черные дыры



Галактика М33 с
разряженной
черной дырой в
центре.

Недавно было установлено, что галактика М33 или не имеет в центре массивной черной дыры, или там находится легкая, разреженная черная дыра. Черная дыра в центре галактики равна всего 3000 массам Солнца, т. е. в тысячу раз “легче” черной дыры на Млечном Пути! Это и есть нижний предел массивных черных дыр.



Полная
противополож-
ность – супер-
массивная
черная дыра,
засасывающая
в себя звезду.

Еще немного о черных дырах



Черная дыра в галактике NGC 4214 уже уничтожила ее большую часть.

Неправильная галактика M82

обречена. Ее гибель будет происходить медленно по космическим меркам, т. к. черная дыра в центре этой галактики не очень активна.


Размер дыры – не больше Луны, зато гравитационное поле удерживает массу в 500 раз больше массы Солнца. M82 находится на расстоянии 11 млн. световых лет от Земли.




“Портреты” черных дыр



радиокарта черной
дыры.



Туманность Андромеды






Газовое облако



Двойная звезда




Рассеянное звёздное скопление Плеяды

The background of the image is a deep blue, representing the void between galaxies. Scattered throughout are numerous small, glowing points of light, representing individual stars or smaller celestial bodies. In the center, there is a more concentrated cluster of larger, brighter, and more varied shapes, representing galaxies of different sizes and types.

Метагалактика



Земля



Солнце




Туманность Небула

Малое Магелланово Облако





Сpirальная галактика Сомбреро



Галактика NGC 4622



Галактика Водоворот (M51)

Галактика M83





Взаимодействующие
галактики NGC 4676
(Мыши)



Эллиптическая галактика
M87 в созвездии Девы



Квинтент Стефана

Сpirальная галактика Агр 188





Карликовая BPG-галактика

Газопылевые столбы
в туманности M16





Туманность Кошачий Глаз



Планетарная туманность Улитка



Планетарная туманность Бабочка



Диффузная
туманность
Ориона



Трёхраздельная туманность



Туманность
Конская
Голова

Трехраздельная
туманность

Схема расположения туманности
Конская Голова



Комета Хейла-Боппа (Встреча кометы)



Комета Галлея