

# Палеарктическая область






Рис. 244. Карта зоогеографических областей.

- ПАЛЕАРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
- ПАЛЕАРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ (от греч. palaios — древний и арктика) — зоогеографич. область суши, занимающая Европу, Сев. Африку (включая Сахару), Аравийский п-ов (за исключением юж. горной части), холодные и умеренные части Азии до Инда, Гималаев и р. Янцзы на Ю (нек-рые учёные проводят границу в Вост. Азии по Сев. тропику). Включает ряд о-вов, в т. ч. в Тихом океане — Командорские, Курильские, Сахалин, Японские, в Атлантическом — Исландию, Зелёного Мыса, Канарские, Мадейра, Азорские (см. карту при статье Зоогеография). По фауне П. о. ближе всего к Неарктической области, с к-рой многими исследователями объединяется в Голарктич. обл. Из млекопитающих эндемичны роды: як, сайга, серна, косуля, кабарга, лань, верблюд, выхухоль, барсук, енотовидная собака, бамбуковый медведь (панда), хомяк, мышовка, слепыш и др. Из птиц единственное эндемичное сем. уса́тых синиц, эндемичны многие представители сем. славок (настоящие славки, соловьи, малиновки, завирушки и др.), а также ореховки, голубые сороки, пустынные сойки, горные индейки, турухтаны, чёрные грифы. Из пресмыкающихся — круглоголовки, из рыб эндемичны два семейства, встречающиеся в Байкале, — голомянки и близкое сем. Cottocomorphoridae. Широко распространены козлы и бараны из копытных, землеройки-бурозубки и куторы из насекомоядных, полёвки, мыши и зайцы из грызунов, различные представители воробьиных птиц, гусеобразных и куликов, настоящие ящерицы, хвостатые амфибии и из рыб карповые, лососёвые и осетровые. П. о. подразделяется на 4 подобласти: Средиземноморскую, Центрально-Азиатскую, Маньчжуро-Китайскую и Европейско-Сибирскую.



*Животные палеарктической области (западная часть) 1. Лисица. 2. Лесная куница. 3. Белобрюхий глухарь. 4. Филин. 5. Волк. 6. Бурый медведь. 7. Выдра. 8. Бобр. 9. Барсук. 10. Зубр. 11. Выхухоль. 12. косуля. 13. Заяц-русак. 14. Серна. 15. Благородный олень. 16. Сайга. 17. Байбак. 18. Хомяк. 19. Бесхвостый макак. 20. Дикобраз. 21. Кабан.*

- Средиземноморская подобласть характеризуется преобладанием пустынь, гор, лесов и зарослей кустарников и кустарничков лаврового типа. Здесь много летучих мышей, характерны мангусты, генетты, фенеки, верблюды, встречаются обезьяны (макаки); из птиц — горные куропатки и пустынные жаворонки. Центрально-Азиатская подобласть — страна обширных пустынь и высочайших гор. Здесь встречаются яки, тонкопалый суслик, слепушонки, степные пеструшки, горные полёвки, песчанки, многочисленные тушканчики, горные индейки, горные вьюрки, пустынные сойки и др. Для Маньчжуро-Китайской подобласти характерны широколиственные леса на С и вечнозелёные леса на Ю; в настоящее время преобладает культурный ландшафт. Фауна переходная к фауне Индо-Малайской области. Здесь встречаются примитивные насекомоядные, обезьяны, бамбуковый медведь, красный волк, ряд южных фазанов, из воробьиных — тимелии, белоглазки; имеется попугай. Европейско- Сибирская подобласть включает арктические пустыни, тундры, тайгу, широколиств. леса и степи. Фауна разнообразна. Встречаются: выхухоль, лось, северный олень, россомаха, белый медведь, лемминги, рыжие лесные полёвки, сонь, настоящие хомяки, глухарь, рябчик, белая и тундровая куропатки и др.



*Животные палеарктической области (восточная часть) 1. Рысь. 2. Росомаха. 3. Белка. 4. Снежный баран. 5. Колонок. 6. Бурундук. 7. Соболь. 8. Чёрный медведь. 9. Тёмнобрюхий улан. 10. Антилопа-оронго. 11. Енотовидная собака. 12. Сибирский козерог. 13. Горал. 14. Кеклик. 15. Длинно-хвостый сурок. 16. Як. 17. Пятнистый олень. 18. Суслик. 19. Кулан. 20. Джейран. 21. Серый варан. 22. Уссурийский тигр.*