


Почвообразующие породы России

Первую Карту материнских почвообразующих пород европейской части СССР (М 1:5 000 000) составил П.Н.Чижиков в 1960.

Затем она была детализирована и в 1968 г. переиздана 1:4 000 000.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ЭРА (период)	млн. лет	ПЕРИОД (система)	млн. лет
КАИНОЗОЙСКАЯ ЭРА (МЗ)	67	Четвертичные - Q	0-7
		Неогеновый - N	25
		Палеогеновый - P	41
МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА (МЗ)	165 ± 10	Меловой - K	70
		Юрский - J	55-68
		Триасовый - T	40-45
		Пермский - P	45
		Каменноугольный - C	65-70
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА (ПЗ)	330	Девонский - D	55-60
		Силурийский - S	35
		Ордовичский - O	60-70
		Кембрийский - K	70-80
ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭРА (ПЗ)	2000 ± 100		
АРХЕЙСКАЯ ЭРА (АР)	> 1800		

Кайнозой	Палеозой	Магматические породы
Q Четвертичная система	J Юрская система	T ₁ Гранитоиды мезокайнозойского возраста
Q ₁ Четвертичные лавы и туфы	T ₁₋₂ Триасовая и юрская системы	T ₂ Гранитоиды палеозойского возраста
N Неогеновая система	T Триасовая система	O Ордовичская система
P-Н Палеогеновая и неогеновая системы	P-Т Пермская и триасовая системы	K Кембрийская система
P Палеогеновая система	P ₂ Палеозой нерасчлененный	P-С Протерозой и кембрийская система
K-Ф Меловая и палеогеновая системы	P Пермская система	Донембрий
Мезозой	C-Р Каменноугольная и пермская системы	PR Протерозой
K Меловая система	C Каменноугольная система	PR ₂ Верхний протерозой
J-K Юрская и меловая системы	P ₂ Средний палеозой	AR Архей
	D Девонская система	
	S Силурийская система	
	O+S Ордовичская и силурийская системы	
	P ₂ Нижний палеозой	
	O Ордовичская система	
	K Кембрийская система	
	P-С Протерозой и кембрийская система	
	Донембрий	
	PR Протерозой	
	PR ₂ Верхний протерозой	
	AR Архей	
		T ₁ Гранитоиды мезокайнозойского возраста
		T ₂ Гранитоиды палеозойского возраста
		K Гранитоиды докембрийского возраста
		O Основные породы, v ₁ -группы
		S Ультраосновные породы
		E Щелочные породы
		V Вулканогенные образования

Области сплошного оледенения в Арктике
 Граница максимального оледенения
 Примечание. Возраст основных, ультраосновных и щелочных пород показан аналогично возрасту гранитоидов

Главное отличие карты
почвообразующих пород от карт
четвертичных отложений заключается в

том, что,

во-первых, на ней показана лишь небольшая толща породы (от 0 до 2—3 м), лежащая у самой поверхности, и,

во-вторых, на ней нанесен ряд важнейших литологических признаков каждого генетического типа, которые играют особую роль в почвообразовании (ГМС, завалуненность, карбонатность, степень засоленности легкорастворимыми солями и др.).




Рис. 50. Соотношение почвы и коры выветривания

На территории Русской равнины в направлении с северо-запада на юго-восток происходит **закономерная смена почвообразующих пород.**

На крайнем северо-западе, на Кольском полуострове **и в Карелии** материнские породы представлены **грубой щебенчатой мореной**, состоящей главным образом из местных кислых магматических пород. Она была отложена в заключительную стадию последнего оледенения. Гранулометрический состав породы в основном песчаный и супесчаный.

Дальше к юго-востоку **распространена «смешанная» морена** из магматических пород и тех осадочных пород, которые встретились на пути движения ледника и были перемешаны им. **В северо-восточной части Русской равнины распространена суглинистая и легкосуглинистая морена.**

На фоне моренных отложений отдельными участками встречаются **озерно-ледниковые отложения**. Они образовались на месте приледниковых озер и обычно слоисты. Особенностью ГМС этих пород является большое (от 35 до 70% и более) содержание крупной пыли (частиц от 0,05 до 0,01 мм), или «лессовой фракции», почему их и называют лёссовыми породами.

Некарбонатные

лёссовидные суглинки опоясывают моренные отложения с юга. Из-за залегания поверх морены и отсутствия в них карбонатов их называют **покровными суглинками**.

Слабокарбонатные

лёссовидные суглинки распространены **в лесостепи** с некарбонатными лёссовидными суглинками. Они перемежаются с флювиогляциальными отложениями, имеющими песчаный или супесчаный гранулометрический состав.

Самый южный литологический вид лёссовых пород — высококарбонатные лёссовидные суглинки, тяготеющие к побережьям Черного и Азовского морей.

Почвы, развитые на них, вскипают с самой поверхности

В Приуралье почвообразующие породы представлены элювием и делювием коренных пестроцветных карбонатных пород.

побережье Каспийского моря, распространены морские отложения хвалынской трансгрессии. По гранулометрическому составу они довольно разнообразны: от темно-коричневых отложений тяжелого гранулометрического состава, так называемых шоколадных глин, до пылеватых супесей, а у восточной границы — песков. **Всем каспийским отложениям особенно свойственна засоленность легкорастворимыми солями.**

В результате перевевания песчаных и супесчаных морских отложений в Прикаспийской низменности образовались **большие массивы эоловых отложений.**

Речные долины

сложены аллювиальными отложениями (от лат. «alluvio» -нанос), т.е. отложениями речных вод, как древними, так и современными. Аллювий северных рек большей частью легкого гранулометрического состава, у южных рек аллювиальные террасы сложены с поверхности более тяжелым, суглинистым, а местами


Северная часть Западно - Сибирской низменности покрыта морскими и ледниковыми отложениями — мореной и флювиогляциальными наносами.

На юге Западной Сибири огромные площади заняты древними озерно-аллювиальными лёссовидными суглинками и глинами.


В Казахстане большие площади занимают так называемые бурые суглинки — элювий и делювий коренных осадочных пород.

В горных системах Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии преобладают выходы разнообразных коренных пород и продукты их выветривания: элювий, делювий и коллювий, т.е. грубообломочный материал осыпей и россыпей.

На Камчатке почвообразующими породами **служат вулканические пеплы.**



Наиболее богатые кальцием почвообразующие породы сосредоточены в Эвенкии, в Черноземье и в Приазовье. Породы с низким содержанием кальция и низким потенциалом развития поглотительной способности почв распространены на севере Якутии и северо-востоке Европейской России.



Наиболее жесткими, затрудняющими формирование почвенного слоя являются породы горных районов Забайкалья, северо-восточной Эвенкии и восточного макросклона Урала. Наиболее рыхлыми, благоприятными для почвообитающих организмов являются условия юга Западной Сибири.

Основными почвообразующими породами на Европейской части территории являются: 1) моренные отложения, бескарбонатные и карбонатные, разного механического состава, главным образом в пределах Валдайского оледенения;

2) покровные суглинки и глины и лёссовидные карбонатные легкие и средние суглинки — в центральных и южных районах;

3) водно-ледниковые песчаные и супесчаные отложения Полесско-Днепровской, Верхне-Волжской, Мещерской, Окско-Мокшинской низменностей;

4) древнеаллювиальные, преимущественно песчаные и супесчаные отложения древних речных террас;

5) двучленные породы — пески и супеси, подстилаемые с глубины 40-60 см суглинком или глиной (главным образом в северных районах);

6) ленточные глины (в Ленинградской, Новгородской и других областях);

7) элювий и делювий коренных пород;

8) современные аллювиальные отложения в поймах рек,

Западно-Сибирская равнина в северной части также покрыта ледниковыми наносами, которые сменяются южнее (к югу от широтного течения Оби) древними озерно-аллювиальными наносами.

На Среднесибирском плоскогорье, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке почвообразующие породы — элювий и делювий коренных пород;

на Центральнойкутской низменности — четвертичные озерно-аллювиальные лёссовидные суглинки и супеси;