

Птицы Нижегородской области.



Нижегородская область изобилует разнообразием растительного и животного мира. Мне хочется рассказать о птицах родной области.



Во время весенних и осенних перелетов спускаются на озера области лебеди и дикие гуси.

Лебеди:



Дикие гуси:



Из охотничьих птиц в заволжских лесах водятся глухари, тетерева, рябчики.

Глухарь (лат. *Tetrao urogallus*) – крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных. Названием «глухарь» птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.



Тетерева – род птиц семейства фазановых.



Рябчик (лат. *Bonasa bonasia*) – птица из рода **рябчиков**, подсемейства тетеревиных, отряда курообразных



В зарослях близ рек поют соловьи, а над реками слышится крик речных чаек, по лесам разносится стук дятлов, долбящих своими крепкими клювами стволы поврежденных деревьев.

Соловь́й, (лат. *Luscinia*) – род птиц из отряда воробьинообразных .



Чайки (лат. *Larus*) – наиболее многочисленный **род птиц** семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах.



Дятлы (Picі) - отряд птиц, прежде причислявшихся к лазающим.



По озерам и болотам гнездятся утки, кулики, цапли.
Утка:



Кулик (Limicolae), подотряд птиц отряда ржанкообразных.



Серая цапля (лат. *Ardea cinerea*) – крупная болотная птица семейства цаплевых



© Peter Lowndes/Ross Parry

Около жилья обитают - воробьи, скворцы, ласточки, стрижи, сизые голуби, грачи.

Домóвый **воробéй** (*Passer domesticus*) – наиболее распространённый вид рода настоящих **воробьёв** семейства воробьиных .



Скворец (лат. *Sturnus*) – палеарктический род певчих птиц из семейства скворцовых.



Городская ласточка, или воронок (лат. *Delichon urbicum*) – мелкая птица семейства ласточковых.



Чёрный стриж, или башенный стриж (лат. *Apus apus*) – небольшая птица рода стрижей, семейства стрижиные.



Сизый голубь (лат. *Columba livia*) – широко распространённая птица семейства голубиных, родиной которой считаются Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка.



Грач (лат. *Corvus frugilegus*) – широко распространённая в Евразии птица рода ворон.



Зимуют галки, вороны, синицы.

Галка (лат. *Corvus monedula*) – широко распространённая птица рода воронов. Длина 34–39 см, масса тела 175–280 г.



Серая ворона - типичный синантропный вид.



Большая синица, или большак (лат. *Parus major*) – самый крупный и наиболее многочисленный из всех встречающихся в России видов синицевых птиц

