


## Пермский период



Земля в эпоху поздней перми (татарский век)








гониатит



аммоноидеи



эотинитес





мезозавр



MIRGEO.NET



Зубы мезозавра



# Поздняя пермь


Удмуртия в Пермь (Губернск. 1934 г.)



Мезозавр (Lacerta sp.)  
Егоров, 1938  
Германов (мезозавр (Lacerta sp.))  
Поздняя пермь,  
Архангельский обл., р. Мезень,  
Земельный ИИИ РАН

мезозавр

мезозавр



© Dan Varner 2001





MIRGEO.NET



Проганохелис





Диметродон (пеликозавр)




пеликозавр



Диметродон



Диметродон





пеликозавр





пеликозавры





# лабиринтодонты




лабиринтодонт *Eryops*






## дискозаврискус



Древней амфибии дали родовое название *Gerobatrachus*, что переводится как «старая лягушка». Впрочем, с тем же успехом ее можно было назвать и «старой саламандрой».




Котилозавры пермского периода



сеймурия






Флора пермского периода



# Флора пермского периода



Ископаемая личинка







Дерущиеся горгонопсы









лантанозухус







**диплокаулус**



**партозухус**



Поздняя пермь



МОНГОЛЕМИС



брадизавр




скутозавр



Поздняя пермь

ДИЦИНОДОНТ






Поздняя пермь



Клык иностранцевии





иностранцевия



Рептилии сменили свою походку сразу после массового вымирания видов в конце пермского периода. Если до кризиса, произошедшего около 250 миллионов лет назад, рептилии ходили вразвалочку на согнутых ногах, то после него резко «выпрямились». Кстати, в то время погибло 90% существовавших видов.

Узнать такие подробности о способах передвижения рептилий миллионы лет назад ученые смогли, проанализировав 460 окаменевших образца следов, относящихся ко времени до и после массового вымирания.





дицинодонт (dicynodont)

