

Степи Липецкой области



Терн



Степная вишня



Миндаль низкий



Зопник



Зопник клубненосный. Фото М.Шмытова

Синеголовник



Костер безостый



Василек шероховатый



Ковыль перистый

Эспарцет песчаный



Шалфей луговой



Клевер горный




Адонис весенний (горицвет)



Первоцвет весенний



Лапчатка белая



Осоки



Мох туидиум



Таблица 8. Листостебельные мхи (бокоплодные):

1 — фонтиналис противопожарный (*Fontinalis antipyretica*); 2 — туидиум тамарисковидный (*Thuidium tamariscinum*); 3 — миуроклада Максимовича (*Myuroclada maximoviczii*); 4 — каллиергон лозовидный (*Calliergon sarmentosum*); 5 — иеккера курчавая (*Neckera crispa*); 6 — леукодон повислый (*Leucodon pendulus*); 7 — климациум японский (*Climacium japonicum*); 8 — ортоцециум золотистый (*Orthotrichum chrysanthum*); 9 — драпанокладус отвернутый (*Draparnocladus revolvens*); 10 — птилиум гребенчатый, или страусово перо (*Ptilium crista-castrum*).


Лунь степной



Слепыш



Сурок-байбак



Приятного аппетита – Евражка! :-)

А. Кучкин © 2005

mir.chukotka.ru

Большой тушканчик



Дрофа



Степная гадюка



Шмель степной

