Полярные координаты

Пусть на плоскости задана координатная прямая с выделенной точкой O и единичным отрезком OE. Эта прямая в данном случае будет называться полярной осью. Точка O называется полюсом.

Полярными координатами точки A на плоскости с заданной полярной осью называется пара (r, ϕ), где r - расстояние от точки A до точки O, ϕ - угол между полярной осью и вектором $\overrightarrow{OA}$, отсчитываемый в направлении против часовой стрелки, если ϕ > 0 и по часовой стрелке, если ϕ < 0.



При этом первая координата r называется полярным радиусом, а вторая ϕ - полярным углом. Полярный угол можно задавать в градусах или радианах.

Полярные координаты

Если на плоскости задана декартова система координат, то обычно за полюс принимается начало координат и за полярную ось – ось *Ox*. В этом случае каждой точке плоскости с декартовыми координатами (*x*, *y*) можно сопоставить полярные координаты (*r*, ϕ). При этом декартовы координаты выражаются через полярные по формулам:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi. \end{cases}$$



Наоборот, полярные координаты выражаются через декартовы по формулам:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \sin\varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Окружность

Окружность радиуса R с центром в точке O задается уравнением $r = R$.



Действительно, окружность является геометрическим местом точек, удаленных от точки O на расстояние R. Все такие точки удовлетворяют равенству $r = R$. При этом, если угол увеличивается, то соответствующая точка на окружности движется в направлении против часовой стрелки, описывая круги. Если же угол уменьшается, то соответствующая точка описывает круги в направлении по часовой стрелке.

Спираль Архимеда

Спираль Архимеда - кривая, задаваемая уравнением $r = a\phi$, где a - некоторое фиксированное число, угол ϕ задается в радианах.



Геометрическим свойством, характеризующим спираль Архимеда, является постоянство расстояний между соседними витками, каждое из них равно $2\pi a$. Действительно, если угол увеличивается на 2π, т.е. точка делает один, то радиус увеличивается на $2\pi a$, что и составляет расстояние между соседними витками.

Трилистник

Трилистник – кривая, задаваемая уравнением $r = \sin 3\phi$.

Для построения этой кривой сначала заметим, что, поскольку радиус неотрицателен, должно выполняться неравенство $\sin 3\phi \geq 0$, решая которое находим область допустимых значений углов :

$$0^\circ \leq \phi \leq 60^\circ;\ 120^\circ \leq \phi \leq 180^\circ;\ 240^\circ \leq \phi \leq 300^\circ.$$



Если угол ϕ изменяется от нуля до 30°, то радиус r изменяется от нуля до единицы. Если угол ϕ изменяется от 30° до 60°, то радиус изменяется от единицы до нуля. Таким образом, при изменении угла от 0° до 60° точка описывает кривую, похожую на очертания лепестка. Такие же лепестки получаются когда угол изменяется в пределах от 120° до 180° и от 240° до 300°.

Циклоида

Циклоида - кривая, которую описывает точка, закрепленная на окружнос



Найдем уравнения циклоиды. Предположим, что окружность радиуса R катится по оси Ox, и в начальный момент времени закрепленная точка A_0 находилась в начале координат. Если окружность повернется на угол ϕ, то закрепленная точка переместится в положение A. Поскольку дуга AP прокатилась по отрезку A_0P, то их длины равны, т.е. $AP = A_0P = R$. Для координат x, y точки A имеем:

$$x = AP - AQ = R - R\sin\phi = R(\phi - \sin\phi),$$

$$y = OP - OQ = R - R\cos\phi = R(1 - \cos\phi).$$

Упражнение 1

Для следующих точек с заданными полярными координатами найдите их декартовы координаты: а) $(1, \frac{\pi}{3})$; б) $(2, -\frac{\pi}{4})$.

Ответ: а) $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; б) $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Упражнение 2

Для следующих точек с заданными декартовыми координатами найдите их полярные координаты: а) ($\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$); б) (-10, 0); в) (1, -$\sqrt{3}$); г) (-$\sqrt{3}$, 1).

Ответ: а) (2, $\frac{\pi}{4}$); б) (10, π); в) (2, -$\frac{\pi}{3}$); г) (2, $\frac{5\pi}{6}$).

Упражнение 3

Нарисуйте геометрическое место точек на плоскости, полярные координаты которых удовлетворяют неравенствам: а) $30^\circ < \phi < 60^\circ$; б) $1 < r < 2$; в) $30^\circ < \phi < 60^\circ$, $1 < r < 2$.

Ответ: а) б) в)







Упражнение 4

Найдите геометрическое место точек, полярные координаты которых удовлетворяют уравнению:

а) $r = \dfrac{1}{\cos\varphi}$; б) $r = \dfrac{1}{\sin\varphi}$.

Ответ: а)



б)



Упражнение 5

Нарисуйте спираль Архимеда, заданную уравнением $r = -\phi$.

Ответ:



Упражнение 6

Нарисуйте кривую, задаваемую уравнением

$$r = \sin 4\phi\ .$$

Ответ:



Упражнение 7

Нарисуйте кривую, задаваемую уравнением $r = \cos \phi$.

Ответ:



Упражнение 8

Нарисуйте кривую, задаваемую уравнением $r = 1 - \cos \phi$.

Ответ: Кардиоида.



Упражнение 9

Нарисуйте кривую, задаваемую уравнением

$$r = \sin\frac{\varphi}{2}.$$

Ответ:



Упражнение 10

Нарисуйте кривую, задаваемую уравнением

$$r = \sin\frac{5\varphi}{3}.$$

Ответ:



Упражнение 11

Нарисуйте гиперболическую спираль – кривую, задаваемую уравнением $r = a/\phi$.

Ответ:



Упражнение 12

Нарисуйте спираль Галилея – кривую, задаваемую уравнением $r = a\varphi^2$.

Ответ:



Упражнение 13

Нарисуйте кривую, напоминающую лист клевера и задаваемую уравнением $r = 1 + \cos 3\phi + \sin^2 3\phi$.

Ответ:



Упражнение 14

Человек идет с постоянной скоростью вдоль радиуса вращающейся карусели. Какой будет его траектория относительно земли?

Ответ: Спираль Архимеда.