

МОУ гимназия им. А. Л. Кекина

ДВИЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ

Выполнила:
Иванченко Анна 9 «в»

Учитель:
Иванченко И.А.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

- Углубить свои знания по геометрии.
- Узнать виды движения плоскости.
- Применять знания полученные в результате изучения данной темы при решении практических задач.

ВВЕДЕНИЕ


- С древних времен с помощью представлений о симметрии человек пытается понять порядок, красоту, совершенство окружающего мира. Изучая математику мы «изучаем саму жизнь».
- В повседневном языке под симметрией понимают чаще всего упорядоченность, гармонию, соразмерность. Кристаллы издавна восхищают нас своим совершенством, строгой симметричностью форм. Симметричные мозаики, фрески, архитектурные ансамбли будят в людях чувство прекрасного, музыкальные и поэтические произведения вызывают восхищение именно своей гармоничностью. В создании общей картины мира с его единством и многообразием свойств неживой и живой природы симметрия оказывает неоценимую услугу.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- Первым, кто начал доказывать некоторые геометрические предложения, считается древнегреческий математик Фалес Милетский (625-547 г. до н.э.).
- Во времена античной истории идеей движения пользовался и знаменитый Евклид.
- Дальнейшее развитие теории движений связывают с именем французского математика и историка науки Мишеля Шаля (1793-1880).
- В (1849-1925) теорией движения занимался математик Кристиан Феликс Клейн.
- В 1909 г. немецкий математик Фридрих Шур (1856-1932), следуя идеям Фалеса и Клейна, разработал другую систему аксиом геометрии – основанную на рассмотрении движений.

Если каждой точке плоскости ставится в соответствие точка этой же плоскости, то дано **отображение плоскости на себя.**

Отображение плоскости на себя, которое сохраняет расстояние между точками называется **движением.**




Теорема:

При движении отрезок отображается на отрезок.

Докажем что $MN \rightarrow M_1N_1$.

- 1) P лежит на MN
- 2) P переходит в P_1 , $MP + PN = MN$, $M_1N_1 = MN$, $M_1P_1 = MP$ и $N_1P_1 = NP \rightarrow M_1P_1 + N_1P_1 = M_1N_1$
- 3) P_1 лежит на M_1N_1



Виды
движения

Осевая
симметрия

Центральная
симметрия

Параллельный
перенос

Поворот

Зеркальная

Свойства движения

При движении
отрезок
отображается
на отрезок

При движении
треугольник
отображается на
равный
ему треугольник

При движение
угол
отображается
на равный
ему угол



Осевая симметрия


Осевая симметрия - это такое отображение плоскости на себя, при котором любая точка M переходит в симметричную ей точку M_1 относительно оси a

Осевая симметрия:

1. Является движением, т.е сохраняет расстояние между точками.
2. Отрезок переводит в равный ему отрезок.
3. Треугольник переводит в равный ему треугольник.
4. Любое тело переводит в равное ему тело.

Для того, чтобы задать осевую симметрию, необходимо задать ось, относительно которой и будет осуществляться эта симметрия







Какие точки называются симметричными относительно данной прямой?

- Две точки A и A_1 называются симметричными относительно прямой, если эта прямая проходит через середину отрезка AA_1 и перпендикулярна ему.

Как построить точку симметричную данной относительно прямой L ?





- $A \rightarrow A_1$
- $B \rightarrow B_1$
- $C \rightarrow C_1$
- $D \rightarrow D_1$
- $E \rightarrow E_1$
- $F \rightarrow F_1$

$$ABCDEF \rightarrow A_1B_1C_1D_1E_1F_1$$

$$ABCDEF = A_1B_1C_1D_1E_1F_1$$



ЗАДАЧА № 1

Докажите, что при осевой симметрии плоскости:

а) прямая, параллельная оси симметрии, отображается на прямую, параллельную оси симметрии;


б) прямая, перпендикулярная к оси симметрии, отображается на себя.



Решение :


Обозначим буквой b ось симметрии. Осева́я симметрия – движение, поэтому образом прямой a является некоторая прямая a' .

Пусть $a \parallel b$. Предположим, что прямые b и a' не параллельны. Тогда они имеют общую точку обозначим её M . Так как M принадлежит b , то точка M отображается сама на себя, и, следовательно, M принадлежит a . Отсюда следует, что прямые a и b имеют общую точку M , что противоречит условию $a \parallel b$. Следовательно, $a' \parallel b$.



Решение:

Пусть a перпендикулярна b , M - точка пересечения прямых a и b , а N - точка прямой a , отличная от M . Так как a перпендикулярна b , то N' лежит на прямой a . Очевидно, что M' , т. е. сама точка M , лежит на прямой a . Таким образом, прямые a и a' имеют общие точки: M и N' , следовательно они совпадут.



Зеркальная симметрия

Зеркальной симметрией называется такое отображение плоскости на себя, при котором любая точка M переходит в симметричную ей относительно прямой a точку M_1 .

*относительно
вертикальной прямой*

Симметрия



Симметрия относительно горизонтальной прямой

Зеркальная симметрия имеет такие же свойства как и любая симметрия



Центральная симметрия


Отображение плоскости на себя, при котором точка M отображается в точку M_1 , что при этом центр симметрии является серединой отрезка MM_1 .


$$A \rightarrow A_1$$

$$B \rightarrow B_1$$

$$AB \rightarrow A_1B_1$$

$$AB = A_1B_1$$







Какие точки называются симметричными относительно данной точки?

- Две точки A и A_1 называются симметричными относительно точки, если эта точка является серединой отрезка AA_1 .

Как построить точку симметричную данной относительно некоторой точки O ?



Центральная симметрия задаётся точкой плоскости.
Так как центральная симметрия есть движение, то симметричные фигуры равны. При центральной симметрии прямая отображается на параллельную ей прямую.



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| $A \rightarrow A_1$ | $BC \parallel B_1C_1$ |
| $B \rightarrow B_1$ | $BC = B_1C_1$ |
| $C \rightarrow C_1$ | $CA \parallel C_1A_1$ |
| $AB \parallel A_1B_1$ | $CA = C_1A_1$ |
| $AB = A_1B_1$ | $ABC = A_1B_1C_1$ |



Центральная симметрия является частным случаем поворота - это поворот вокруг центра симметрии на угол 180° . (рис.1)





Рис. 1



Параллельный перенос

Параллельным переносом на вектор \vec{a} называется отображение плоскости на себя, при котором каждая точка M отображается в такую точку $M1$, что вектор $\overrightarrow{MM1}$ равен вектору \vec{a} .




Параллельный перенос задаётся вектором. Так как параллельный перенос есть движение, он сохраняет расстояние между точек.

Свойства: при параллельном переносе прямая отображается параллельную ей прямую.


Параллельный перенос – сдвиг всей плоскости в направлении a , на его длину.

$$\begin{aligned} A &\rightarrow A_1 \\ B &\rightarrow B_1 \\ C &\rightarrow C_1 \\ D &\rightarrow D_1 \end{aligned}$$



ЗАДАЧА № 2


На сторонах AB и CD параллелограмма $ABCD$ построены квадраты так, как показано на рисунке. Используя перенос, докажите, что отрезок, соединяющий центры квадратов, равен и параллелен стороне AD .



РЕШЕНИЕ:

Рассмотрим параллельный перенос на вектор \overrightarrow{AD} . Так как $ABCD$ -параллелограмм, то $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, поэтому при этом параллельном переносе точка B отображается в точку C . Отрезки AA_1 и DA_2 равны и параллельны, поэтому ADA_2A_1 - параллелограмм, и, следовательно, $\overrightarrow{A_1A_2} = \overrightarrow{AD}$. Таким образом, при рассматриваемом параллельном переносе точка A_1 отображается в точку A_2 , точка B - в точку C , и, значит, отрезок A_1B отображается на отрезок A_2C . Отсюда следует, что середина O_1 отрезка A_1B отображается в середину O_2 отрезка A_2C , т. е. $O_1O_2 = AD$.

Поэтому $O_1O_2 = AD$, $O_1O_2 \parallel AD$.




Поворот

Поворотом плоскости вокруг точки O на угол α называют отображение плоскости на себя, при котором каждая точка M отображается в такую точку M_1 , что $OM = OM_1$ и угол MOM_1 равен α .




$$\begin{aligned}M &\rightarrow M_1 \\OM &\rightarrow OM_1 \\OM &= OM_1\end{aligned}$$



Для того, чтобы задать поворот, необходимо задать следующие элементы:

1. Центр поворота
2. Направление поворота (по часовой стрелки или против часовой стрелки)
3. Угол, на который будет осуществляться данный поворот



O - центр поворот
 $\alpha = 90^0$

$A \rightarrow A_1$
 $B \rightarrow B_1$
 $AO \rightarrow OA_1$
 $AO = OA_1$

$BO \rightarrow OB_1$
 $BO = OB_1$
 $AOB \rightarrow A_1OB_1$
 $AOB = A_1OB_1$



Последовательное выполнение двух движений даёт новое движение.

Выясним, какое движение получается в результате последовательного выполнения двух осевых симметрий с различными осями a и b . Возможны два случая:

1. прямые l и m параллельны


2. прямые l и m пересекаются

Обозначим буквой d расстояние между параллельными прямыми l и m и введем систему координат так, чтобы ось Ox совпала с прямой l , а прямая m имела уравнение $y=d$.


Рассмотрим произвольную точку M с координатами $(x; y)$. При симметрии относительно прямой l она перейдет в точку N с координатами $(x; -y)$. Точка N , в свою очередь, перейдет в точку M_1 , что прямая m окажется серединным перпендикуляром к отрезку NM_1 . Следовательно, середина отрезка NM_1 должна иметь координаты $(x; d)$, а значит, сама точка M_1 - координаты $(x; y+2d)$.

Итак, в результате последовательного выполнения двух осевых симметрий произвольная точка $M(x; y)$ перешла в точку $M_1(x; y+2d)$, т. е. в такую точку M_1 , что $\vec{MM_1} = \vec{a} = \{0; 2d\}$.

Это означает, что *результатом последовательного выполнения двух осевых симметрий с параллельными осями является параллельный перенос на вектор, перпендикулярный к этим осям, длина которого равна удвоенному расстоянию между осями.*



2. Обозначим буквой O точку пересечения прямых l и m и выберем на этих прямых соответственно точки A и B так, чтобы угол AOB не был тупым.



Возьмём теперь какую – нибудь точку M , отличную от O . Допустим, что она лежит внутри угла AOB . При симметрии относительно прямой l точка M перейдёт в точку N , что $ON=OM$ и $\angle AON=\angle AOM$. В свою очередь, точка N при симметрии относительно прямой m перейдёт в такую точку M_1 , что $OM_1=ON$ и $\angle BOM_1=\angle BON=\angle AOB+\angle AON=\angle AOB+\angle AOM$.

Поэтому $\angle AOM_1=\angle BOM_1+\angle AOB=2\angle AOB+\angle AOM$, а значит, $\angle M_1OM=2\angle AOB$.

Итак, в результате последовательного выполнения двух симметрий точка O осталось на месте, а произвольная точка M перешла в точку M_1 , что $OM_1=OM$ и $\angle M_1OM=2\angle AOB$.

Кроме того, направление поворота вокруг точки O от OM к OM_1 такое же, как от OA к OB .


Результатом последовательного выполнения двух осевых симметрий с пересекающимися осями является поворот вокруг точки пересечения осей на угол, вдвое больший угла между осями.

В частности, если оси взаимно перпендикулярны, то в результате получится поворот на 180° , т. е. центральная симметрия. Отметим также, что результатом последовательного выполнения двух осевых симметрий с совпадающими осями является, очевидно, тождественное отображение.




Виды движений


Если движение оставляет неподвижными три точки плоскости, не лежащие на одной прямой, это движение- тождественное отображение.




Если движение оставляет неподвижными две точки плоскости, и не является тождественным отображением, то это движение- осевая симметрия.



Если движение оставляет неподвижным только одну точку, то это движение- поворот вокруг неподвижной точки.



Если движение не оставляет ни одной неподвижной точки, то это движение либо последовательное выполнение трех осевых симметрий, оси которых не параллельны друг другу и не пересекаются в одной точке.



Задачник

Вывод

Любое движение представляет собой либо осевую симметрию, либо поворот, либо параллельный перенос, либо последовательное выполнение трех осевых симметрий, оси которых не параллельны друг другу и не проходят через одну точку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Л. С. Атанасян. «Дополнительные главы к учебнику геометрии 9 класс» ; Вита пресс, Москва, 2004г
- 2.Л. С. Атанасян. «Геометрия 7-9» Москва «Просвещение» 2003
- 3.В.В. Прасолов « Задачи по планиметрии» Часть 2 Москва наука ,1995
- 4.. А. В. Погорелов «Геометрия 6-10 класс» Москва «Просвещение» 1988г.
- 5. Ресурсы Интернета