Электролитическая диссоциация

Учитель химии МОУ Нерльская СОШ Шаронова Светлана Владимировна

Нерль



Цели урока: дать понятие об электролитах и неэлектролитах,

рассмотреть механизм диссоциации веществ с различным типом связи,

познакомить со степенью электролитической диссоциации и классификацией электролитов.

Оборудование и реактивы

- Прибор для определения электропроводности растворов с лампочкой;
- Растворы кислот, щелочей, солей **СНЗСООН; КОН; NaOH;** сахароза.

Вещества по их способности проводить электрический ток в растворах можно разделить на 2 класса:

1.Электролиты – вещества, растворы которых проводят электрический ток.

К ним относятся все растворимые:

а/ соли

б/ основания, т.е. щелочи

в/ кислоты

2.Неэлектролиты – вещества, которые нерастворимы в воде, а если растворимы, то электрического тока не проводят.

К ним относят все:

а/ нерастворимые соли, основания, кислоты,

б/ простые вещества,

в/ оксиды,

г/ органические вещества.

Что такое диссоциация?

Автор теории электролитической диссоциации /ТЭД/, шведский ученый Свантэ Аррениус.

Он сделал логический вывод: чтобы лампочка загорелась цепь должна замкнуться через раствор электролита. А это произойдет, если в водном растворе появится упорядоченное движение заряженных частиц.

Такими частицами в растворах солей и кислот могут быть положительные и отрицательные ионы

Следовательно, в воде молекулы кислот и кристаллы солей и щелочей распадаются на ионы, т.е. диссоциируются.

Диссоциация — это распад электролита на ионы.

Аррениус приверженец физической теории растворов.

Почему именно в водном растворе происходит диссоциация солей и щелочей?

Откуда берутся ионы в растворах кислот?

И.А.Каблуков и В.А.Кистяковский – русские химики.

Внесли дополнения в ТЭД С.Аррениуса:

- Причиной диссоциации электролита в растворе является его гидратация, т.е. взаимодействие с молекулами воды,
- Ионы, которые образуются при диссоциации, также будут гидратированными, т.е. связанными с молекулами воды.

Диссоциация веществ с ионной связью протекает в 3 стадии:

- вначале хаотически движущиеся молекулы воды у ионов кристалла ориентируются к ним противоположно заряженными полюсами происходит ориентация,
- затем диполи воды притягиваются, взаимодействуют с ионами поверхностного слоя кристалла, происходит гидратация,
- и, наконец, молекулы воды, перемещаясь в раствор, захватывают с собой гидратированные ионы происходит диссоциация.

Диссоциация веществ:

С ионной связью:

С ковалентной полярной связью:

Ориентация □ гидратация □ диссоциация.

Ориентация □ гидратация □ ионизация □ диссоциация.

Сильные и слабые электролиты

Диссоциация, как и растворение зависит, от природы веществ, от природы электролитов. Одни электролиты почти полностью распадаются на ионы. Они называются сильными. Это будут:

Уравнение диссоциации:

 $KOH=K^{+}+OH^{-}$

 $\text{Ca(NO}_3)_2 = \text{Ca}^{2+} + 2\text{NO}_3^{-}$

Другие электролиты лишь частично диссоциируют на ионы, т.к. в растворах таких электролитов наряду с диссоциацией происходит и обратный процесс соединения ионов в молекулы, или ассоциация. Такие электролиты называются слабыми. Это будут:

а/ слабые неорганические кислоты — H₂CO₃

6/ гидроксид аммония — NH_4OH

в/ органические кислоты – уксусная.

Степень электролитической диссоциации

Величина, которая характеризует силу электролита, которая показывает отношение числа молекул, распавшихся на ионы / /, к общему числу растворенных молекул / /.

Факторы от которых зависит ЭД:

• Природы электролита,

Концентрация электролита в растворе.

Домашнее задание:

• Параграф 35.

• Упражнение 1,2.

