

# ХРОМ

Учитель химии

МБОУ лицей №1

г. Волжский Волгоградская область

Солдатова Татьяна Михайловна.

# XPOM



# I. Исторические сведения

## II. Хром – химический элемент:

1. Положение хрома в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева

2. Строение атома.

3. Нахождение в природе

## III. Хром – простое вещество

1. Состав. Физические свойства.

2. Получение.

3. Химические свойства

4. Биологическая роль и физиологическое действие.

5. Применение

## IV. Соединения хрома

В 1766 году в окрестностях Екатеринбурга был обнаружен минерал, который получил название «сибирский красный свинец»,  $PbCrO_4$ . Современное название — крокоит.



В 1797 французский химик Л. Н. Воклен открыл в сибирской красной свинцовой руде новый элемент хром и в 1798 году получил его в свободном состоянии.

### **Происхождение названия**


Название элемент получил от греч. χρῶμα — цвет, краска — из-за разнообразия окраски своих соединений.



Французский химик **Луи Николя Воклен** родился в Сент-Андре-д'Эберто (Нормандия).

Совместно с А. Ф. Фуркруа выяснил (1799) химическую природу мочевины. Совместно с П. Ж. Робике открыл (1806) первую аминокислоту аспарагин. Открыл также пектин и яблочную кислоту, выделил камфорную и хинную кислоты.

Внёс существенный вклад в развитие анализа минералов. Создал школу химиков. Опубликовал одно из первых в мире руководств по химическому анализу – "Введение в аналитическую химию" (1799).



Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																		Энергетический уровень	
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII					a
		a	б	a	б	a	б	a	б	a	б	a	б	a	б	a	б	а			
1	1	<b>H</b> ВОДОРОД 1,008																	<b>He</b> ГЕЛИЙ 4,003		
2	2	<b>Li</b> ЛИТИЙ 6,941	<b>Be</b> БЕРИЛЛИЙ 9,0122	<b>B</b> БОР 10,811	<b>C</b> УГЛЕРОД 12,011	<b>N</b> АЗОТ 14,007	<b>O</b> КИСЛОРОД 15,999	<b>F</b> ФТОР 18,998											<b>Ne</b> НЕОН 20,179		
3	3	<b>Na</b> НАТРИЙ 22,99	<b>Mg</b> МАГНИЙ 24,312	<b>Al</b> АЛЮМИНИЙ 26,992	<b>Si</b> КРЕМНИЙ 28,086	<b>P</b> ФОСФОР 30,974	<b>S</b> СЕРА 32,064	<b>Cl</b> ХЛОР 35,453											<b>Ar</b> АРГОН 39,948		
4	4	<b>K</b> КАЛИЙ 39,102	<b>Ca</b> КАЛЬЦИЙ 40,08	<b>Sc</b> СКАНДИЙ 44,956	<b>Ti</b> ТИТАН 47,956	<b>V</b> ВАНАДИЙ 50,941	<b>Cr</b> ХРОМ 51,996	<b>Mn</b> МАРГАНЕЦ 54,938	<b>Fe</b> ЖЕЛЕЗО 55,849	<b>Co</b> КОБАЛЬТ 58,933	<b>Ni</b> НИКЕЛЬ 58,7										
	5	<b>Cu</b> МЕДЬ 63,546	<b>Zn</b> ЦИНК 65,37	<b>Ga</b> ГАЛЛИЙ 69,72	<b>Ge</b> ГЕРМАНИЙ 72,59	<b>As</b> МЫШЬЯК 74,922	<b>Se</b> СЕЛЕН 78,96	<b>Br</b> БРОМ 79,904											<b>Kr</b> КРИПТОН 83,8		
5	6	<b>Rb</b> РУБИДИЙ 85,468	<b>Sr</b> СТРОНЦИЙ 87,62	<b>Y</b> ИТТРИЙ 88,906	<b>Zr</b> ЦИРКОНИЙ 91,22	<b>Nb</b> НИОБИЙ 92,906	<b>Mo</b> МОЛИБДЕН 95,94	<b>Tc</b> ТЕХНЕЦИЙ [99]	<b>Ru</b> РУТЕНИЙ 101,07	<b>Rh</b> РОДИЙ 102,906	<b>Pd</b> ПАЛЛАДИЙ 106,4										
	7	<b>Ag</b> СЕРЕБРО 107,868	<b>Cd</b> КАДМИЙ 112,41	<b>In</b> ИНДИЙ 114,82	<b>Sn</b> ОЛОВО 118,69	<b>Sb</b> СУРЬМА 121,75	<b>Te</b> ТЕЛЛУР 127,6	<b>I</b> ИОД 126,905											<b>Xe</b> КСЕНОН 131,3		
6	8	<b>Cs</b> ЦЕЗИЙ 132,905	<b>Ba</b> БАРИЙ 137,34	<b>57-71</b> ЛАНТАНОИДЫ	<b>Hf</b> ГАФНИЙ 178,49	<b>Ta</b> ТАНТАЛ 180,948	<b>W</b> ВОЛЬФРАМ 183,85	<b>Re</b> РЕНИЙ 186,207	<b>Os</b> ОСМИЙ 190,2	<b>Ir</b> ИРИДИЙ 192,22	<b>Pt</b> ПЛАТИНА 195,09										
	9	<b>Au</b> ЗОЛОТО 196,967	<b>Hg</b> РТУТЬ 200,59	<b>Tl</b> ТАЛЛИЙ 204,37	<b>Pb</b> СВИНЕЦ 207,19	<b>Bi</b> ВИСМУТ 208,98	<b>Po</b> ПОЛОНИЙ [210]	<b>At</b> АСТАТ [210]											<b>Rn</b> РАДОН [222]		
7	10	<b>Fr</b> ФРАНЦИЙ [223]	<b>Ra</b> РАДИЙ [226]	<b>89-103</b> АКТИНОИДЫ	<b>Rf</b> РЕЗЕРФОРДИЙ [261]	<b>Db</b> ДУБНИЙ [262]	<b>Sg</b> СИБОРГИЙ [263]	<b>Bh</b> БОРИЙ [262]	<b>Hn</b> ХАНИЙ [265]	<b>Mt</b> МЕЙТНЕРИЙ [265]	<b>110</b>										
ВЫСШИЕ ОКСИДЫ		$R_2O$		$RO$		$R_2O_3$		$RO_2$		$R_2O_5$		$RO_3$		$R_2O_7$		$RO_4$					
ЛЕТУЧИЕ ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ						$RH_4$		$RH_3$		$H_2R$		$HR$									

### Л А Н Т А Н О И Д Ы

57 <b>La</b> ЛАНТАН 138,906	58 <b>Ce</b> ЦЕРИЙ 140,12	59 <b>Pr</b> ПРАЗЕОДИМ 140,909	60 <b>Nd</b> НЕОДИМ 144,24	61 <b>Pm</b> ПРОМЕТИЙ [145]	62 <b>Sm</b> САМАРИЙ 150,4	63 <b>Eu</b> ЕВРОПИЙ 151,96	64 <b>Gd</b> ГАДОЛИНИЙ 157,25	65 <b>Tb</b> ТЕРБИЙ 158,926	66 <b>Dy</b> ДИСПРОЗИЙ 162,5	67 <b>Ho</b> ГОЛЬМИЙ 164,93	68 <b>Er</b> ЭРБИЙ 167,26	69 <b>Tm</b> ТУЛИЙ 168,934	70 <b>Yb</b> ИТТЕРБИЙ 173,04	71 <b>Lu</b> ЛЮТЕЦИЙ [175]
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



### А К Т И Н О И Д Ы

89 <b>Ac</b> АКТИНИЙ [227]	90 <b>Th</b> ТОРИЙ 232,038	91 <b>Pa</b> ПРОТАКТИНИЙ [231]	92 <b>U</b> УРАН 238,29	93 <b>Np</b> НЕПУНИЙ [237]	94 <b>Pu</b> ПЛУТОНИЙ [244]	95 <b>Am</b> АМЕРИЦИЙ [243]	96 <b>Cm</b> КЮРИЙ [247]	97 <b>Bk</b> БЕРКЛИЙ [247]	98 <b>Cf</b> КАЛИФОРНИЙ [251]	99 <b>Es</b> ЭЙНШТЕЙНИЙ [254]	100 <b>Fm</b> ФЕРМИЙ [257]	101 <b>Md</b> МЕНДЕЛЕВИЙ [258]	102 <b>No</b> НОБЕЛИЙ [259]	103 <b>Lr</b> ЛОУРЕНСИЙ [260]
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------





# Положение хрома в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Структура атома.

		порядковый номер	период	группа
Cr	металл	+24	4	VIB



валентные электроны




# Нахождение хрома в природе

Хром является довольно распространённым элементом (0,02 масс. долей, %). Основные соединения хрома — хромистый железняк (хромит)  $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ . Вторым по значимости минералом является крокоит  $\text{PbCrO}_4$ .



хромит



крокоит



## Физические свойства

В свободном виде — голубовато- белый металл.

Хром (с примесями) является одним из самых твердых металлов.


Очень чистый хром достаточно хорошо поддается механической обработке, пластичен.

Устойчив на воздухе. При 2000 °С сгорает с образованием зелёного оксида хрома (III)  
 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ .

Плотность 7,19 г/см<sup>3</sup>;


$t_{\text{плавления}}$  1890°С;

$t_{\text{кипения}}$  2480°С.




# Получение

Из хромистого железняка  $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$  (хромита железа) получают феррохром восстановлением в электропечах коксом (углеродом):




**Феррохром** — сплав железа и хрома (около 60%), основные примеси – углерод (до 5%), кремний (до 8%), сера (до 0,05%), фосфор (до 0,05%). Феррохром применяют для производства легированных сталей.



**Чтобы получить чистый хром, реакцию ведут следующим образом:**


1) сплавляют хромит железа с карбонатом натрия (кальцинированная сода) на воздухе:





2) растворяют хромат натрия и отделяют его от оксида железа;

3) переводят хромат в дихромат, подкисляя раствор и выкристаллизовывая дихромат;

4) получают чистый оксид хрома восстановлением дихромата углём:






5) с помощью алюминотермии получают металлический хром:





С помощью электролиза получают электролитический хром из раствора хромового ангидрида в воде, содержащего добавку серной кислоты. При этом на катодах совершаются в основном 3 процесса:

- 1) восстановление шестивалентного хрома до трехвалентного с переходом его в раствор;
- 2) разряд ионов водорода с выделением газообразного водорода;
- 3) разряд ионов, содержащих шестивалентный хром с осаждением металлического хрома;



# Химические свойства

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, **Cr**, Fe, Co, Sn, Pb, H<sub>2</sub>, Cu, Hg, Ag, Au

+ O<sub>2</sub> + неметаллы

+ H<sub>2</sub>O

+ растворы HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

+ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (конц.), HNO<sub>3</sub>

+ растворы солей

+ щелочные расплавы окислителей




При комнатной температуре хром химически мало активен из-за образования на его поверхности тонкой прочной оксидной пленки.

При нагревании оксидная пленка хрома разрушается, и он реагирует практически со всеми **неметаллами**, например:




*кислородом, галогенами, азотом, серой.*

Составьте уравнения реакций хрома с перечисленными неметаллами.

Рассмотрите данные реакции как окислительно-восстановительные.











$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления



$\text{O}_2^0$  – окислитель, процесс восстановления



$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления




$\text{Br}_2^0$  – окислитель, процесс восстановления





$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления

$\text{N}_2^0$  – окислитель, процесс восстановления





$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления

$\text{S}^0$  – окислитель, процесс восстановления



В *раскаленном состоянии* хром реагирует с парами воды:



Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn,  Fe, Co, Sn, Pb, H<sub>2</sub>, Cu, Hg, Ag, Au


В ряду напряжений хром находится левее водорода и поэтому в отсутствие воздуха может вытеснять водород из растворов соляной и серной кислот, образуя соли хрома (II).

Составьте уравнения реакций хрома с растворами соляной и серной кислот.

Рассмотрите данные реакции как окислительно-восстановительные.









$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления

$\text{HCl}$  (за счет  $\text{H}^{+1}$ ) – окислитель, процесс восстановления



$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления

$\text{H}_2\text{SO}_4$  (за счет  $\text{H}^{+1}$ ) – окислитель,

процесс восстановления






В присутствии кислорода  
хром реагирует с растворами  
кислот с образованием  
солей хрома (III)





Концентрированные серная и азотная кислоты на холоду *пассивируют* хром

*При сильном нагревании* кислоты растворяют хром с образованием солей хрома (III)






Рассмотрите эти реакции как окислительно-восстановительные

Расставьте коэффициенты.




Назовите окислитель и восстановитель.





$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления

$\text{H}_2\text{SO}_4$  (за счет  $\text{S}^{+6}$ ) – окислитель, процесс восстановления



$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления





$\text{HNO}_3$  (за счет  $\text{N}^{+5}$ ) – окислитель, процесс восстановления





Хром способен вытеснять многие металлы, например медь, олово, серебро и другие, из растворов их солей:


Составьте уравнение реакции хрома с раствором сульфата меди (II). Рассмотрите данную реакцию как окислительно-восстановительную.



$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисления

$\text{CuSO}_4$  (за счет  $\text{Cu}^{+2}$ ) – окислитель, процесс


восстановления



Растворы щелочей на хром практически не действуют.  
Хром реагирует с щелочными расплавами окислителей.

В качестве окислителей используют нитраты натрия, калия, хлорат калия и другие окислители.





При взаимодействии с щелочными расплавами окислителей хром образует соли анионного типа, в которых проявляет высшую степень окисления.



Рассмотрите эту реакцию как окислительно-восстановительную.  
Расставьте коэффициенты.

Назовите окислитель и восстановитель.





$\text{Cr}^0$  – восстановитель, процесс окисление

$\text{KClO}_3$  (за счет  $\text{Cl}^{+5}$ ) – окислитель, процесс восстановления



**Хром** - постоянная составная часть растительных и животных организмов. В крови содержится от 0,012 до 0,0035 % хрома. Хром имеет большое значение в метаболизме углеводов и жиров, а также участвует в процессе синтеза инсулина. Важнейшая его биологическая роль состоит в регуляции углеводного обмена и уровня глюкозы в крови. Элемент способствует нормальному формированию и росту детского организма. Снижение содержания хрома в пище и крови приводит к уменьшению скорости роста, увеличению холестерина в крови.





**Хром** важный компонент во многих легированных сталях. Используется в качестве износостойчивых и красивых гальванических покрытий (хромирование)  
Хром применяется для производства сплавов: хром-30 и хром-90, незаменимых для производства сопел мощных плазмотронов и в авиакосмической промышленности.



# Соединения хрома

## Соединения хрома (II)

оксид

гидроксид

соли

## Соединения хрома (III)

оксид

гидроксид

соли

## Соединения хрома (VI)

оксид

гидроксид

соли



# Соединения хрома (II)




Оксид хрома (II) – кристаллы черного цвета, имеет **основный характер**

При осторожном нагревании гидроксида хрома (II) в отсутствии кислорода получают оксид хрома (II). Составьте уравнение реакции.









При более высоких температурах оксид хрома (II) диспропорционирует:



Составьте уравнение реакции оксида хрома (II) с соляной и серной кислотами. Рассмотрите реакции с точки зрения ТЕД.





---






Оксид хрома (II) – сильный **восстановитель**.  
Кислородом воздуха окисляется до оксида хрома (III)


Составьте уравнение реакции.  
Рассмотрите данную реакцию как окислительно-восстановительную.



CrO (за счет  $\text{Cr}^{+2}$ ) – восстановитель, процесс окисления  
 $\text{O}_2$  – окислитель, процесс восстановления






## Гидроксид хрома (II)







Гидроксид хрома (II) получают в виде желтого осадка действием растворов щелочей на соли хрома (II) *без доступа воздуха*.

Составьте уравнение реакции получения гидроксида хрома (II) действием гидроксида натрия на хлорид хрома (II). Рассмотрите реакцию с точки зрения ТЕД.



Гидроксид хрома (II) обладает **ОСНОВНЫМИ СВОЙСТВАМИ**.




Составьте уравнение реакции гидроксида хрома (II) с соляной кислотой. Рассмотрите реакцию с точки зрения ТЕД





Гидроксид хрома (II) – сильный **ВОССТАНОВИТЕЛЬ**.  
Кислородом воздуха окисляется до гидроксида хрома (III)

Составьте уравнение реакции. Рассмотрите данную реакцию как окислительно-восстановительную.



$\text{Cr}(\text{OH})_2$  (за счет  $\text{Cr}^{+2}$ ) –восстановитель, процесс окисления  
 $\text{O}_2$  – окислитель, процесс восстановления





# Соли хрома (II)

Водные растворы солей хрома (II) получают без доступа воздуха растворением металлического хрома в разбавленных кислотах в атмосфере водорода или восстановлением цинком в кислой среде солей трехвалентного хрома.


Безводные соли хрома (II) белого цвета, а водные растворы и кристаллогидраты — синего цвета.

Соединения хрома (II) – **сильные восстановители**. Легко окисляются. Именно поэтому очень трудно получать и хранить соединения двухвалентного хрома.



Реагируют с концентрированными серной и азотной кислотами:











Рассмотрите эти реакции как окислительно-восстановительные. Расставьте коэффициенты..










# Соединения хрома (III)




Оксид хрома (III) – тугоплавкий порошок темно-зеленого цвета.

Получение:  
В лабораторных условиях термическим разложением дихромата аммония:






В промышленности восстановлением дихромата калия коксом или серой:



Оксид хрома (III) обладает **амфотерными** свойствами

При взаимодействии с кислотами образуются соли хрома (III):



Составьте уравнение реакции оксида хрома (III) с соляной кислотой. Рассмотрите реакцию с точки зрения ТЕД.







При сплавлении оксида хрома (III) с оксидами, гидроксидами и карбонатами щелочных и щелочноземельных металлов образуются хроматы (III) (хромиты):








Оксид хрома (III) нерастворим в воде.










В окислительно-восстановительных реакциях оксид хрома (III) ведет себя как восстановитель:








---



Рассмотрите эти реакции как окислительно-восстановительные.  
Расставьте коэффициенты.







# Оксид хрома (III) – катализатор

В присутствии оксида хрома (III) аммиак окисляется кислородом воздуха до монооксида азота, который в избытке кислорода окисляется до бурого диоксида азота.








## Каталитическое окисление этанола

Окисление этилового спирта кислородом воздуха происходит очень легко в присутствии оксида хрома (III)

Реакция окисления спирта протекает с выделением энергии. Продукт реакции окисления спирта - уксусный альдегид.





# Гидроксид хрома (III)





Получают **гидроксид хрома (III)** действием растворов щелочей или аммиака на растворы солей хрома (III).

## *Лабораторный опыт № 1*

К раствору хлорида хрома (III) прилейте раствор аммиака. Что наблюдаете?


Составьте уравнение реакции получения  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  действием раствора аммиака на хлорид хрома (III):






## Лабораторный опыт № 2

Осадок, полученный в опыте № 1 разделите на две части, к одной из них добавьте раствор соляной кислоты, а к другой – щелочь. Что происходит?




Какими свойствами обладает гидроксид хрома (III)?



Осадок, полученный в опыте № 1 разделите на две части, к одной из них добавьте серной кислоты, а к другой – щелочь. Что происходит?




Гидроксид хрома (III) обладает **амфотерными** свойствами.  
При взаимодействии с кислотами образуются соли хрома (III):  
Составьте уравнение реакции гидроксида хрома (III) с соляной кислотой. Рассмотрите реакцию с точки зрения ТЕД.







Гидроксид хрома (III) растворяется в щелочах


---



гексагидроксохромат (III) натрия  
(изумрудно-зеленый)




При нагревании гидроксид хрома (III) разлагается:



# Соли хрома (III)

Хроматы (III) устойчивы в щелочной среде. Они легко реагируют с кислотами:


недостаток кислоты:




избыток кислоты:




с угольной кислотой



В растворе подвергаются полному гидролизу:




В водных растворах катион  $\text{Cr}^{3+}$  встречается только в виде гидратированного иона  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ , который придает раствору сине-фиолетовый цвет.



Сульфат хрома (III) образует двойные соли – хромовые квасцы. Из смешанного раствора сульфата хрома (III) и сульфата калия кристаллизуется двойная соль –  $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  сине-фиолетового цвета.








Применяются в качестве дубящего вещества при изготовлении эмульсий, а также в дубящих растворах и дубящих фиксажах.



Соединения хрома (III) могут проявлять как окислительные так и восстановительные свойства.









---









Рассмотрите эти реакции как окислительно-восстановительные. Расставьте коэффициенты.

Назовите окислитель и восстановитель.








Оксид хрома (VI)  $\text{CrO}_3$  — хромовый ангидрид,

представляет собой темно-красные игольчатые кристаллы.

Получают  $\text{CrO}_3$  действием избытка концентрированной серной кислоты на насыщенный водный раствор дихромата натрия:



При нагревании выше  $250\text{ }^\circ\text{C}$  разлагается:



Оксид хрома (VI) **очень ядовит.**





## $\text{CrO}_3$ — кислотный оксид.


При растворении в воде образует кислоты.

С избытком воды образуется хромовая кислота  $\text{H}_2\text{CrO}_4$




При большой концентрации  $\text{CrO}_3$  образуется дихромовая

кислота  $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



которая при разбавлении переходит в хромовую кислоту:




Эти кислоты – неустойчивые. Существуют только в растворе.

Между ними в растворе устанавливается равновесие






При взаимодействии  $\text{CrO}_3$  со щелочами образуются **хроматы**





## CrO<sub>3</sub> является сильным окислителем

Например этанол, ацетон и многие другие органические вещества самовоспламеняются или даже взрываются при контакте с ним.




Окисляет йод, серу, фосфор, уголь.







# Окисление ацетона хромовым ангидридом.



Если поместить оксид хрома на фарфоровую пластинку и капнуть на него несколько капель ацетона, то через несколько секунд ацетон загорается. При этом оксид хрома (VI) восстанавливается до оксида хрома (III), а ацетон окисляется до углекислого газа и воды.



Оксиду хрома (VI) соответствуют две кислоты – хромовая  $\text{H}_2\text{CrO}_4$  и дихромовая  $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$





## Хромовая кислота —


кристаллическое вещество красного цвета; выделена в свободном состоянии при охлаждении насыщенных водных растворов  $\text{CrO}_3$ ; хромовая кислота — электролит средней силы. Изополихромовые кислоты существуют в водных растворах, окрашенных в красный цвет





# СОЛИ

**хроматы** – соли хромовой кислоты устойчивы в щелочной среде, при подкислении переходят в оранжевые **дихроматы**, соли двуххромовой кислоты. Реакция обратима, поэтому при добавлении щелочи желтая окраска хромата восстанавливается.




**хромат**  
**ы**

$\text{H}^+$

**дихромат**  
**ы**

$\text{OH}^-$






## Лабораторный опыт № 3






К раствору дихромата калия добавьте гидроксид калия.  
Как изменилась окраска? Чем это вызвано?

К полученному раствору добавьте  
серной кислоты до восстановления  
желтой окраски.

Напишите уравнения реакций.










## Взаимопревращение хроматов и дихроматов

Оксиду хрома (VI) соответствуют две кислоты – хромовая  $\text{H}_2\text{CrO}_4$  и дихромовая  $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ . Хромат калия  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  и дихромат калия  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  – соли этих кислот. Хроматы – желтого цвета, дихроматы – оранжевого. В кислой среде хромат-ион превращается в дихромат-ион. В присутствии щелочи дихроматы снова становятся хроматами. Хромат калия превращаем в дихромат, добавляя кислоту. Желтый раствор становится оранжевым.






В стакан с дихроматом калия добавляем щелочь, оранжевый раствор становится желтым – дихроматы превращаются в хроматы.








Соединения хрома (VI) –  
**СИЛЬНЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ**



## Окислительные свойства дихроматов






Дихроматы, например дихромат калия  $K_2Cr_2O_7$  – сильные окислители. Под действием восстановителей дихроматы в кислой среде переходят в соли хрома (III). Примером такой реакции может служить окисление сульфита натрия раствором дихромата калия в кислой среде. К раствору дихромата калия добавляем серную кислоту и раствор сульфита натрия.






Оранжевая окраска, характерная для дихроматов, переходит в зеленую. Образовался раствор сульфата хрома (III) зеленого цвета. Соли хрома - ярко окрашены, именно поэтому элемент получил такое название: "хром", что в переводе с греческого означает "цвет, краска".

ОПЫТ
























Дихроматы проявляют окислительные свойства не только в растворах, но и в твердом виде:











Рассмотрите эти реакции как окислительно-восстановительные.  
Расставьте коэффициенты.












Дихромат калия (хромпик) широко применяется как окислитель органических соединений:





Хроматы щелочных металлов плавятся без разложения, а дихроматы при высокой температуре превращаются в хроматы

Дихромат аммония разлагается при нагревании:





В ряду гидроксидов хрома различных степеней окисления




закономерно происходит ослабление основных свойств и усиление кислотных. Такое изменение свойств обусловлено увеличением степени окисления и уменьшением ионных радиусов хрома. В этом же ряду последовательно усиливаются окислительные свойства.

Соединения Cr (II) — сильные восстановители, легко окисляются, превращаясь в соединения хрома (III).

Соединения хрома(VI) — сильные окислители, легко восстанавливаются в соединения хрома (III).

Соединения хрома (III), могут при взаимодействии с сильными восстановителями проявлять окислительные свойства, переходя в соединения хрома (II), а при взаимодействии с сильными окислителями проявлять восстановительные свойства, превращаясь в соединения хрома (VI).



# Соединения хрома

Степень окисления хрома	+2	+3	+6
Оксид	CrO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CrO <sub>3</sub>
Гидроксид	Cr(OH) <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	Cr(OH) <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>

Кислотные и окислительные свойства возрастают

Основныe и восстановительные свойства возрастают

- 
- Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы. – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания.
  - Химия. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Дону: Легион
  - Химия. Пособие для поступающих в вузы /О.О. Максименко. – М. : Филол. о-во СЛОВО: Изд-во Эксмо
  - Интернет-ресурсы (картинки, видеофрагменты: 1) Единая образовательная коллекция цифровых ресурсов. Химия. Неорганическая химия. Металлы побочных подгрупп. Хром. Видеоопыты. <http://school-collection.edu.ru/>
  - 2) Образовательная коллекция  
Химия для всех XXI  
Химические опыты со взрывами и без