


Үй тапсырмасын тексеру


Сұрак – жауап

1. *Оттекті органикалық қосылыстарға қандай кластарды жатқызуға болады?*
2. *Олардың көмірсүтектерден қандай айырмашилығы бар?*
3. *Альдегидтерге тән сапалық реакция қалай аталауды?*
4. *40% формальдегид ерітіндісі қалай аталауды?*
5. *Күміс айна реакциясы дегеніміз не?*




Сабактың тақырыбы:

*Карбон
қышкылдары*



1. Карбон қышқылдарының құрамы

Молекуласында – COOH карбоксил тобы болады.



немесе



2. Карбон қышқылдарының жіктелуі.

1. Көмірсүтек радикалының табиғатына
байланысты жіктеу.

Карбон қышқылдары


Қаныққан

Қанықпаған

Ароматты

CH_3COOH сірке (этан)
қышқылы, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
пропион (пропан)
қышқылы, $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{COOH}$
стеарин қышқылы

$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOH}$
пропен (акрил)
қышқылы,
 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ олеин
қышқылы



Карбон қышқылдары

Бірнегізді

Көпнегізді


CH_3COOH – сірке қышқылы,
 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOH}$ акрил
қышқылы

$\text{HOOC} - \text{COOH}$ қымыздық
қышқылы
 $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ янтарь
қышқылы


Қосымша функциональды топтары бар қышқылдарда болады




3. Карбоксил тобының құрылышы




T: құмырсқа қышқылы құрылымдық формуласы




Электрондық формуласы




4. Атаулары және изомерлері



2 метилпропан қышқылы




2,2 диметилпропан қышқылы



3,3 диметилбутан
қышқылы



$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ май немесе бутан
қышқылы



Изомай немесе метилпропан
қышқылы



5. Карбон қышқылдарының табиғатта кездесуі және алу жолдары






6. Физикалық қасиеттері:



И, сұйық, H_2O Ем


Жағымсыз иісті

Қайнау температурасы спирттерге қарағанда карбон қышқылдарында жоғары болады. Себебі: 2 карбон қышқылдарының арасында молекулааралық сутектік байланыс түзіліп димерленді.




7. Химиялық қасиеттері

Төрт түрлі реакция жүреді



диссоциациялану, тұз түзілу




*күрделі эфир, ацилгалогенид тұзу, тотықсыздану
реакциясы*






|| ||


5. Күрделі эфир тұзілуі (этерификациялау)



6. Декарбоксилдену



8. Көмірсүтек радикалы бойынша реакцияға түсі



*Жаңа сабакты
пысықтау*

Тест сұрақтары

“
”

6. Сірке қышқылының молекулалық массасы. CH_3COOH

- A) 24 c) 39 e) 60
B) 40 д) 70



7. Мына қышқыл  қай топқа жіктеледі.

- A) альдегид с) ароматты қышқыл е) қаныққан қышқыл
B) спирт д) қанықпаған қышқыл

8. Карбон қышқылының спирттермен әрекеттесуі.

- A) гидрогендену с) орынбасу реакциясы
B) эфирлену реакциясы д) диссоциациялану
Е) жану реакциясы

9. Алдегидтердің жалпы формуласы.

- A) R-COOH с) R-COH e) R-O-R₁
B) R-OH д) R-NH₂

10. Молекуласында екі түрлі карбоксил тобы болатын қышқыл.

- A) сірке қышқылы с) бензой қышқылы е) сұт қышқылы
B) фтал қышқылы д) қымыздық қышқылы


Білемін	Білгім келеді
1.Молекуласында карбоксил тобы болады.	1.Халықаралық атаулары. Мыс: метан қышқылы, этан қышқылы
2.Сірке қышқылы бір негізді әлсіз қышқыл.	2.Этерификация реакциясы.
3.Сірке қышқылы зат алмасу процесіне қатысады.	3.Декарбоксилдену реакции.
4.Қаныққан карбон қышқылдары иісті, суда ерімейді.	4.Химия өнеркәсібінде сірке қышқылының алынуы.

Колданылуы

Карбон қышқылдарының құрамында R – COOH карбоксил тобы толады. Карбон қышқылдары әлсіз қышқылдар, карбон қышқылдарытындылары өнеркәсіппен тұрмыста кең колданылады.

Колданылуы

1. Дәрі-дәрмектер
2. Тұздар
3. Ацетат жібегі
4. Тамақ өнеркәсібі
5. Жемістер эссенциясы
6. Лактардың еріткіші
7. Өсімдік зиянкестерімен күресте
8. Өсімдіктердің өсуін тездете тін заттар
9. Мата бояуда
10. Кинопленкаларда



Үйге тапсырма

§10.1; 10.2; 10.3 оқу

Бағалау