



# Алканы

Урок в 10 классе



# Оглавление



Определение

Гомологического ряда метана

Строение молекулы метана

Номенклатура

Изомерия

Получение

Физические свойства

Химические свойства Химические  
свойства\_ Химические свойства (реакции  
замещения,


креминг

креминг, изомеризация

креминг, изомеризация, окисление)

Применение





*Углеводороды, в молекулах которых атомы углерода связаны между собой простой одинарной связью, а все остальные валентности насыщены атомами водорода, называются предельными или насыщенными углеводородами, или же алканами, или парафинами.*



# Гомологического ряда метана

Предельные углеводороды образуют гомологический ряд с общей формулой



*Родоначальником этого ряда является метан.*

*Соединения, сходные по строению, а значит и по химическим свойствам, и отличающиеся друг от друга на одну или несколько групп  $CH_2$ , называются гомологами.*

## Гомологический ряд алканов


$CH_4$	метан
$CH_3CH_3$	этан
$CH_3CH_2CH_3$	пропан
$CH_3CH_2CH_2CH_3$	бутан
$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$	пентан
и так далее...	

Общая формула:  $C_nH_{2n+2}$




# Строение молекулы метана

В результате гибридизации одной  $2s$ - и трех  $2p$ -орбиталей образуются четыре равноценные  $sp^3$ - гибридные орбитали. Вследствие взаимного отталкивания  $sp^3$ - гибридные орбитали направлены в пространстве к вершинам тетраэдра и углы между ними равны  $109^\circ 28'$  (наиболее выгодное расположение). Расстояние между соседними углеродными атомами 0,154 нм, энергия связи 350 кДж. Каждая  $sp^3$ - гибридная орбиталь при перекрывании с  $s$ -орбиталью атомов водорода образует с ними четыре, так называемые,  $\sigma$ -связи.




---

**σ-Связь** – это одинарная ковалентная связь, образованная при перекрывании орбиталей по прямой, соединяющей ядра атомов, с максимумом перекрывания на этой прямой.




# Номенклатура




- За основу принимают название углеводорода, которому соответствует в рассмотренном соединении самая длинная цепь.
- Эта цепь нумеруется, начиная с того конца, к которому ближе радикал-заместитель.
- В названии вещества цифрой показывают место радикала-заместителя и называют заместитель.
- Затем называют углеводород, которому отвечает главная цепь.



# Изомерия




Для алканов характерна изомерия углеродного скелета. Многочисленность углеводородов объясняется явлением изомерии. Для алканов характерна изомерия углеродного скелета. Многочисленность углеводородов объясняется явлением изомерии. С возрастанием числа атомов углерода в молекуле число изомеров резко увеличивается. Так, у бутана – 2, у пентана -3, у гексана – 5, у декана – 75.



и бутан



# Изомерия




**Изомерия** – явление, при котором вещества, имеющие один и тот же качественный и количественный состав, отличаются по своим свойствам.

**Изомеры** – химические соединения, имеющие одинаковый состав и молекулярную массу, но отличающиеся строением молекул, физическими и химическими свойствами.




# Получение



## 1. Без изменения углеродного скелета.

а) гидрирование непредельных или циклических углеводородов в присутствии катализаторов (платины, палладия, никеля).




## 2. С увеличением углеродного скелета.

б) Реакция Вюрца, заключающаяся в действии металлического натрия на моногалогенопроизводные углеводородов.



в) Реакция Вюрца – Гриньяра



г) Электролиз по Кольбе



**3. С уменьшением углеродной цепи.**

д) В лабораторной практике их получают при сплавлении солей карбоновых кислот со щелочами.



**4. Метан также можно получить гидролизом карбида алюминия.**



# **Запомните!**

---

**Алканы получают:**

- 1. Из нефти;
- 2. Из природного и попутного газа;
- 3. Из солей карбоновых кислот (реакция Дюма);
- 4. Из галогеналканов (синтезы Вюрца и Вюрца-Гриньяра);
- 5. Электролизом по Кольбе.




# Физические свойства


В обычных условиях первые четыре члена гомологического ряда алканов – газы,  $C_5$ – $C_{17}$  – жидкости, а начиная с  $C_{18}$  – твердые вещества.

Температуры плавления и кипения алканов, их плотности увеличиваются с ростом молекулярной массы.

Все алканы легче воды, в ней не растворимы, однако растворимы в неполярных растворителях (например, в бензоле) и сами являются хорошими растворителями.



# Химические свойства



Предельные углеводороды в обычных условиях не взаимодействуют ни с концентрированными кислотами, ни со щелочами, ни даже с таким активным реагентом как перманганат калия.


Для них свойственны *реакции замещения* водородных атомов и *расщепления*. Эти реакции вследствие прочности связей С–С и С–Н протекают или при нагревании, или на свету, или с применением катализаторов.





## I. Реакции замещения

### 1) Галогенирование – замещение атома водорода атомом галогена.

Она протекает обычно на свету или при нагревании. Замещение атома водорода галогеном легче всего идет у менее гидрогенизированного третичного атома углерода, затем у вторичного и в последнюю очередь у первичного. (Эта закономерность объясняется тем, что энергия связи атома водорода с первичным, вторичным и третичным атомами углерода неодинакова: она составляет соответственно 415, 390 и 376 кДж/моль).



2) При нагревании их до 140°C с разбавленной (10%-ной) азотной кислотой под давлением осуществляется реакция ***нитрования – замещение атома водорода нитрогруппой*** (реакция М.И.Коновалова). Наилучшие результаты наблюдаются с алканами, содержащими третичные углеродные атомы.



3) ***Сульфирование – замещение атома водорода сульфогруппой.*** При нагревании конц. серная кислота («дымящаяся») дает с высшими парафинами сульфокислоты.




# Запомните!

---


- Для алканов характерны реакции замещения атомов водорода на другие атомы или группы атомов.
- В этих реакциях водород никогда не выделяется, а образуется галогеноводород.
- Замещение у алканов идет в первую очередь по менее гидрогенизированному атому углерода.



## II. Термическое превращение алканов




1. При высокой температуре в присутствии катализаторов предельные углеводороды подвергаются расщеплению, которое называется *кrekингом*.




2. *Дегидрирование* – отщепление водорода с образованием непредельных углеводородов. Так, метан при  $1500^\circ\text{C}$  приводит к ацетилену.






3. Под влиянием катализаторов при нагревании углеводороды нормального строения подвергаются *изомеризации* – перестройке углеродного скелета с образованием алканов разветвленного строения.



### III. Окисление





В обычных условиях алканы устойчивы к действию кислорода и окислителей. При поджигании на воздухе алканы горят, превращаясь в двуокись углерода и воду и выделяя большое количество тепла.



# Применение

Первый в ряду алканов – метан – является основным компонентом природных и попутных газов и широко используется в качестве промышленного и бытового газа. Перерабатывается в промышленности в ацетилен, газовую сажу, фторо- и хлоропроизводные. Низшие члены гомологического ряда используются для получения соответствующих непредельных соединений реакцией дегидрирования. Смесь пропана и бутана используется в качестве бытового топлива. Средние члены гомологического ряда применяются как растворители и моторные топлива. Высшие алканы используются для производства высших жирных кислот, синтетических жиров, смазочных масел и т.д.





# Источники информации

- 1.Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т.  
Органическая химия. Учебник для вузов./ Под  
ред. Петрова А.А. – М.: Высшая школа, 1981.**
- 2.Хомченко Г.П. Пособие по химии для  
поступающих в вузы. – М.: ООО «Издательство  
Новая Волна», 2002.**
- 3.Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах.  
Серия «Школа в клеточку». – М.: «Лист», 1997.**

