

# **СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ**

**Серологические реакции** – это реакции между антигенами и антителами **in vitro** .

### **Цели применения:**

- серодиагностика бактериальных и вирусных инфекционных заболеваний;
- сероидентификация выделенных культур различных микроорганизмов (определение родовой, видовой и типовой принадлежности микроорганизма или его антигенов с известными иммунными сыворотками);
- идентификация видовой принадлежности белков (выявление фальсификации мясных и рыбных изделий).

# Классификация серологических реакций в зависимости от характера и физического состояния антигена

- **Прямые** серологические реакции, основанные на прямом взаимодействии антигена с антителом (агглютинация, преципитация).
- **Опосредованные** реакции – реакции со свидетелями (реакция непрямой гемагглютинации, реакция связывания комплемента).
- **Реакции с использованием меток** (ферментных, флюоресцирующих и т.д.) для антигена или антитела (иммуноферментный анализ, реакция иммунофлюоресценции, радиоиммунный анализ).


- **Титр сыворотки** – это наиболее высокое разведение сыворотки (наименьшее количество антител), при котором данная серологическая реакция будет положительной.
- **Специфичность** серологической реакции – способность **антигена** реагировать только с гомологичным **антителом**.
- **Чувствительность** серологической реакции - минимальное количество антигенов или антител, которое можно выявить с помощью данной реакции.

# Серологические реакции

1. Реакция агглютинации
2. Реакция преципитации
3. Реакции нейтрализации
4. Реакция связывания комплемента
5. Реакция иммунофлюоресценции
6. Радиоиммунологический анализ
7. Иммуноферментный метод (ИФА)


# Реакция агглютинации


Реакция агглютинации (agglutinatio - склеивание) - **склеивание и выпадение в осадок** корпускулярных антигенов: бактерий, эритроцитов, а также латексных частиц с адсорбированными на них антигенами под влиянием антител в среде с электролитом.



# Реакция непрямой геммагглютинации

РНГА применяют в двух вариантах: с известными антигеном для обнаружения **антител** или с известными антителами для выявления **антигена**. Для постановки РНГА используют **эритроцитарные диагностикумы**, приготовленные путем адсорбции на эритроцитах антигенов или антител в зависимости от цели исследования.





**В положительных случаях в лунке осадок имеет вид тонкой пленки из склеивающихся эритроцитов (зонтик).**



# Реакция преципитации


**Принцип:** При взаимодействии растворимого антигена с антителом в присутствии электролитов (NaCl) образуется **комплекс Аг-Ат в виде нерастворимого преципитата.**

- РП применяют в двух целях: **выявление антигенов** с помощью известной иммунной преципитирующей сыворотки или **антител** с использованием известных антигенов.
- Используется как **качественный**, так и **количественный** анализ (реакция Манчини).
- Очень чувствительная реакция для определения антигенов.
- С помощью РП определяют фальсификацию рыбных и мясных изделий.

# Варианты реакции преципитации

- в жидкой среде - по типу реакции флоккуляции , **кольцепреципитации**.
- в плотной среде (в агаре, полиакриламидном геле) - реакция преципитации по **Оухтерлони** , радиальная иммунодиффузия по Манчини , реакция **иммуноэлектрофореза**.

# Реакция кольцепреципитации



Реакцию проводят путем наслаивания на иммунную сыворотку антигена




-

+

Образование комплекса АГ-АТ

# Реакция преципитации в геле по Оухтерлони

- Реакция проводится в агаре на стеклах или в чашках Петри .
- В разные лунки в агаре вносится взвесь, содержащая антиген и иммунная сыворотка.
- Из лунок антиген и антитела диффундируют в питательную среду, вступают в иммунную реакцию и образуют полосы преципитации.






Полосы преципитации между антигенами в лунках G, E и иммунной сывороткой (антителами) в лунке A.

# Иммуноэлектрофорез

ИЭФ чаще всего используется для исследования антигенной структуры микроорганизмов.

## Принцип и последовательность проведения реакции

1. Антигенный комплекс помещают в лунку, которая находится в центре геля, залитого на стеклянную пластинку.
2. Через гель пропускают электрический ток, в результате происходит перемещение антигенов на неодинаковые расстояния соответственно своей электрофоретической подвижности.
3. В канавку вносят специфическую иммунную сыворотку.
4. Антигены и антитела диффундируют в геле навстречу друг другу. В месте их соприкосновения образуются



# Иммуноэлектрофоре



3

Лунки,  
содержащие смесь  
антигенов


Перемещение  
антигенов

Диффузия антител  
из канавки и  
образование полос  
преципитации

First step: ELECTROPHORESIS





Second step: DIFFUSION




Precipitation bands (mirror images  
on opposite sides of the trough)





# Серологические реакции, основанные на использовании меток



## МЕТКИ



- Ферментные
- Флюоресцирующие
- радиоизотопные

# Иммуноферментный анализ (ИФА или ELISA)


Метод ИФА или ELISA – это серологическая реакция , в которой для визуализации образовавшегося комплекса **антиген-антитело** используются **ферменты-метки** (пероксидаза хрена или щелочная фосфатаза). Эти маркерные (индикаторные) ферменты способны расщеплять субстрат и вызывать **изменение цвета среды**.

ИФА



Обнаружение антител

(a) Indirect ELISA




СЭНДВИЧ-  
МЕТОД

(b) Sandwich ELISA

ИФА





Обнаружение антигена



ИФА

Пример: обнаружение антител к ВИЧ




# Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)

РИФ основана на соединении антигенов бактерий и вирусов со специфическими антителами, меченными флюоресцирующими красителями. Образовавшиеся комплексы АГ-АТ становятся хорошо видимыми под **люминесцентным микроскопом.**

## Преимущества РИФ:


- простота,
- высокая чувствительность,




**Прямой метод РИФ** - непосредственное соединение антигена с меченым **флуоресцентным красителем** антителом.

**Непрямой метод (РНИФ)** – 1) образование комплекса антиген-антитело, 2) выявлении этого комплекса путем обработки его меченым **флуоресцентным красителем** антигаммаглобулином (АТ к АТ).


Прямой  
метод




Непрямой  
метод







# Люминесцентный микроскоп




# Реакция связывания комплемента

**РСК** основывается на **способности комплемента связываться с комплексом АГ + АТ**. Реакция протекает в две фазы. **Первая фаза - взаимодействие антигена и антитела**. К исследуемой сыворотке, содержащей антитела, добавляют известный антиген и стандартный комплемент, инкубируют при 37 ° С в течение одного часа.

**Вторая фаза - выявление результатов реакции при помощи индикаторной гемолитической системы** (эритроциты барана и гемолитическая сыворотка кролика, содержащая гемолитические антитела к эритроцитам барана). К смеси антиген + антитело + комплемент добавляют индикаторную систему и вновь инкубируют при 37° С в течение 30 - 60 мин. Если комплемент адсорбировался ранее на комплексе АГ + АТ (в исследуемой сыворотке специфические антитела присутствовали), то гемолиза эритроцитов не происходит.

При отсутствии же в исследуемой сыворотке специфических антител, комплекс АГ + АТ не образуется и комплемент остается несвязанным. При добавлении гемолитической системы комплемент

# Свойства комплемента



**Реакция гемолиза.** В присутствии комплемента под действием гемолитических антител взвесь эритроцитов превращается в «лаковую кровь» вследствие выхода гемоглобина. Реакция гемолиза используется в РСК как индикаторная: для тестирования присутствия или отсутствия

# РСК

