

Ühe muutuja funktsioon

Diferentsiaalarvutus

Ühe muutuja funktsioon

- Ptk 1
- 1.1 Funktsiooni mõiste
- 1.2 Funktsiooni esitus
- 1.3 Majanduses kasutatavad funktsioonid
- Ptk 2
- 2.1 Piirväärtus
- 2.2 Tuletisfunktsioon ja diferentsiaal

Funktsiooni mõiste

F-n on eeskiri, mille järgi reaalarvude alamruumi iga punkt teisendatakse üheselt mingiks kindlaks, eeskirjale vastavaks reaalarvuks

$$z = f(x)$$

$$f: X \subset R \rightarrow Z \subset R$$

Teisendatav reaalarvude alamruum X on funktsiooni määramispiirkond, tema iga punkti jaoks peab eeskiri olema rakendatav

Funktsiooni määramispiirkond

Reeglid määramispiirkonnale

- jagatise nimetaja ei tohi võrduda nulliga
- paarisjuure argument peab olema mittenegatiivne
- logaritmfunksiooni argument peab olema positiivne

Funktsiooni muutumiskiirkond

Määramiskiirkonna kõigi punktide eeskirjakohasel teisendamisel saadud reaalarvude alamhulk on funktsiooni muutumiskiirkond. Argumendi igale väärtusele vastab üks ja ainult üks funktsiooni väärtus. Funktsiooni mingi väärtus võib vastata ainult ühele argumentile (üks-ühene funktsioon) või mitmele argumentile

Funktsioon majanduses

Määramis- ja muutumispiirkond

$$f(x) = 100 - \sqrt{x + 4} \quad X = [-4; \infty[\quad Z =]-\infty; 100]$$

Toote nõudlusfunktsioon

$$q_D = 100 - \sqrt{p + 4} \quad p \geq 0 \quad q_D \geq 0$$

$$100 - \sqrt{p + 4} \geq 0 \quad 0 \leq p \leq 9996 \quad X_e = [0; 9996]$$

$$Z_e = [0; 98]$$

Ühe muutuja funktsioon

Funktsiooni graafik

Pöördfunktsioon

Funktsiooni piirväärtus

Tuletised

Ühe muutuja funktsiooni tuletis argumendi järgi on selle funktsiooni suhtelise muudu piirväärtus

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

Näiteks $y = x^2$

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2$$

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

Tuletised

Diferentseerimise reeglid

Tuletisfunktsioon (näitab uuritava funktsiooni muutumise kiirust)

Tuletise geomeetriline tõlgendus

Kõrgemat järku tuletised

Täisdiferentsiaalid

$$dy = y' dx$$

Kui dx on piisavalt väike, siis $\Delta y \approx dy$

Geomeetriline tõlgendus

$$d^2 y = y'' dx^2$$