




Информатика и ИКТ
10-11 класс

Системы счисления



- 
- **Система счисления** – это способ наименования и представление чисел с помощью символов. Такие символы в любой системе счисления называются **цифрами**.
 - **Алфавит системы счисления** – это совокупность символов, используемых в данной системе счисления.



Системы счисления

непозиционные

Система счисления, в которой значение цифры не зависит от ее позиции в записи числа.

Н-р: римская система счисления, алфавитная система счисления.

Римская система счисления


I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

позиционные

Система счисления, в которой значение цифры зависит от ее позиции в записи числа.

К позиционным системам счисления относятся десятичная, двоичная, восьмеричная, двенадцатеричная, шестнадцатеричная и др.


Основание позиционной системы счисления (q) – количество символов, используемых для записи числа.



Римская система счисления

Задание:

- 1. Переведите числа из римской системы счисления в десятичную – LXXXVI. XLIX. CMXCIX.**
- 2. Запишите десятичные числа в римской системе счисления – 464, 390, 2648.**
- 3. Где в настоящее время используется римская система счисления.**

- 
- Укажите какие числа записаны с ошибками. Ответ обоснуйте.

156_7 ; $3005,23_4$; $185,794_8$;
 1102_2 ; $1345,52_6$; $112,011_3$;
 $16,545_5$.

- В любой системе счисления натуральные числа, меньшие основания q , представляются с помощью одной цифры данной системы. Если число больше или равно q , то требуется две и более цифр.

Представление первых чисел в некоторых системах счисления

$q=10$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$q=2$	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010
$q=3$	0	1	2	10	11	12	20	21	22	100	101
$q=4$	0	1	2	3	10	11	12	13	20	21	22
$q=5$	0	1	2	3	4	10	11	12	13	14	20
$q=6$											

$q=16$ - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15)

Задание: заполните таблицу для $q=6$.

Представление чисел в позиционных системах счисления

разряды

2 1 0 -1 -2

$$N_{10} = 348,12 = 3*10^2 + 4*10^1 + 8*10^0 + 1*10^{-1} + 2*10^{-2}$$

Свернутая форма записи числа

развернутая форма записи числа

Любое действительное число можно записывать в любой позиционной системе счисления в

Задание5: Запишите в развернутой форме числа:

$$N_8 = 7764,1 =$$

$$N_5 = 2430,43 =$$

Задание6: Запишите число в десятичной системе



счисления: $11011_2 = \dots, 423,1_5 = \dots, 5A,121_6 = \dots$

Пример:



$$1011,012 = 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 + 0*2^{-1} + 1*2^{-2} - 2 = 8 + 2 + 1 + \frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}.$$

Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную ($N_{10} \square N_2$)

- Способ – деление на основание системы счисления



$$22_{10} = 10110_2$$







$$132_{10} = 204_8$$

$$126_{10} = 176_8$$

$$335_{10} = 14F_{16}$$

Перевод десятичных дробей в двоичную систему счисления



$$0,65625_{10} = 0,A8_{16}$$


Перевод десятичных дробей в двоичную систему счисления $(N_{10} \square N_2)$ (умножением на 2)

- Пример: $0,5625_{10} = N_2 = 0,1001_2$

0,	5625
	2
1	1250
	2
0	2500
	2
0	5000
	2
1	0000

Задание 10: переведите десятичные дроби в двоичную систему счисления с точностью до 6 знаков после запятой:

$0,7_{10}$ $0,4622_{10}$ $0,5198_{10}$ $0,5803_{10}$



Перевод смешанных чисел из десятичной системы счисления в двоичную

- **Алгоритм перевода:**
- **1) перевести целую часть;**
- **2) перевести дробную часть;**
- **3) сложить полученные результаты.**

Пример :перевести $17,25_{10}$ в двоичную систему счисления.

Решение:

$$\begin{aligned}1) \quad &17_{10} = 10001_2 \\2) \quad &0,25_{10} = 0,01_2 \\3) \quad &17,25_{10} = 10001,01_2\end{aligned}$$

Задание 11: переведите в двоичную систему счисления
числа: $40,5_{10}$

Задание. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 12 записывается как 110.

Найдите это основание.

Решение.


Сначала распишем число 110 через формулу записи чисел в позиционных системах счисления для нахождения значения в десятичной системе счисления, а затем найдем основание методом перебора.

$$110 = 1 * x^2 + 1 * x^1 + 0 * x^0 = x^2 + x$$

Нам надо получить 12. Пробуем 2: $2^2 + 2 = 6$. Пробуем 3: $3^2 + 3 = 12$.

Значит основание системы счисления равно 3.

Ответ. Искомое основание системы счисления равно 3.



В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 49 записывается в виде 100. Укажите это основание.

Ответ: 7

Решение: Обозначим основание искомой системы счисления как x .

$49 = x^2 * 1 + 0 * 0 = x^2 \Rightarrow x = \pm 7$. Основание системы счисления не может быть отрицательным, поэтому оно равно 7.