

# Скворцы





Скворцы имеют длинный, сильный, прямой [клюв](#) со слегка сплюснутым кончиком, прямой короткий [хвост](#), вершины которого достигают нижние кроющие перья, и острые крылья, у которых первое маховое [перо](#) укорочено, а второе длиннее остальных. Представителем скворцов может служить общеизвестный [обыкновенный скворец](#), живущий повсеместно в Европе. Обыкновенный скворец в брачном наряде чёрного цвета с фиолетовым и зелёным блеском и с белыми пестринками. К осени белые пестринки становятся крупнее и чаще. Молодые скворцы – буро-серого [цвета](#), с беловатую пятнистую грудью.



## Образ жизни

Гнездятся в дуплах. Питаются преимущественно наземными моллюсками и крупными насекомыми (гусеницами и кузнечиками). Потребляет также виноград, вишни, черешни и плоды других плодовых деревьев. Там, где мало плодовых садов и виноградников, скворец приносит большую пользу истреблением прямокрылых и личинок насекомых. Скворцы, как известно, охотно селятся в специально устраиваемых для них «[скворечниках](#)», безразлично — выставляются ли скворечники среди полей, или вблизи жилья, или даже на крышах домов, вокруг которых достаточно места, не занятого постройками, где бы скворцы могли отыскивать себе пищу. В неволе скворец скоро привыкает к растительной пище. Характерную особенность его составляет редкая способность подражать, безо всякого обучения, всевозможным звукам. Поэтому скворец легко заучивает отдельные слова и простые мотивы.




В течении двух недель оба партнера поочередно насиживают кладку из 4-6 яиц, а затем дружно заботятся о вечно голодном потомстве, встречающем громкими криками каждый прилет родителей с кормом : насекомыми и их личинками, моллюсками и червями. Подросшие проголодавшиеся птенцы, выпрашивая корм, с раскрытыми клювами сильно высовываются из лотка, рискуя выпасть. В возрасте трех недель они впервые вылетают из гнезда.

молодой

зима

самец летом



стая скворцов



дрозды



скворец



свиристель



иволга



зяблик