

19.02.13 ЖЫЛ

Сабақтың тақырыбы:




Сабақтың мақсаты:

Біліктілік: Оқушыларға сүйір бұрыштың тригонометриялық функциясының әрбір бұрышындағы синустың, косинустың, тангенстің, котангенстің келтіру формулаларымен таныстыру, осы формулаларды тригонометриялық өрнектерді түрлендіруде және есептерді шығару кезінде қолдануды үйрету;

Дамытушылық: Оқушылардың ақыл-ойын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру.

Тәрбиелік: Оқушылардың алгебра пәніне қызығушылығын арттыру, оқушыларды алғырлыққа, шапшандыққа тәрбиелеу.



Сабақтың жоспары:



I. Ұйымдастыру.

II. Үй тапсырмасын тексеру

III. Жаңа сабақ. “Ой қозғау”

IV. Бекіту бөлімі.

1. Сәйкестендіру тесті


2. “Математикалық жәрменке” деңгейлік тапсырмалар

V. Бағалау

Жаңа сабақ:

Егер $\frac{\pi}{2}k \pm \alpha$ бұрышының функциялары берілсе, онда оларды α бұрышына байланысты тригонометриялық функцияларға келтіру ыңғайлы.

Келтіру формулаларын $k = 1; 2; 3; 4$ болған жағдайда, $\frac{\pi}{2}k \pm \alpha$ өрнегін, яғни $\frac{\pi}{2} \pm \alpha; \pi \pm \alpha; \frac{3\pi}{2} \pm \alpha; 2\pi \pm \alpha$ бұрыштары үшін қарастырамыз.




OA=R α бұрышына бұрамыз,
 сосын $\pi/2 + \alpha$ бұрамыз. OA-
 OB-OB₁ радиусына бұрамыз.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{B_1D_1}{R} = \frac{y_1}{R}$$

$$\sin \alpha = \frac{BC}{R} = \frac{y}{R}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{B_1C_1}{R} = \frac{x_1}{R} \quad \cos \alpha = \frac{OC}{R} = \frac{x}{R}$$

ЕРЕЖЕ



«ЖҰМЫСТЫҚ»

бұрыштар арқылы
келтіру:

$$\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}; \dots$$



«Жазыңқы»

бұрыштар арқылы
келтіру:

$$\pi; 2\pi; 3\pi; \dots$$



Функцияның
аты

Ауысады

Ауыспайды

Таңбасы

оң жағының таңбасы сәйкес ширектегі
келтірілген функцияның таңбасымен бірдей
жазылады

Бұдан $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$
шығады.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha; \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha; \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha; \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha; \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha; \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$\sin(2\pi + \alpha) = \sin \alpha; \cos(2\pi + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha; \cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$$

Жоғарыдағы формулаларды пайдаланып, $\operatorname{tg}\alpha, \operatorname{ctg}\alpha$ -нің келтіру формуласын шығаруға болады.

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{ctg}\alpha; \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{tg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{tg}\alpha; \operatorname{ctg}(\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{ctg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{ctg}\alpha; \operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{tg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}(2\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{tg}\alpha; \operatorname{ctg}(2\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{ctg}\alpha$$



Есте сақта!!!

- Егер келтірілген тригонометриялық функцияның аргументі (бұрышы) $\pi \pm \alpha$ ($180 \pm \alpha$), $2\pi \pm \alpha$ ($360 \pm \alpha$) түрінде болса, онда оның аты өзгермейді.*
- Егер келтірілген тригонометриялық функцияның аргументі (бұрышы) $\pi/2 \pm \alpha$ ($90 \pm \alpha$), $3\pi/2 \pm \alpha$ ($270 \pm \alpha$) түрінде болса, онда синус косинусқа, косинус синусқа, тангенс котангенске, котангенс тангенске өзгереді;*
- Келтіру формуласының оң жағының таңбасы сәйкес ширектегі келтірілген функцияны таңбасымен бірдей жазылады.*

Келтіру формулалары:

X	$\frac{\pi}{2} + \alpha$ ($90^\circ + \alpha$)	$\frac{\pi}{2} - \alpha$ ($90^\circ - \alpha$)	$\pi + \alpha$ ($180^\circ + \alpha$)	$\pi - \alpha$ ($180^\circ - \alpha$)	$\frac{3\pi}{2} + \alpha$ ($270^\circ + \alpha$)	$\frac{3\pi}{2} - \alpha$ ($270^\circ - \alpha$)	$2\pi + \alpha$ ($360^\circ + \alpha$)	$2\pi - \alpha$ ($360^\circ - \alpha$)
sin x	Cos α	cos α	-sin α	sina	-cos α	-cos α	sina	-sina
cosx	-sina	sina	-cos α	-cos α	sina	-sina	cos α	cos α
tg x	-ctg α	ctg α	tg α	-tg α	-ctg α	ctg α	tg α	-tg α
ctg x	-tg α	tg α	ctg α	-ctg α	-tg α	tg α	ctg α	-ctg α

Мысалдар

1) $\cos \frac{7}{3}\pi$ мәнін есептейік

$$\cos \frac{7}{3}\pi = \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{3} \right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} 2) \sin(-780^0) &= -\sin(780^0) = \\ &= -\sin(2 \cdot 360^0 + 60^0) = -\sin 60^0 = \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Бекіту бөлімі:

1. Сәйкестендіру тесті(өрнекті ықшамда)

$\text{tg}(\pi-\alpha)$	$\cos \alpha$
$\text{ctg}(\pi+\alpha)$	$\text{tg } \alpha$
$\sin(360-\alpha)$	$-\text{tg}\alpha$
$\cos(360-\alpha)$	$\text{ctg}\alpha$
$\text{ctg}(360-\alpha)$	$-\sin\alpha$
$\text{tg}(360+\alpha)$	$-\text{ctg}\alpha$



Оқулықпен жұмыс №334

"Математикалық жәрменке"

Деңгейлік есептер



I деңгей

Өрнекті ықшамда:

$$1. \frac{\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)}{\operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha)}$$

$$2. \frac{\sin^2(180^\circ - \alpha) - 1}{\cos(360^\circ - \alpha)}$$



II деңгей

а) 75° ә) 150° б) 200° бұрыштарының барлық тригонометриялық функциясын аргументі 45-тан аспайтын функциямен ауыстырыңдар.

III деңгей

Өрнекті ықшамда:

$$1. \sin(90^\circ + \alpha) + \cos(180^\circ - \alpha) + \operatorname{tg}(270^\circ + \alpha) + \operatorname{ctg}(360^\circ - \alpha)$$

$$2. \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \cos(\pi - \alpha) + \operatorname{tg}(\pi - \alpha) - \operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)$$

$$3. \sin^2(270^\circ - \alpha) + \sin^2(360^\circ - \alpha) + \operatorname{ctg}^3(360^\circ - \alpha) - \operatorname{tg}^3(90^\circ + \alpha)$$

$$4. \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) \cdot \operatorname{tg}(2\pi - \alpha) - \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \sin^2(2\pi + \alpha)$$

I деңгей

Өрнекті ықшамда:

1. -1

2. $-\cos \alpha$



II деңгей

$a) \sin(90^\circ - 15^\circ) = \cos 15^\circ$	$a) \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 15^\circ$	$a) \sin(180^\circ + 20^\circ) = -\sin 20^\circ$
$\cos(90^\circ - 15^\circ) = \sin 15^\circ$	$\cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 15^\circ$	$\cos(180^\circ + 20^\circ) = -\cos 20^\circ$
$tg(90^\circ - 15^\circ) = ctg 15^\circ$	$tg(180^\circ - 30^\circ) = -tg 15^\circ$	$tg(180^\circ + 20^\circ) = tg 20^\circ$
$ctg(90^\circ - 15^\circ) = tg 15^\circ$	$ctg(180^\circ - 30^\circ) = -ctg 15^\circ$	$ctg(180^\circ + 20^\circ) = ctg 20^\circ$

III деңгей

Өрнекті ықшамда:


1. $-2ctg \alpha$

2. $2 \cos \alpha$

3. 1

4. -1


Үйге тапсырма:



*1. §21-оқу,
кесте
дайындау*

*2. №329,331
есептер.*

Сабақ аяқталды Рахмет





*Happy
Valentine's
Day*