

ЗАДАЧИ С2 НА ЕГЭ



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАДАНИЙ С2



Задачи на нахождение:

- Расстояния между двумя точками
- Расстояния от точки до прямой
- Расстояния от точки до плоскости
- Расстояния между скрещивающимися прямыми
- Угла между двумя прямыми
- Угла между прямой и плоскостью

МЕТОДЫ:

- **Поэтапно-вычислительный**
- **Координатно-векторный**
- **Метод параллельных прямых**
- **Метод параллельных прямых и плоскостей**
- **Метод объемов**
- **Метод ортогонального проектирования**

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости SMK , если $SC = 6$, $AB = 4$.


Координатно-векторный метод

$$M(x_0, y_0, z_0)$$

$$ax + by + cz + d = 0,$$

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.



Решение.

$$SO = \sqrt{SC^2 - OC^2} = \sqrt{6^2 - \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{92}{3}}$$


$$C\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}; 0; 0\right), \quad A\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}; -2; 0\right)$$

$$M\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{92}{3}}\right), \quad K\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{92}{3}}\right)$$

$$ax + by + cz + d = 0,$$

$$\begin{cases} \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot a + d = 0, \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot a - b + \sqrt{\frac{23}{3}} \cdot c + d = 0, \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot a + b + \sqrt{\frac{23}{3}} \cdot c + d = 0. \end{cases}$$

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.



Решение.

$$b = 0$$

$$a = -\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot d$$

$$c = -\frac{5\sqrt{3}}{4\sqrt{23}} \cdot d$$


В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.

Решение.


$$-\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot dx - \frac{5\sqrt{3}}{4\sqrt{23}} \cdot dz + d = 0$$

ИЛИ

$$\sqrt{69}x + 5\sqrt{3}z - 4\sqrt{23} = 0$$



В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.



Решение.

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$


$$\begin{aligned} \rho(A; CMK) &= \\ &= \frac{\left| \sqrt{69} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3} \right) + 0 \cdot (-2) + 5\sqrt{3} \cdot 0 - 4\sqrt{23} \right|}{\sqrt{(\sqrt{69})^2 + 0^2 + (5\sqrt{3})^2}} = \\ &= \frac{\sqrt{23}}{2}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{\sqrt{23}}{2}$


Метод объёмов

Если объем пирамиды $ABCM$ равен V_{ABCM} , то расстояние от точки M до плоскости α , содержащей треугольник ABC , вычисляется по формуле:

$$\rho(M, \alpha) = \rho(M, ABC) = MO = \frac{3V_{ABCM}}{S_{ABC}}$$




Объемы пирамид, имеющих общий трехгранный угол, относятся как произведения ребер, содержащих этот угол.



$$\frac{V_{ABCD}}{V_{AB_1C_1D_1}} = \frac{AB \cdot AC \cdot AD}{AB_1 \cdot AC_1 \cdot AD_1}$$

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.



Решение.

$$\rho(A; (CMK)) = \rho(S; (CMK))$$

$$\frac{V_{SKMC}}{V_{SABC}} = \frac{SM}{SA} \cdot \frac{SK}{SB} \cdot \frac{SC}{SC} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} V_{SKMC} &= \frac{1}{4} \cdot V_{SABC} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO = \\ &= \frac{1}{12} \cdot \sqrt{\frac{92}{3}} \cdot \frac{16\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{23}}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} MC &= \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot AC^2 + 2 \cdot SC^2 - AS^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^2 - 4^2} = \sqrt{17}. \end{aligned}$$

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.

Решение.


$$CP = \sqrt{MC^2 - \left(\frac{KM}{2}\right)^2} = \sqrt{17 - 1} = 4$$

$$S_{KMC} = \frac{1}{2} \cdot KM \cdot CP = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4.$$

$$\rho(A; KMC) = \rho(S; KMC) =$$

$$= \frac{3 \cdot V_{SKMC}}{S_{KMC}} = \frac{3 \cdot \frac{2\sqrt{23}}{3}}{4} = \frac{\sqrt{23}}{2}.$$

Ответ: $\frac{\sqrt{23}}{2}$



Поэтапно-вычислительный метод

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.


Решение.

1) Т.к. $BA \parallel KM$, то $BA \parallel (KMC)$

2) Пусть L – середина AB , тогда $SL \perp BA$ и $CL \perp BA$, значит, $BA \perp (SLC)$, поэтому $KM \perp (SLC)$, следовательно $(KMC) \perp (SLC)$


3) Т.к. $PC = (KM \cap (SLC))$, то $LH \perp PC$ и $LH \perp (KMC)$

LH – искомое расстояние



В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка S – вершина. Точка M – середина ребра SA , точка K – середина ребра SB . Найти расстояние от вершины A до плоскости CMK , если $SC = 6, AB = 4$.

Решение.



$$4) S_{LPC} = \frac{1}{2} \cdot PC \cdot LH \Rightarrow LH = \frac{2S_{LPC}}{PC}$$

$$5) \left. \begin{array}{l} S_{LPC} = \frac{1}{2} \cdot S_{LSC} \\ S_{LSC} = \frac{1}{2} \cdot LC \cdot SO \end{array} \right| \Rightarrow S_{LPC} = \frac{1}{4} \cdot LC \cdot SO = \sqrt{23}$$

$$6) PC = 4$$

$$7) \text{Из пунктов 4, 5, 6} \Rightarrow LH = \frac{\sqrt{23}}{2}$$

Ответ: $\frac{\sqrt{23}}{2}$

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**