

Приближенное решение уравнений

- Нелинейные уравнения с одной переменной подразделяются на
- алгебраические и трансцендентные

- **Определение:**

1. Уравнение $f(x)=0$, называется алгебраическим, если функция $f(x)$ является алгебраической. (содержит переменную x в различной степени)
2. Трансцендентное уравнение – уравнение не являющееся алгебраическим. Обычно это уравнение, содержащие показательные, логарифмические, тригонометрические; обратные тригонометрические функции.

Более строгое определение таково:

Трансцендентное уравнение – это уравнение вида $f(x)=g(x)$ где функции f и g являются аналитическими функциями, и по крайней мере одна из них не является алгебраической.

Определите тип уравнения:

1) $\cos 3x - 4x + 1 = 0$

2) $x^4 + e^{2x} = 0$

3) $5x^4 + 3x^2 - 4x + 5 = 0$

4) $3x^2 + 4x - \arccos x = 0$

Определение x_0 называется корнем уравнения $f(x)=0$, если при подстановке x_0 в это уравнение получаем верное равенство $f(x_0)=0$.

Если уравнение не решается точными методами, то находим корни уравнения численными методами:

Приближенный метод решения уравнения состоит из 2-х этапов

1) Отделение корней, т.е. определение таких отрезков, в каждом из которых содержится только один корень.

Используются а) графический метод


б) аналитический метод


2) Уточнение корней, т.е. доведение их до заданной степени точности

.

а) Графический метод:

Корнем уравнения являются абсциссы точек пересечения графика функции $y=f(x)$ с осью OX . (рис.1 точки x_1, x_0, x_2).





Если построение графика функции $y=f(x)$ вызывает затруднение, то уравнение $y=f(x)$ нужно представить в виде $f_1(x)=f_2(x)$, та чтобы построить графики функций $y=f_1(x)$; $y=f_2(x)$ было легко.

Корнями уравнения $f(x)=0$ будут являться абсциссы точек пересечения графиков функций $y=f_1(x)$ и $y=f_2(x)$.


ПРИМЕР 1


$$f(x) = x^2 - \sin x.$$

$$x^2 = \sin x$$

Строим графики функций

$$y = x^2 \text{ и } y = \sin x$$





Отделяющий отрезок $[a;b]$ достаточно малой длины следует выбрать так, чтобы значения $f(a)$ и $f(b)$ были разных знаков, т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Кроме того точки a , b нужно выбирать так, чтобы значения $f(a)$ и $f(b)$ можно было легко найти.

б) Аналитический метод:

ТЕОРЕМА. Если функция $f(x)$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$ и на его концах принимает значения разных знаков, то внутри этого отрезка содержится по крайней мере один корень

При этом используется теорема.

Если $f'(x)$ сохраняет знак на отрезке $[a, b]$ и корень находится внутри отрезка, то он единственный.

Алгоритм отделения корней:

1) Найти $f'(x)$

2) Решим уравнение $f'(x) = 0$, Пусть $x=a$; $x=b$. Корни этого уравнения

3) Определим знаки функции $f(a)$ и $f(b)$

-если знаки разные, следовательно на этом интервале есть один корень.

-если знаки одинаковы то корня на интервале нет.

Рассмотрим пример:

Пример 1 Отделить графически корни уравнения.

$$x^3 - 2x + 2 = 0$$

Преобразуем данное уравнение к виду


$$x^3 = 2x - 2$$

то есть равенство двух функций :

Корни исходного уравнения графиков этих абсцисс точек пересечения графиков этих функций.

На одной координатной плоскости построим графики функции

$$y_1(x) = x^3 \quad y_2(x) = 2x - 2$$



то есть корень принадлежит интервалу $[-2;-1]$

ПРИМЕР 2

$$x^5 - 2x^4 + x^3 - 1 = 0$$

Решение:

Найдем производную исходной функции

$$1) f'(x) = 5x^4 - 8x^3 + 3x^2 = x^2(5x^2 - 8x + 3)$$

Приравняем производную к 0. и решим уравнение

$$2) x=0 \quad 5x^2 - 8x + 3 = 0$$

$$x^2(5x^2 - 8x + 3) = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 64 - 60 = 4$$

$$x_1 = \frac{8-2}{10} = 0.6 \quad x_2 = 1$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0.6, \quad x_3 = 1$$

$$(-\infty; 0) \quad (0; 0.6) \quad (0.6; 1) \quad (1; +\infty)$$

$f(x)$ – монотонна в каждом из этих интервалах.

3) Определили знак функции на концах каждого интервала

$(-\infty; 0)$ $f(-\infty) < 0$; $f(0) = -1 < 0$ - т.е. на этом интервале корней нет.

$(1; 0.6)$ $f(0) < 0$ $f(0.6) < 0$ – корней нет.

$(0,6;1)$ $f(0.6)<0$ $f(1)=-1<0$ – корней нет.

$(1;+\infty)$ $f(1)=-1<0$ $f(+\infty)>0$ – есть корень – один действительный.

Сузим промежуток. Найдем значения функции при $x=2$
 $f(2)>0$ то есть корень уравнения лежит в интервале $[1;2]$

Таким образом корень исходного уравнения x_0 $(1;2)$

Уточнение корней

Метод простых итераций

Метод Ньютона (касательных)

Метод секущих

Метод хорд

Комбинированный метод

Метод половинного деления

Метод простых итераций

Идея метода: корень уравнения - это такое число, при подстановке которого в уравнение, оно обращается в верное равенство.

Если переписать исходное уравнение в виде $x=g(x)$, то при подстановке значения корня равенство сохранится.

Такой вид уравнения называется генерирующим соотношением.

Пусть x_0 будет исходным приближенным значением корня уравнения $x=g(x)$. Тогда в качестве следующего приближения примем: $x_1=g(x_0)$, второе приближение получим, подставив в правую часть уравнения первое приближение: $x_2=g(x_1)$ и т.д. В общем виде: $x_n=g(x_{n-1})$. Процесс получения последовательных приближений значения корня называется *итерационным*, а метод – методом простых итераций.

Для определения достижения точности пользуются неравенством $|f(x_n)| \leq \varepsilon$

или $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$.

■ Пример 1

■ 1) $2x + \lg(2x + 3) = 1$;

- Найдем приближенные значения корней графически; для этого уравнение удобно представить в виде $\lg(2x + 3) = 1 - 2x$ (рис.4). Из графика видно, что уравнение имеет один корень, лежащий в промежутке $[0; 0,5]$. Для уточнения его методом итераций приведем уравнений к виду $x = \varphi(x)$.

- Функцию $\varphi(x)$ будем искать из соотношения $\varphi(x) = \frac{f(x)}{k}$ считая, что $|k| \geq Q/2$, где $Q = \max_{[0; 0,5]} |f'(x)|$; число k имеет тот же знак, что и $f'(x)$ в промежутке $[0; 0,5]$.

- Находим

■ $f(x) = 2x + \lg(2x + 3) - 1$;

$$f'(x) = 2 + \frac{0,8686}{2x + 3};$$

$$Q = \max_{[0; 0,5]} f'(x) = 2 + \frac{0,8686}{2 \cdot 0 + 3} \approx 2,2895; f'(x) > 0 \text{ при } 0 \leq x \leq 0,5.$$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{2} = x - x - \frac{lq(2x+3)}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}lq(2x+3).$$

За начальное приближение возьмем $x_0 = 0$, все дальнейшие приближения, будем определять из равенства

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}lq(2x_n + 3).$$


Вычисления удобно располагать в таблице

n	x_n	$2x_{n+3}$	$lq(2x_n+3)$	$\frac{1}{2}lq(2x_n+3)$
0	0	3	0,4771	0,2386
1	0,2614	3,5228	0,5469	0,2734
2	0,2266	3,4532	0,5382	0,2691
3	0,2309	3,4618	0,5394	0,2697
4	0,2303	3,4606	0,5392	0,2696
5	0,2304	-	-	-

Ответ: $x \approx 0,230$

■ Метод Ньютона (касательных)

- Проведем касательную к кривой $y=f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$. Она пересечет ось Ox в некоторой точке x_1 .
- Так как тангенс угла наклона касательной к графику функции в точке $(x_0, f(x_0))$ равен производной функции в этой точке, можно найти расстояние между точками x_0 и x_1 , обозначим это расстояние



$$\Delta x = \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

- Тогда координату точки x_1 можно определить следующим образом:

$$x_1 = x_0 - \Delta x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

- Аналогично можно найти точки $x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$
- Таким образом, для расчета приближений в методе Ньютона используется формула:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

- Счет прекращается при достижении достаточного малого значения $|f(x_n)| \leq \varepsilon$.
- Это самый быстрый метод. Скорость сходимости в большей мере зависит от удачного выбора исходной точки.
- Если в процессе вычислений на каком-то шаге тангенс угла наклона касательной обращается в нуль, т.е. $f'(x)=0$, то применение метода усложняется.

- Сходимость метода обеспечивается при следующих условиях:
- x_0 выбрано достаточно близко к корню уравнения $f(x)=0$;
- Вторая производная $f''(x)$ не становится очень большой;
- Первая производная $f'(x)$ не слишком близко к нулю. Последнее условие означает, что никакие два корня не находятся слишком близко один к другому.

- **Пример1**

- 1) $\text{tg}(0,55x+0,1) = x^2$;
- Выше мы установили, что уравнение имеет действительный корень, принадлежащий промежутку $[-1,0]$. Уточним этот корень методом касательных. Так как $f(-1) < 0$, $f(0) > 0$ и $f''(x) < 0$, то за начальное приближение принимаем $x_0 = -1$.
- Для вычисления применяем формулу

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- Находим

$$f(x) = x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5; f'(x) = 3x^2 - 0,4x + 0,5$$

- Для вычислений используем таблицу:

n	x_n	$x \frac{2}{n}$	$x \frac{3}{n}$	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$h = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	-1	1	-1	-0,2	3,9	-0,051
1	-0,949	0,9006	-1,8547	-0,0093	3,5814	-0,0026
2	-0,9464	0,8957	-1,8477	-0,0004	3,5657	-0,00001

- Ответ: $x \approx -0,946$

■ Метод секущих


- недостатком метода Ньютона состоит в том, что приходится дифференцировать функцию $f(x)$. Заменяем производную, используемую в методе Ньютона, отношением разностей:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

- Тогда формула примет вид:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f(x_i) - f(x_{i-1})} \cdot (x_i - x_{i-1})$$

- Рассмотрим графическую интерпретацию метода.



- Выберем

начальное приближение x_0 и рядом с ним достаточно близко возьмем точку x_1 . Нередко в качестве точки x_1 берут значение

- $$x_1 = x_0 + \varepsilon$$

- Через точки $f(x_0)$ и $f(x_1)$ проведем прямую – секущую. Она пересекает ось Ox в некоторой точке x_2 . Вычислим координаты этой точки. Для этого воспользуемся уравнением прямой, проходящей через две точки:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$$

- Т.к. искомая точка лежит на оси Ox , то ордината этой точки, т.е. y равна нулю. Следовательно, получим следующую формулу:


$$x_2 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} \cdot (x_1 - x_0)$$

- это и есть формула метода секущих.

- Последующие приближения будем получать, используя эту же формулу до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность, т.е. $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$.
- Метод секущих, так же, как и метод касательных, сходится не всегда. Причины сходимости – те же, что и у метода касательных.

■ Метод хорд


- Метод хорд легко получается из метода секущих. Если в качестве начальных приближений выбрать не две рядом лежащие точки, а концы отрезка, содержащего искомый корень (мы его получили на этапе отделения корней), можно избежать существенного недостатка предыдущих методов – возможную расходимость метода. Метод хорд сходится всегда. Но алгоритм метода становится сложнее. Рассмотрим геометрическую интерпретацию метода.



- Хорда, проходящая через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$, пересекает ось Ox в точке c . Координату точки c можно определить, используя уравнение прямой, проходящей через две точки: .

$$c = a - \frac{f(a)}{f(b) - f(a)} \cdot (b - a)$$

- Формула метода хорд такая же, как и в методе секущих. Но, в отличие от метода секущих, где все получаемые приближения лежат *по одну сторону от корня*, в методе хорд получаемое приближение всегда лежит *между* двумя предыдущими! Следовательно, необходимо проверять на каком отрезке - $[a, c]$ или $[c, b]$ лежит искомый корень. Для этого достаточно проверить произведение значений функции на концах получившихся отрезков (см. *отделение корней*): корень есть, если данное произведение меньше нуля.
- Далее выбираем тот из отрезков, на котором содержится корень. В нашем случае – это отрезок $[c, b]$.



Переименуем один из концов отрезка так, чтобы опять получился отрезок $[a, b]$. Найдем новое значение c и будем повторять процесс до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность.

■ Пример 1

- Находим:

$$x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5 = 0;.$$

$$f(x) = x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5;$$

$$f'(x) = 3x^2 - 0,4x + 0,5;$$

$$D = 0,16 - 6 < 0.$$

Составим таблицу знаков функции $f(x)$:

x	-	-1	0	+
$\text{Sign}f(x)$	-	-	+	+

Уравнение имеет один действительный корень, лежащий в промежутке $[-1,0]$.

Чтобы уточнить корень, находим вторую производную $f''(x) = 6x - 0,4$, в промежутке $[-1,0]$ выполняется неравенство $f''(x) < 0$

Для вычисления применяем формулу

$$x_{n-1} = a - \frac{f(a)}{f(x_n) - f(a)}(x_n - a).$$

где $a = -1; x_0 = 0; f(a) = f(-1) = -1 - 0,2 - 0,5 + 1,5 = -0,2$.



Вычисление располагаем в таблице:



n	x_n	x_n^3	x_n^2	$0,2x_n^2$	$0,5x_n$
0	0	0	0	0	0
1	-0,882	-0,6861	-0,7779	-0,1556	-0,441
2	-0,934	-0,8386	-0,8892	-0,1778	-0,4715
3	-0,946	-0,8466	-0,8949	-0,1790	-0,473
4	-0,946				

n	$f(x_n)$	$f(x_n) + 0,2$	$x_n - a$	$\frac{f(a)(x_n - a)}{f(x_n) - f(a)}$
0	1,5	1,7	1	-0,118
1	0,2173	0,4173	0,118	-0,057
2	0,0121	0,2121	0,057	-0,054
3	0,0014	0,2014	0,054	-0,054

Ответ: $x \approx -0,946$

Для $f'(x); f''(x)$ возможны следующие комбинации:





Замечание: условимся через a_1 обозначать тот конец отрезка $[a_1, b_1]$ где совпадают знаки $f'(x)$ и $f''(x)$.


Метод хорд заключается в следующем:

Заменим дугу кривой $y=f(x)$ хордой АВ.

Определив точку пересечения хорды АВ с осью Ох находим 1-ое приближение b_2 корня x_0 .

Точка b_2 разобьет $[a_1, b_1]$ на $[b_1, b_2]$ и $[b_2, a_1]$ причем $x_0 \in [b_2, a_1]$.

На полученном отрезке $[b_2, a_1]$ опять заменим дугу хордой, получим второе приближение b_3 и т.д.(см.рис.).



Выведем формулу для n-го приближения.

Уравнение прямой, проходящей через две точки $A(a_1; f(a_1))$ и $B_n(b_n; f(b_n))$ имеет вид:

$$\cos 3x - 4x + 1 = 0$$

$$x^4 + e^{2x} = 0$$

$$5x^4 + 3x^2 - 4x + 5 = 0$$

$$3x^2 + 4x - \arccos x = 0$$


Найдем точку пересечения этой прямой с осью абсцисс, полагая $y=0$, $x=b_{n+1}$ имеем

$$x = b_{n+1} = b_n - \frac{f(b_n)}{f(a_1) - f(b_n)} * (a_1 - b_n)$$

$n=1;2;3.$

Метод касательных отличается от метода хорд тем, что дугу заменяют не хордой, а касательной.

В точке $A_1(a_1; f(a_1))$ проведем касательную к дуге. Точка пересечения касательной и оси Ox – a_2 будет первым приближением корня x_0



Затем проведем касательную в точке $A_2(a_2; f(a_2))$ и получим второе приближенное значение a_3 и т.д.

Выведем формулу для n -го приближения:

Уравнение касательной в точке $A_n(a_n, f(a_n))$ будет иметь вид:

где $n=1,2,3\dots$

Пологая, что $y = 0$ и $X = a_{n+1}$, имеем

$$(2) \quad A_2$$

где $n=1,2,3\dots$

Процесс сходится, если $f'(x)$ и $f''(x) \neq 0$, непрерывна и сохраняет свои знаки на $[a_1, b_1]$

Комбинированный метод


Суть приближения по методу хорд будет располагаться с одной стороны, а по методу касательных - с другой т.е. в результате мы придем к следующему

$$x_0 \in [a_{n+1}; b_{n+1}]$$

где A_n найдено по формуле

$$(3) \quad a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$$

$$b_{n+1} = b_n - \frac{f(b_n)}{f(a_n) - f(b_n)} \cdot (a_n - b_n)$$



Последний из полученных интервалов дает абсолютную величину погрешности приближенного значения корня.

Пусть $|b_{n+1} - a_{n+1}| < \varepsilon$, где $f(x)$ заданная точность



приближенного значения корня за приближенное значение x_0



можно взять $x \in [a_{n+1}; b_{n+1}]$ в частности $x^3 = 2x - 2$.

Погрешность этого приближения

Замечание

За A_1 берем ту точку где $f'(x)$ и $f(x)$ имеют одинаковые знаки.





Пример 1

$$f(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 - 1 = 0$$

определено что $x_0 \in [1;2]$

1. Уточним значение корня: делим отрезок $[1;2]$ пополам – $[1;1,5]$ и $[1,5;2]$, то

$$f(1) < 0 \quad f(2) > 0 \quad \begin{matrix} f'(x) > 0 \\ f''(x) < 0 \end{matrix} \quad x \in [1,5;2]$$

2. Исследование:

$$\text{а) } f(1,5) = -\frac{3}{32} < 0$$

$$f(2) = 7 > 0$$

$$\text{б) } f'(x) = x^2(5x^2 - 8x + 3)$$

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) > 0$$

$$f'(2) > 0$$

$$f'(2) = 28$$

$$f''(x) = 20x^3 - 24x^2 + 6x$$

$$f''\left(\frac{3}{2}\right) > 0$$

$$f'' > 0 \quad b_1 = \frac{3}{2}$$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = a_1 - \frac{f(a_1)}{f'(a_1)} = 2 - \frac{7}{28} = \frac{7}{4} \approx 1,75$$

$$b_2 = b_1 - \frac{f(b_1)}{f(a_1) - f(b_1)}(a_1 - b_1)$$

$$b_2 = \frac{3}{2} - \frac{\frac{3}{32}}{7 + \frac{3}{32}} \left(2 - \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} + \frac{3 \cdot (224 + 3)}{(224 + 3) \cdot 32}$$

$$= \frac{3 \cdot 16 + 3}{32} = \frac{48 + 3}{32} = \frac{51}{32} \approx 1,59 \quad \text{t.e} \quad x_0 \approx [1,59; 1,75]$$


Еще сузим промежуток и т.д.

$$x \approx 1,52897$$

Пример 2

Определить ближайший к нулю корень уравнения с точностью до 0,001

1. Графическое отделение корня



$$x_0 \in [0,5; 0,6]$$

2. Исследование

$$\text{а) } f'(0,5) = 0,25 - 0,598 < 0$$

$$f'(0,6) = 0,36 - 0,141 > 0$$

$$\text{б) } f''(0,5) = 0,25 - 0,598 < 0$$

$$f''(0,6) = 0,36 - 0,141 > 0$$

$$0,5 \leq x \leq 0,6$$

$$\text{в) } f'''(x) = 2 + 25 \sin 5x$$

$$f'''(x) > 0$$

$$0,5 \leq x \leq 0,6$$

т.е. случай 1

$$a_1 = 0,6 \quad b_1 = 0,5$$

Применяем формулу (3)

$$x \approx 0,56367$$

Метод половинного деления

- Метод хорд можно сделать проще. Так как точка c – это точка лежащая между a и b , ее координаты можно определить иначе – поделить отрезок $[a, b]$ пополам: . Если $f(x) \neq 0$ (что наиболее вероятно), то возможны два случая: либо $f(x)$ меняет знак на отрезке $[a, c]$, либо на отрезке $[c, b]$. Выбирая в каждом случае тот из отрезков, на котором происходит смена знака функции, и, продолжая метод половинного деления дальше, можно прийти до сколь угодно малого отрезка, содержащего корень уравнения. Т.е., процесс будем продолжать до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность: $|b - a| < \varepsilon$.

■ Пример метода половинного деления

- Умножить корни уравнения

$$[-2; -1]$$

- Методом половинного деления:

- Ранее было установлено, что корень уравнения принадлежит $[-1,5; -1]$ разобьем его

- На два интервала $[-2; -1,5]$ и $[-1,5; -1]$

- И определяем знаки исходной функции на концах интервала:

1

- на промежутке $[-2; -1,5]$ -есть корень.

$$f(-1,75) < 0$$

$$f(-1,625) = -4,291 + 3,25 + 2 > 0$$

на промежутке $[-1,5;-1]$ -нет корней.

Промежуток $[-2;-1,5]$ поделим пополам $[-2;-1,75]$ и $[-1,75;-1,5]$

$$f(-2) < 0$$

$$f(-1,75) = (-1,75)^3 + 3,5 + 2 = -6,125 + 5,5 < 0$$

$[-2;-1,75]$ -нет корней.

$[-1,75;-1,5]$ -есть корень.

Вновь разобьем интервал пополам.

$$[-1,75;-1,625] \quad \text{И} \quad [-1,625;-1,5]$$

$$f(-1,75) < 0$$

$$f(-1,625) = -4,291 + 3,25 + 2 > 0$$

$[-1,75;-1,625]$ -есть корень.

$|b - |$ -нет корня.

Середину отрезка $x_0 = \frac{-1,75 + (-1,625)}{2} =$

Возьмем за корень: $1,6875.$ ²

Контрольные вопросы:

1. Что такое корень уравнения?
2. Как геометрически изображается корень алгебраического уравнения
3. Что означает отделить действительный корень уравнения? $f(x) = 0$?
4. Как применяется графически метод отделения корней?
5. На чем основан аналитический способ отделения корней?
6. Дать определение метода итераций.
7. Вид генерирующего соотношения.
8. В чем состоит метод хорд нахождения приближенного значения уравнения?
9. В чем состоит метод касательных нахождения приближенного значения уравнения?
10. В чем состоит комбинированный метод нахождения