

Степень с рациональным показателем

Преподаватель математики
Московского колледжа (филиала) 177
Бисултанова Хеди Рамазановна
г. Сургут

Цели и задачи урока

- 1) **формирование знаний о степени с рациональным показателем и о свойствах степени с рациональным показателем.**
- 2) **формировать понятие о степени с рациональным показателем, изучить основные свойства степени с действительным и рациональным показателями;**
- 3) **способствовать выработке навыков решения задач, содержащих степень с рациональным показателем;**
- 4) **формировать умение находить значение степени с рациональным показателем, проводить по известным свойствам и правилам преобразование буквенных выражений, включающих степени.**



*«Пусть кто-нибудь попробует вычеркнуть
из математики степени, и он увидит,
что без них далеко не уедешь »*

М.В.Ломоносов

Повторение: «Решение систем иррациональных уравнений»

1. Что требуется для полученных значений переменной при решении систем иррациональных уравнений? (*проверка*)
2. Способ, которым проводится проверка системы иррациональных уравнений. (*подстановка*)
3. Как называется знак корня? (*радикал*)
4. Сколько решений имеет уравнение $x^2 = a$, если $a < 0$? (*ноль*)
5. Как называется уравнение в которых под знаком корня содержится переменная? (*иррациональное*)
6. Сколько решений имеет уравнение $x^2 = 0$ (*1 решение*)
7. Корень какой степени существует из любого числа? (*нечетной*)
8. Сколько решений имеет уравнение $x^2 = a$, если $a > 0$? (*2 решения*)
9. Как называется корень системы уравнения, который получается в результате неравносильных преобразований? (*посторонний*)
10. Корень какой степени существует только из неотрицательного числа? (*четной*)

Напомним свойства степеней с действительным показателем

Для любых чисел a , b и любых целых чисел m и n справедливы равенства:

.

Определение

Степенью числа $a > 0$ с рациональным показателем $r = \frac{m}{n}$, где m — целое число, а n — натуральное ($n > 1$), называется число $\sqrt[n]{a^m}$

Итак, по определению: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

Степень числа 0 определена только для положительных показателей; по определению $0^r = 0$ для любого $r > 0$.

Замечание 1.

Из определения степени с рациональным показателем сразу следует, что для любого положительного a и любого рационального r число a^r положительно.

Замечание 2.

Любое рациональное число допускает различные записи его в виде дроби, поскольку для любого натурального k . Значение a^r также не зависит от формы записи рационального числа r . В самом деле, из свойств корней следует, что

$$a^{\frac{mk}{nk}} = \sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Замечание 3.

При $a < 0$ рациональная степень числа a не определяется, и это не случайно. Если бы мы сочли верной формулу (1) и для $a < 0$, то, например, значение $(-8^{\frac{1}{3}})$ равнялось бы $\sqrt[3]{-8}$, т. е. -2 . Но, с другой стороны, $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, и поэтому должно выполняться равенство: $-2 = (-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{8^2} = 2$

Дифференцированные задания

Вариант 1

Вычислите:

Уровень I	
$(-2)^{-2}$	
$\sqrt{5^2 - 4^2}$	
$27^{-\frac{2}{3}} 3^2$	
$(6\sqrt{3})^3$	
$\frac{5^{-1} \cdot 8^{\frac{-2}{3}}}{8^0}$	
Уровень II	
$\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}$	
$\sqrt[3]{54 \cdot 32} - \sqrt{8 \cdot 162}$	
$\frac{6}{\sqrt{2}}$	
$(2 - \sqrt{3})^2$	
$-0,064^{\frac{1}{3}} 0,49^{\frac{1}{2}}$	

Вариант 2

Вычислите:

Уровень I	
$(-3)^{-2}$	
$\sqrt{3^2 + 4^2}$	
$4^2 64^{\frac{-2}{3}}$	
$(7\sqrt{2})^2$	
$\frac{((29)^3)^0}{16^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{-4}}$	
Уровень II	
$\sqrt{25} + \sqrt[5]{-32}$	
$(-2\sqrt{11})^2$	
$\sqrt{36a^3} \cdot \sqrt{81a^5}$	
при $a = \frac{1}{2}$	
$(\sqrt{2} - 3)(\sqrt{2} + 3)$	
$125^{\frac{1}{3}} 16^{\frac{3}{4}} - 36^{\frac{1}{2}}$	

Бисултанова Х.Р.

ВАРИАНТ 1 Уровень I	ответ	ВАРИАНТ 2 Уровень I	ответ
$(-2)^{-2}$	$\frac{1}{4}$	$(-3)^{-2}$	$\frac{1}{9}$
$\sqrt{5^2 - 4^2}$	3	$\sqrt{3^2 + 4^2}$	5
$27^{\frac{-2}{3}} 3^2$	1	$4^2 64^{\frac{-2}{3}}$	1
$(6\sqrt{3})^3$	$648\sqrt{3}$	$(7\sqrt{2})^2$	98
$\frac{5^{-4} \cdot 8^{\frac{-2}{3}}}{8^0}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{((29)^3)^0}{16^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{-4}}$	2
Уровень II		Уровень II	
$\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}$	6	$\sqrt{25} + \sqrt[3]{-32}$	3
$\sqrt[3]{54 \cdot 32} - \sqrt{8 \cdot 162}$	-24	$(-2\sqrt{11})^2$	44
$\frac{6}{\sqrt{2}}$	$3\sqrt{2}$	$\sqrt{36a^3} \cdot \sqrt{81a^5}$ при $a = \frac{1}{2}$	$3\frac{3}{8}$
$(2 - \sqrt{3})^2$	$7 - 4\sqrt{3}$	$(\sqrt{2} - 3)(\sqrt{2} + 3)$	-7
$-0,064^{\frac{1}{3}} 0,49^{\frac{1}{2}}$	-0,28	$125^{\frac{1}{3}} 16^{\frac{3}{4}} - 36^{\frac{1}{2}}$	34

Бисултанова Х.Р.

Самостоятельная работа

Вариант №1

1. Вычислите $81^{\frac{1}{4}} \cdot 32^{\frac{2}{5}}$.

- 1) 6 2) 12 3) 36 4) 24

2. Вычислите $5(125)^{\frac{1}{3}} - 2(243)^{\frac{1}{5}}$.

- 1) 19 2) 31 3) 28 4) 7

3. Упростите выражение $2c^2 - \frac{2c^{\frac{8}{3}}}{c^{\frac{2}{3}}}$.

- 1) $2c^{\frac{4}{3}}$ 2) $c^{\frac{2}{3}}$ 3) 0 4) $2c$

4. Упростите выражение $\frac{8k^3 \cdot k^{3\frac{1}{2}}}{k^{-2\frac{1}{2}}}$.

- 1) $8k^7$ 2) $8k^4$ 3) $8k^8$ 4) $8k^9$

5. Найдите значение выражения $(0,2)^{-2p} : (0,2)^p$ при $p = -1$.

- 1) 0,008 2) 0,0008 3) 0,08 4) 125

6. Значение выражения $\frac{(0,216^{\frac{4}{9}})^{\frac{3}{2}}}{0,09^{\frac{3}{4}} \cdot 0,027^{\frac{1}{6}}}$ принадлежит промежутку

- 1) $[0; 0,04]$ 2) $(0,4; 1)$ 3) $[3; 4]$ 4) $[16; 20)$

7. Сократите дробь $\frac{2a^{-\frac{1}{3}}}{a^{\frac{2}{3}} - 3a^{-\frac{1}{3}}}$.

- 1) $2(a - 3)^{-1}$ 2) $2(\sqrt[3]{a} - 3)^{-1}$ 3) $\frac{a}{a^{\frac{1}{3}}}$ 4) $-\frac{2}{3}$

8. Найдите значение выражения $4 \cdot (80 + 7^0)^{\frac{3}{4}} - 32^{\frac{3}{5}}$.

- 1) 100 2) 108 3) 116 4) 28

Самостоятельная работа

Вариант №2

- Вычислите $(125)^{\frac{1}{3}} - (64)^{\frac{2}{3}}$.
1) -11 2) -3 3) 17 4) -5
- Вычислите $\frac{7^{-7} \cdot 7^{-8}}{7^{-15}}$.
1) 7^{-33} 2) 343 3) 21 4) 249
- Упростите выражение $(32x^{-10})^{-\frac{3}{5}}$.
1) $8x^6$ 2) $\frac{1}{8}x^{-\frac{13}{5}}$ 3) $\frac{x^7}{8}$ 4) $\frac{x^6}{8}$
- Выполните действия: $(5a^{\frac{3}{11}})^4 + 4a^{\frac{12}{11}}$.
1) $629a^{\frac{12}{11}}$ 2) $9a^{\frac{12}{11}}$ 3) $9a^{\frac{24}{11}}$ 4) $629a^{\frac{25}{11}}$
- Найдите значение выражения $\frac{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}{x - y}$ при $x = 4$, $y = 9$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.
1) $\frac{1}{5}$ 2) -0,2 3) 1,2 4) 0,2
- Сократите дробь $\frac{a^{\frac{5}{3}} - a^{-\frac{1}{3}}}{a^{\frac{2}{3}} - a^{-\frac{1}{3}}}$.
1) $a - 1$ 2) $a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}} + 1$ 3) $a + 1$ 4) $\frac{a^{-\frac{1}{3}}}{a - 1}$
- Укажите промежуток, которому принадлежит значение выражения $\frac{b^{\frac{3}{2}}}{(3 \cdot 2)^{-3} \cdot (b^{\frac{1}{2}})^3} - 2,34$.
1) (-1; 0) 2) (213; 214) 3) (122; 123) 4) (-3; -2)
- Найдите наибольшее из чисел $0,5^2$; $0,5^3$; $(-0,5)^{-5}$; $(-0,5)^{-6}$.
1) $0,5^2$ 2) $0,5^3$ 3) $(-0,5)^{-5}$ 4) $(-0,5)^{-6}$

Эталоны ответов к заданиям для самостоятельной работы и критерии оценивания

Ответы:

Вар.	1	2	3	4	5	6	7	8
I	2	1	3	1	4	2	2	3
II	1	2	4	2	2	3	3	2

Критерии оценки:

40-38 баллов – оценка «5»

37-32 балла – оценка «4»

31-16 баллов – оценка «3»

15-1 балла-оценка «2» или «1»

Рефлексия

Закончи предложения

- 1) Сегодня я узнал....*
- 2) Было интересно...*
- 3) Было трудно...*
- 4) Теперь я могу...*
- 5) Я попробую...*

Домашнее задание:

выучить теоретический материал;

выполнить задания стр. 222, №432 по №436 на выбор.

критерии оценок за письменные упражнения домашней работы:

«5» баллов – верно решены №435 и любые 2 упр.;

«4» балла – верно решены задания из 2-х упр.;

«3» балла – верно решены задания из 1-го упр.

Всем спасибо за внимание!

До



Бисултанова Х.Р.