Занятие
по алгебре и началам анализа
« Геометрический и физический смысл производной, применение производной»

Преподаватель математики
Новикова Н.А.
г. Сим
«Симский механический техникум»

***Цель занятия*: Подготовка к экзамену по математике**

***Задачи занятия*:**

1) ***дидактическая*: обобщить теоретический материал по теме « Геометрический и физический смысл производной. Применение производной», рассмотреть решения типичных задач;**

2) ***развивающая*: формировать умение анализировать и систематизировать имеющуюся информацию;**

3) ***воспитательная*: формировать умение оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать.**

Рассмотрите чертеж и дайте определение производной функции



$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Физический смысл производной



Траектория движения тела

ΔX – промежуток времени

ΔY -изменение перемещения

$$v_{ср.} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad v_{мгн.} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Геометрический смысл производной



1. Опишите поведение функции, если



2. Функция определена на промежутке (-5;7). График ее производной изображен на рисунке.
Найти промежутки убывания функции



3. Функция определена на промежутке (-8;5). **График ее производной** изображен на рисунке. Найти промежутки возрастания функции



4.Функция y = *f(x)* определена на промежутке [-6;7]. На рисунке изображен график ее производной. Укажите число точек максимумов и минимумов.



5. На рисунке график $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найти значение производной в точке x_0.



6. На рисунке изображен график функции и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной в точке x_0.



7. К графику функции $y = x^2 + x + 1$ в точке с абсциссой $x = 1$
проведена касательная. Найти абсциссу точки пересечения
касательной осью ОХ.

ФОРМУЛЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

1. $(c)' = 0$
2. $(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
3. $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$
4. $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$
5. $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
6. $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
7. $(\mathrm{tg}\, u)' = \frac{1}{(\cos u)^2} \cdot u'$
8. $(\mathrm{ctg}\, u)' = -\frac{1}{(\sin u)^2} \cdot u'$