ДВУГРАННЫЙ УГОЛ. УГОЛ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЯМИ





Двугранным углом называется фигура, образованная двумя полуплоскостями с общей граничной прямой.

Линейным углом двугранного угла называется угол, образованный лучами с вершиной на граничной прямой, стороны которого лежат на гранях двугранного угла и перпендикулярны граничной прямой.

Величиной двугранного угла называется величина его линейного угла.

Углом между двумя пересекающимися плоскостями называется наименьший из двугранных углов, образованных этими плоскостями.

В тетраэдре $ABCD$, ребра которого равны 1, найдите угол между плоскостями ABC и BCD.



Решение: Пусть E – середина BC. Искомым линейным углом φ является угол AED. В треугольнике AED имеем:

$AD = 1$, $AE = DE = \frac{\sqrt{3}}{2}$. По теореме косинусов находим $\cos\varphi = \frac{1}{3}$.

Ответ: $\cos\varphi = \frac{1}{3}$.

В правильной пирамиде $SABCD$, все ребра которой равны 1, найдите угол между плоскостями SBC и ABC.



Решение: Пусть E, F – середины ребер BC и AD, O – центр основания. Искомым линейным углом φ является угол SEF.

В прямоугольном треугольнике SEO имеем $EO = \frac{1}{2}$, $SE = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Следовательно, $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Ответ: $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

В правильной пирамиде *SABCD*, все ребра которой равны 1, найдите двугранный угол, образованный гранями *SAB* и *SBC*.



Решение: Пусть *E* – середина ребра *SB*. Искомым линейным углом φ является угол *AEC*. В треугольнике *AEC* имеем:

$AC = \sqrt{2}$, $AE = CE = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. По теореме косинусов находим

$\cos\varphi = -\dfrac{1}{3}$.

Ответ: $\cos\varphi = -\dfrac{1}{3}$.

В правильной пирамиде $SABCD$, все ребра которой равны 1, найдите угол между плоскостями SAD и SBC.



Решение: Пусть E, F – середины ребер AD, BC. Искомым линейным углом φ является угол ESF. В треугольнике ESF имеем: $EF = 1$, $SE = SF = \frac{\sqrt{3}}{2}$. По теореме косинусов находим $\cos\varphi = \frac{1}{3}$.

Ответ: $\cos\varphi = \frac{1}{3}$.

В правильной 6-ой пирамиде $SABCDEF$, боковые ребра которой равны 2, а ребра основания – 1, найдите угол между плоскостями ABC и SBC.



Решение: Пусть O – центр основания, G – середин ребра BC. Искомым линейным углом φ является угол SGO.

В прямоугольном треугольнике SGO имеем: $OG = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $SG = \frac{\sqrt{15}}{2}$.

Следовательно, $\cos\varphi = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Ответ: $\cos\varphi = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

В правильной 6-ой пирамиде $SABCDEF$, боковые ребра которой равны 2, а ребра основания – 1, найдите двугранный угол, образованный гранями SAB и SBC.



Решение: В треугольниках SAB и SBC опустим высоты AH и CH на сторону SB. Искомым линейным углом φ является угол AHC. В прямоугольном треугольнике AHC имеем: $AC = \sqrt{3}$, $AH = CH = \frac{\sqrt{15}}{4}$. По теореме косинусов находим $\cos\varphi = -\frac{3}{5}$.

Ответ: $\cos\varphi = -\frac{3}{5}$.

В правильной 6-ой пирамиде *SABCDEF*, боковые ребра которой равны 2, а ребра основания – 1, найдите двугранный угол, образованный гранями *SAB* и *SBC*.



Решение: Продолжим ребра *AB* и *DC* до пересечения в точке *G*. В треугольниках *SAG* и *SDG* опустим высоты *AH* и *DH* на сторону *SG*. Искомым линейным углом φ является угол *AHD*. В треугольнике *AHD* имеем:

$$AD = 2,\ AH = DH = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

По теореме косинусов находим $\cos\varphi = \frac{1}{5}.$

Ответ: $\cos\varphi = \frac{1}{5}.$

В правильной 6-ой пирамиде *SABCDEF*, боковые ребра которой равны 2, а ребра основания – 1, найдите двугранный угол, образованный гранями *SAB* и *SDE*.



Решение: Пусть *G*, *H* – середины ребер *AB*, *DE*. Искомым линейным углом φ является угол *GSH*. В треугольнике *GSH* имеем: $GH = \sqrt{3}$, $SG = SH = \frac{\sqrt{15}}{2}$. По теореме косинусов находим $\cos\varphi = \frac{3}{5}$.

Ответ: $\cos\varphi = \frac{3}{5}$.