

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 2011

ЦЕНТР МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПб АППО

С 6

ЗАДАНИЕ С6

Найдите все такие пары взаимно простых натуральных чисел (то есть чисел, наибольший общий делитель которых равен 1) a и b , что если к десятичной записи числа a приписать справа через запятую десятичную запись числа b , то получится десятичная запись числа, равного $\frac{b}{a}$.

- ▣ **ТРЕБОВАНИЯ:** Уметь строить и исследовать простейшие математические модели
- ▣ **СОДЕРЖАНИЕ:** Числа, корни и степени, основы тригонометрии, логарифмы, преобразования выражений

▣ **ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ**

БАЗОВЫЙ: -

ПРОФИЛЬНЫЙ : 40 мин

Задача С6

Найдите все тройки натуральных чисел k, m и n , удовлетворяющие уравнению $2 \cdot k! = m! - 2 \cdot n!$ ($1! = 1$; $2! = 1 \cdot 2 = 2$; $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$).

Решение

1. Так как $m! = 2 \cdot k! + 2 \cdot n!$, то $n < m$ и $k < m$.
2. Пусть $k \leq n$, тогда $4 \cdot n! \geq 2 \cdot k! + 2 \cdot n! = m! \geq (n+1) \cdot n!$, откуда $4 \geq n + 1$ и $k \leq n \leq 3$.
3. Пусть $k > n$, тогда $4 \cdot k! \geq 2 \cdot k! + 2 \cdot n! = m! \geq (k+1) \cdot k!$, откуда $4 \geq k + 1$ и $n < k \leq 3$.
4. Далее конечным перебором значений $1 \leq n \leq 3$, $1 \leq k \leq 3$

находим все			
решения.			
n	k	$m! = 2 \cdot k! + 2 \cdot n!$	m
3	3	$m! = 24$	4
3	2	$m! = 20$	Нет решений
3	1	$m! = 18$	Нет решений
2	3	$m! = 20$	Нет решений
2	2	$m! = 8$	Нет решений
2	1	$m! = 6$	3
1	3	$m! = 14$	Нет решений
1	2	$m! = 6$	3
1	1	$m! = 4$	Нет решений

Критерии оценивания выполнения задания С6

Баллы

Обоснованно получен верный ответ. 4

Ответ правилен, и конечность перебора обоснована. Однако при переборе допущены арифметические ошибки или пробелы.

3

Ответ правилен и получен конечным перебором. Однако конечность перебора не обоснована.

2

Приведен хотя бы один из правильных наборов, и проверено, что при подстановке в уравнение получается верное числовое равенство. 1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0



$m!$ должно быть больше $n!$, чтобы выполнялось условие $2k! = m! - 2n!$

Предположим, что $k=2, m=3, n=1$. Проверяем

$$\begin{array}{l} 2 \cdot 2! = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4 \\ 3! - 2 \cdot 1! = 1 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4 \end{array} \left| \begin{array}{l} \Rightarrow 2 \cdot 2! = 3! - 2 \cdot 1! \text{ наше} \\ \text{предположение верно} \end{array} \right.$$

При увеличении значений чисел разница между ними будет увеличиваться, а значит равенство не будет выполняться. Тогда единственным ответом будет $k=2, m=3, n=1$

Ответ: $k=2; m=3; n=1$

1 балл 1 балл гарантирован, так как одна верная тройка чисел

указана и проверка произведена. Дальнейшие «эвристические» соображения просто неверны.

$$2k! = m! - 2n!$$

$$k! + n! = \frac{m!}{2} \Rightarrow m > k; m > n, \text{ т.к. } m, n, k \in \mathbb{N}, \text{ то}$$

наименьшее значение $m=2$; при $m=2 \cdot \frac{m!}{2} = 1$, а
минимальное значение $k! + n! = 2$

$$\text{при } m=3 \quad k=1 \quad n=2 \text{ или } k=2 \quad n=1$$

$$\text{при } m=4 \quad \frac{m!}{2} = 12 \quad n! + k! = 12 \Rightarrow n=3 \quad k=3$$

при $m=5 \quad \frac{m!}{2} = 60$, а наибольшая сумма $n! + k!$ при
данном m будет 58

при $m=6 \quad \frac{m!}{2} = 360$, а наибольшая сумма $n! + k!$

при данном m будет ~~360~~ 240

при $m=7 \quad \frac{m!}{2} = 2730$, а наибольшая сумма $n! + k!$

при данном m будет 1560 и т.д.

Т.е. при увеличении m разрыв между $\frac{m!}{2}$ и $k! + n!$
будет увеличиваться. Отсюда далее решения нет.

Ответ: $m=3, k=1, n=2$; $m=3, k=2, n=1$; $m=4, n=3, k=3$.

2 балла 2 балла гарантированы, так как все три верные
тройки
чисел указаны и проверка произведена. Дальнейшие
«эвристические»
соображения верны (т. е. контрпримера не существует), но
не обоснованы

$$C6. \quad 2 \cdot k! = m! - 2 \cdot n! \quad k, m, n \in \mathbb{N}. \quad k, m, n = ?$$

Решение.

$$2 \cdot k! = m! - 2 \cdot n! \Leftrightarrow 2(k! + n!) = m! \Rightarrow m \geq 2$$

$$1) \text{ При } m=2: k! + n! = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \emptyset \\ n \in \emptyset \end{cases} \text{ - невозможно, т.к.} \\ \text{даже при } k=1 \text{ и } n=1 \\ k! + n! = 2$$

$$2) \text{ При } m=3: k! + n! = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} k=1, n=2 \\ k=2, n=1 \end{cases}$$

$$3) m=4 \Rightarrow k! + n! = 12 \Leftrightarrow k=3, n=3$$

$$4) m=5 \Rightarrow k! + n! = 60 \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \emptyset \\ n \in \emptyset \end{cases} \text{ - невозможно, т.к. } 4! = 24, 3! = 6 \\ 5! = 120, 6! = 720$$

$$5) m=6 \Rightarrow k! + n! = 360 \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \emptyset \\ n \in \emptyset \end{cases} \text{ - невозможно, т.к. } 5! = 120, 6! = 720 \\ \text{нет таких } x \text{ и } y \in \mathbb{N}, \\ \text{что } x! + y! = 360$$

6) при $m \geq 5$ ситуация будет аналогична 5) и 4).
Значит, все возможные тройки чисел, при которых выполняется равенство:

$$k=1; m=3; n=2$$

$$k=2; m=3; n=1$$

$$k=3; m=3; n=3$$

Ответ: $(1; 3; 2); (2; 3; 1); (3; 3; 3)$.

2 балла Ситуация схожа с предыдущим примером, правда несколько хуже: вместо «далее будет увеличиваться» тут просто констатируется «аналогично», и

при этом неясно о какой именно аналогии идет речь. Кроме того, регулярное

▶ $k \in \emptyset$ («нас так учили?») неприятно раздражает. Но меньше 2 баллов поставить нельзя: все ответы приведены.

$$2k! = m! - 2n!$$

$$2(k! + n!) = m!$$

Пусть $m \neq$ - константа.

либо $k, n < m$, $k < m$, Пусть $k \geq n$,

либо $m \geq k+1$. Докажем, что при

$m \geq 5$ решений нет. Пусть $m \geq 5$ k меньше

m более, чем в 5 раз. Тогда n должно

быть равно меньше m более, чем в 5 раз,

их сумма меньше или равна m в 2 более

чем в 2,5 раза, а умноженная на 2 меньше

в 1,25 раз. Поэтому $m \leq 4$. Рассмотрим

случаи. Если $m=1$ - то корней очевидно нет

Если $m=2$, то $k! + n! = 2$. ~~Тройка (1; 2; 1)~~

Если $m=3$, то $k! + n! = 3$, $\Rightarrow k! = 2, n! = 1$

или $k! = 1; n! = 2$. Тройка $(2; 3; 1)$; $(1; 3; 2)$

Если $m=4$, то $k! + n! = 12$, $\Rightarrow k! = n! = 3!$

(очевидно другие не подходят.) Тройка $(3; 4; 3)$,

Ответ: $\{(3; 4; 3); (2; 3; 1); (1; 3; 2)\}$

3 балла

Обидный случай.

Решение

оригинальное, т. е.

отличное от

«образца». Все три

ответа верны и

найлены разумным

конечным

перебором.

В рассуждении про

невозможность

случая $m \geq 5$

ВСЮДУ, т. е. пять

раз подряд,

почему-то

пропущены значки

факториалов (т. е.

формально все эти

рассуждения

неверны), а вместо

«более, чем в 5 раз»

должно стоять «не

менее

чем в 5 раз».


С
6

Найдите все пары целых чисел $(x; y)$, удовлетворяющие

$$\begin{cases} x^2 + y^2 < 18x - 20y - 166 \\ 32x - y^2 > x^2 + 12y + 271 \end{cases}$$

Решение.

Упростим каждое неравенство данной системы, выделив полный квадрат:



$$\begin{cases} (x-9)^2 + (y+10)^2 < 15 \\ (x-16)^2 + (y+6)^2 < 21 \end{cases}$$

Первое неравенство задает область, состоящую из точек лежащих внутри окружности с центром $(9; -10)$ и $R = \sqrt{15}$, так как радиус окружности меньше 5, справедливо неравенство

$$x > 11 \text{ и } y > -11 \quad x < 13 \text{ и } y < -6.$$


С
6

Найдите все пары целых чисел $(x; y)$, удовлетворяющие

$$\begin{cases} x^2 + y^2 < 18x - 20y - 166 \\ 32x - y^2 > x^2 + 12y + 271 \end{cases}$$

Решение.

Упростим каждое неравенство данной системы, выделив полный квадрат:



По условию ищем точки с целыми координатами, значит достаточно проверить на принадлежность системе неравенств точки

$(12; -7)$, $(12; -8)$, $(12; -9)$, $(12; -10)$.

Проверка показывает, что условию задачи удовлетворяет единственная точка $(12; -8)$.

Ответ: $x=12, y=-8$ $x < 13$ и $y < -6$.