


π

это загадочное
число π




Знаете ли вы, что эта обыкновенная, на первый взгляд, полузабытая буква из школьного курса геометрии намного интереснее при ближайшем рассмотрении и изучении, имеет свою историю, очень много значит для математиков — они без неё просто никуда, и даже отмечают свой праздник?



Неофициальный праздник «День числа Пи»
(англ. Pi Day) отмечается 14 марта, которое
в американском формате дат
записывается как 3.14, что соответствует
приблизённому значению числа π .






**Если принять диаметр
окружности за единицу, то длина
окружности — это число π .**

Запомни, что $\pi =$


$\pi = 3.14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288\ 41971\ 69399$
 $37510\ 58209\ 74944\ 59230\ 78164\ 06286\ 20899\ 86280\ 34825\ 34211$
 $70679\ 82148\ 08651\ 32823\ 06647\ 09384\ 46095\ 50582\ 23172\ 53594$
 $08128\ 48111\ 74502\ 84102\ 70193\ 85211\ 05559\ 64462\ 29489\ 54930$
 $38196\ 44288\ 10975\ 66593\ 34461\ 28475\ 64823\ 37867\ 83165\ 27120$
 $19091\ 45648\ 56692\ 34603\ 48610\ 45432\ 66482\ 13393\ 60726\ 02491$
 $41273\ 72458\ 70066\ 06315\ 58817\ 48815\ 20920\ 96282\ 92540\ 91715$
 $36436\ 78925\ 90360\ 01133\ 05305\ 48820\ 46652\ 13841\ 46951\ 94151$
 $16094\ 33057\ 27036\ 57595\ 91953\ 09218\ 61173\ 81932\ 61179\ 31051$
 $18548\ 07446\ 23799\ 62749\ 56735\ 18857\ 52724\ 89122\ 79381\ 83011$
 $94912\ 98336\ 73362\ 44065\ 66430\ 86021\ 39494\ 63952\ 24737\ 19070$
 $21798\ 60943\ 70277\ 05392\ 17176\ 29317\ 67523\ 84674\ 81846\ 76694$
 $05132\ 00056\ 81271\ 45263\ 56082\ 77857\ 71342\ 75778\ 96091\ 73637$
 $17872\ 14684\ 40901\ 22495\ 34301\ 46549\ 58537\ 10507\ 92279\ 68925$
 $89235\ 42019\ 95611\ 21290\ 21960\ 86403\ 44181\ 59813\ 62977\ 47713$
 $09960\ 51870\ 72113\ 49999\ 99837\ 29780\ 49951\ 05973\ 17328\ 16096$
 $31859\ 50244\ 59455\ 34690\ 83026\ 42522\ 30825\ 33446\ 85035\ 26193$
 $11881\ 71010\ 00313\ 78387\ 52886\ 58753\ 32083\ 81420\ 61717\ 76691$
 $47303\ 59825\ 34904\ 28755\ 46873\ 11595\ 62863\ 88235\ 37875\ 93751$
 $95778\ 18577\ 80532\ 17122\ 68066\ 13001\ 92787\ 66111\ 95909\ 21642$
 $01989...$

История числа π






Проблеме π – 4000 лет. Исследователи древних пирамид установили, что частное, полученное от деления суммы двух сторон основания на высоту пирамиды, вырабатывается числом 3,1416. В знаменитом папирусе Ахмеса приводится такое указание для построения квадрата, равного по площади кругу: «Отбрось от диаметра его девятую часть и построй квадрат со стороной, равной остальной части, будет он эквивалентен кругу». Из этого следует, что у Ахмеса $\pi \approx 3,1605$. Так началась письменная история π .



В Вавилоне в V в. до н.э. пользовались числом 3,1215, а в Древней Греции числом $(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \approx 3,1462643$. В индийских «сутрах» VI – V в. до н.э. имеются правила, из которых вытекает, что $\pi = 3,008$. Наиболее древняя формулировка нахождения приблизительного значения отношения длины окружности к диаметру содержится в стихах индийского математика Аршабхата (V – VI в.):

*Прибавь четыре к сотне и умножь на восемь,
 Потом ещё шестьдесят две тысячи прибавь,
 Как поделить результат на двадцать тысяч,
 Тогда откроется тебе значение
 Длины окружности к двум радиусам отношенья*

т.е.
$$\frac{\text{äëèíàíêðóæ} \text{ íñòè}}{\text{äèàíàðð}} = \frac{62832}{20000} \approx 3,1416$$



Долгое время все
пользовались
значением числа,
равным

$$\frac{22}{7}$$

Архимед (III в. до н.э.) для
оценки числа π вычислял
периметры вписанных и
описанных многоугольников от
шести до 96-ти. Такой метод
вычисления длины окружности
посредством периметров
вписанных и описанных
многоугольников применялся
многими видными
математиками на протяжении
почти 2000 лет. Архимед
получил:

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}, \text{ т.е. } \pi \approx 3,1418$$


3.1415926

**Индусы в V – VI пользовались числом 3,1611,
а китайцы - числом 3,1415927; это значение
записывалось в виде именованного числа:
3 чжана 1 чи 4 цуня 1 фень 5 ме 9 хао 2 мяо 7 хо.**



В XV веке иранский математик Аль-Каши нашёл значение π с 16-ю верными знаками, рассмотрев вписанный и описанный многоугольники с 80.035.168 сторонами.

Андриан Ван Ромен (Бельгия) в XVI в. с помощью 230-угольников получил 17 верных десятичных знаков



А голландский вычислитель – Лудольф Ван-Цейлен (1540 – 1610), вычисляя π , дошёл до многоугольников с 602 029 сторонами, и получил 35 верных знаков для π . Учёный обнаружил большое терпение и выдержку, несколько лет затратив на определение числа π . В его честь современники называли π – «Лудольфово число». Согласно завещанию на его надгробном камне было высечено найденное им значение π .



Леонард Эйлер



Уильям Джонсон

Обозначение π (первая буква в греческом слове – окружность, периферия) впервые встречается у английского математика Уильяма Джонсона (1706 г.), а после опубликования работы Леонарда Эйлера (1736 г. Санкт-Петербург), вычислившего значение π с точностью до 153 десятичных знаков, обозначение π становится общепринятым.

Различные способы вычисления числа π

Библийское вычислен

числа π

Одно из ранних приближений для числа π можно извлечь из канонического текста Библии, датируемого примерно X-V веками до нашей эры. В третьей книге Царств подробно рассказывается о том, как мастер Хирам соорудил по заказу правителя Иудейского Израильского царства Соломона храм.



Царь Соломон, держащий в руках изображение храма

Это культовое сооружение украшал большой бассейн для омовения священнослужителей под названием «медного моря»: «И сделал литое из меди море, - от края его до края его десять локтей, - совсем круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом.»
(Третья книга Царств. Гл. 7, стих 23.)







Если диаметром этого сосуда было 10 локтей, тогда длина окружности должна была быть 31,415926... локтей, а не просто 30 локтей как написано в Библии!

Любой школьник может сказать вам, что длину окружности круга можно найти, умножив диаметр на π . Эта явная математическая ошибка заставила нас, как христиан, сомневаться в точности Библии.

Длина диаметра в 10 локтей является длиной от наружного обода до наружного обода, так, как любой человек и будет измерять круглый предмет. Окружность длиной в 30 локтей, однако, является внутренним кругом, после вычитания толщины меди (две ладони одна на каждую сторону), из которой был сделан сосуд. Это и будет необходимым числом для вычисления объема воды.



Экспериментальное определение числа пи.

Погрешность измерения.

Воспримем этот текст как древний опыт по экспериментальному определению числа пи и на основании данных оценим погрешность измерения.

Формула для измерения очевидна:

где L - длина окружности,
а D - её диаметр.

$$\pi = \frac{L}{D}$$

Дано: $L = 30$ локтя, $D = 10$ локтей.

Из написания видно, что абсолютные погрешности каждой из величин составляют не менее 0,5 локтя. Мы тем самым берём половину последней значащей цифры, если считать, что каждое из чисел имеет две значащие. Вариант, что погрешность измерения была больше, обсудим в конце вычислений. Рассчитаем измеренное число пи

$$\pi = \frac{30}{10} = 3.0$$

Итак, систематическая погрешность измерений равна

$$\Delta L = 0.5, \Delta D = 0.5$$

Оценим относительную погрешность измерения числа пи как среднеквадратичное от относительных погрешностей данных величин:

$$e_{\pi} = \sqrt{\left(\frac{0.5}{10}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{30}\right)^2} = 0.053$$


Рассчитаем абсолютную погрешность измерения с учётом этой формулы

$$\Delta\pi = e_{\pi} * \pi = 0.16$$

следовательно ответ записывается в виде

$$\pi = 3.00 \pm 0.16$$

Значение числа π , известное нам сейчас с огромной точностью, вполне укладывается в ответ, полученный экспериментально несколько тысяч лет назад. Выходит, что если рассуждать не поверхностно, а с точки зрения методов науки, противоречия между текстом Писания и действительностью нет.



В Библии не содержится ни одной ошибки. Кстати, Соломон сделал это открытие тысячу лет до нашей эры, задолго до того как греки снова нашли число пи.

Начертим на плотном картоне окружность диаметра d (15 см), вырежем получившийся круг и обмотаем вокруг него тонкую нить. Измерив длину L (46,5 см) одного полного оборота нити, разделим L на длину диаметра окружности.

Получившееся частное будет приближенно $\frac{L}{2R}$ значением числа π , т.е.

$$\pi = \frac{L}{2R}, \pi = 46,5 \text{ см} / 15 \text{ см}.$$




$\pi = 3,1$. Данный довольно грубый способ даёт в обычных условиях приближённое значение числа

π с точностью до 1.



Простейшие вычисления

Простейшие вычисления





Следуя данным рекомендациям, мы выполнили измерения и вычислили число π . Получили результаты представленные в таблице:

Номер измерения	Диаметр	Длина окружности	Число π
I	20	63	3,15
II	15	47,3	3,153
III	10	31	3,1

Измерение с помощью взвешивания

На листе картона начертим квадрат. Впишем в него круг. Вырежем квадрат. Вырежем из квадрата круг.



Измерение с помощью взвешивания


Определим массу картонного квадрата с помощью школьных весов. Взвесим круг. Зная массы квадрата $m_{\text{кв}}$ (10 г) и вписанного в него круга $m_{\text{кр}}$ (7,8 г), воспользуемся формулами $m=rV$, $V=Sh$, где r и h -соответственно плотность и толщина картона, S -площадь фигуры. Рассмотрим равенства: $m_{\text{кв}} = r S_{\text{кв}} h = r 4 R^2 h$, $m_{\text{кр}} = r S_{\text{кр}} h = r \pi R^2 h$.

Отсюда $m_{\text{кр}} : m_{\text{кв}} = \pi : 4$, $\pi = 4 m_{\text{кр}} : m_{\text{кв}}$.



$$\pi = 4 m_{\text{кр}} / m_{\text{кв}} = 4 * 7,8 / 10 = 3,12.$$

Суммирование площадей прямоугольников, вписанных в полукруг.



Пусть $A(a,0)$, $B(b,0)$. Опишем на AB полуокружность как на диаметре. Разделим отрезок AB на n равных частей точками x_1, x_2, \dots, x_{n-1} и восстановим из них перпендикуляры до пересечения с полуокружностью. Длина каждого такого перпендикуляра - это значение функции $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

Площадь S полукруга можно вычислить по формуле

$$S = \frac{b-a}{n} (f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}))$$

В нашем случае $b = 1$, $a = -1$. Тогда $\pi \approx 2S$.

Программа

```
10 REM *** ВЫЧИСЛЕНИЕ  $\rho$  ***  
20 REM *** МЕТОД ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ ***  
30 INPUT N  
40 DX 1/N  
50 FOR I=0 TO N-1  
60 F=SQR(1-X^2)  
70 X=X+DX  
80 A=A+F  
90 NEXT I  
100 P=4*DX*A  
110 PRINT «ЗНАЧЕНИЕ  $\rho$  РАВНО»; P  
120 STOP
```

Полученные значения числа записаны в таблице

n	1000	2000	3000	4000	5000	6000
π	3.292	3.216	3.190667	3.181	3.1848	3.192

n	7000	8000	9000	10000	11000	12000
π	3.193714	3.1935	3.192889	3.196	3.192	3.193667


**Суммирование площадей прямоугольников,
вписанных в полукруг.**

Метод Монте-Карло

Это фактически метод статистических испытаний. Свое экзотическое название он получил от города Монте-Карло в княжестве Монако, знаменитого своими игорными домами. Дело в том, что метод требует применения случайных чисел, а одним из простейших приборов, генерирующих случайные числа, может служить рулетка. Впрочем, можно получить и при помощи ... дождя.

Метод Монте-Карло

Для опыта приготовим кусок картона, нарисуем на нём квадрат и впишем в квадрат круг. Если такой чертёж некоторое время подержать под дождём, то на его поверхности останутся следы капель.



Метод Монте-Карло

Подсчитаем число следов внутри квадрата и внутри круга. Очевидно, что их отношение будет приближенно равно отношению площадей этих фигур, так как попадание капель в различные места чертежа равновероятно. Пусть $N_{кр}$ - число капель в круге, $N_{кв}$ - число капель в квадрате, тогда

$$\pi = 4N_{кр} / N_{кв}$$

Применение метода Монте-Карло стало возможным только благодаря компьютерам

Программа 2

```
10 REM *** ВЫЧИСЛЕНИЕ ПИ ***
20 REM *** МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ***
30 INPUT N
40 M=0
50 FOR I=1 TO N
60 T=INT (RND(1)*10000)
70 X=INT(T/100)
80 Y=T-X*100
90 IF X^2+Y^2<10000 THEN M=M+1
100 NEXT I
110 P=4*M/N
120 PRINT " ЗНАЧЕНИЕ ПИ РАВНО" ; P
130 STOP
```

Полученные значения числа записаны в таблице

n	1000	2000	3000	4000	5000	6000
π	3.14357	3.14253	3.14231	3.14214	3.14212	3.14206

n	7000	8000	9000	10000	11000	12000
π	3.14184	3.14197	3.14193	3.14169	3.14203	3.14193

Вычисление с помощью ряда Тейлора

Обратимся к рассмотрению
произвольной функции $f(x)$.

Предположим, что для неё в точке x_0
существуют производные всех
порядков до n -го включительно.

Тогда для функции $f(x)$ можно
записать ряд Тейлора:

$$f(x) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots$$

Вычисление с помощью ряда Тейлора

Программа

```
REM "Вычисление пи"  
REM "Разложение в ряд Тейлора "  
INPUT n  
a = 1  
FOR i = 1 TO n  
d = 1 / (i + 2)  
f = (-1) ^ i * d  
a = a + f  
NEXT i  
p = 4 * a  
PRINT "значение пи равно"; p  
END
```

Вычисление с помощью ряда Тейлора

n	1000	2000	3000	4000	5000	6000
π	3.22941	3.22841	3.22809	3.22792	3.22782	3.22776

n	7000	8000	9000	10000	11000	12000
π	3.22771	3.22767	3.22765	3.22763	3.22761	3.22759

День Числа Пи

$\pi \approx$ 3,241 592 653 589 793 238 462 643
383 279 502 884 197 169 399 375 105
820 974 944 592 307 816 406 286 208
998 628 034 825 342 117 067 982 148
086 5 13 282 306 647 093 844 609 550
582 231 725 359 408 128 481 117 450
02 701 938 521 105 559 644 622
954 930 381 964 428 810 975 665
03 446 128 475 648 233 786 783 165
271 201 909 145 648 566 923 460 348
610 454 326 648 213 393 607 260 249
141 273 7 24 587 006 606 315 588 174
881 520 920 962 829 254 091 715 364
367 892 590 360 011 330 530 548 820
466 521 384 146 951 941 511 609 433
057 270 365 759 591 953 092 186 117
081 932 611 793 105 118 548 074 462
092 962 749 567 351 885 751 724 897
038 183 011 949



С праздником!