

Обобщающий урок по
теме

**Формулы
сокращенно**

20

УМНОЖЕНИЯ

Историческая страница

Число – арифмос (греч.)

Геометрия –
гео – земля (греч.), метрео –
меряю (греч.)


Аль джебр –
восстановление (арабск.)

Евклид. «Начала». Издание 1482 г.



Propositio .2.

Si fuerit linea i ptes diuisa illud qd ex ductu totius linee in seipsa fiet equu erit bis q ex ductu eiusde i oes suas ptes. Et sic linea a. b. diuisa sit a. c. e. d. b. dico qd illud qd fit ex ductu totius a. b. in se qd fit a. c. b. f. equu est bis que sunt ex ipso tota in unamquodqz partem qd palam patet. ductis e. g. e. d. b. equidistantibus a. c. e. b. f. Et iterum ducatur k. equu a. b. utiqz p partem illam qd fit ex ductu k. in totam a. b. equu erit qd fit ex ductu k. in omnes ptes a. b. et qd ex k. i. a. b. ita ut sit quantu ex a. b. in se. e. ex k. in omnes ptes a. b. quousqz ex a. b. in omnes ptes eiusde. ppter id qd k. e. a. b. sit equalis pater esse proposuim.



Propositio .3.


Si fuerit linea in duas ptes diuisa illud qd fiet ex ductu totius in alterutra parte equu erit bis q ex ductu eiusde parte in seipsam et alterutra in alteram.



Propositio .4.

Si fuerit linea in duas ptes diuisa illud qd ex ductu totius i seipsa fit equu e bis q ex ductu utriusqz pte i seipsa et altera i altera bis. Ex hoc manifestu e qd i oi qdrato due suplicies quas diameter secat pmediu sunt ambe quadrate.

Et sic linea a. b. diuisa sit a. c. e. b. e. dico qd quadratum totius a. b. equu est duobus quadratis quarum linearum a. c. e. b. e. duplo eius qd fit ex ductu unius eaz in alteram describam quadratum alterius partium itaqz e. d. b. e. quadratu linee e. b. an adinquantur promone secunda ductu directu linee alterius scz a. c. qd factam hoc modo. in quadrato uterpro protraham diametru b. d. et a puncto a. educam perpe dicularem sup lineam a. b. que sit a. k. qua. a. k. e diameter b. d. producam vsqz quo concurrat in puncto f. e a puncto f. producam f. b. equidistanti linee a. b. qua. f. b. e. b. e. producam vsqz quo concurrat i puncto g. et produca e. d. vsqz ad b. e. c. d. vsqz ad h. Et quia duo latera d. e. e. c. b. trian guli d. e. b. sunt equalia: erit pti. 5. pmi duo anguli e. d. b. e. e. b. d. equalia: et qd angulus e. c. e. rectus erit p. 32. pmi utiqz eoz medietas recti. Eade rone uterqz qd duoru anguloru e. d. b. e. e. b. d. erit medietas recti. quare p. secunda pmi. 29. pmi erit unusquisqz quatuor angulor qui sunt b. f. d. e. b. d. f. e. k. f. d. e. k. d. f. utriusqz recti ergo p. 6. pmi. f. g. e. g. b. sunt equalia. similiter queqz. f. a. e. a. b. pari rone. f. b. e. b. d. itoz. f. k. e. k. d. quare utraqz duaru supliciu a. b. g. f. e. k. d. b. f. est quadrato et qd totale quadratum a. b. f. g. qd est quadratu linee a. b. constat ex duobus quadratis que consistunt circa diametru que sunt quadrata quarum linearum a. c. e. b. e. et ex duobus suplicentiis quoz uniusqzqz ptecu ex a. c. in b. e. patet proposuim nostru. Et aliter sit linea a. b. ut pmo diuisa in a. c. e. c. b.




Евклид. «Начала».

«Если отрезок как-либо разбит на два отрезка, то площадь квадрата, построенного на всем отрезке, равна сумме площадей квадратов, построенных на каждом из двух отрезков, и удвоенный площади прямоугольника, сторонами которого служат эти два отрезка.»

Суть этой фразы в формуле

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Изобразить эту формулу
геометрически можно так:



Три способа формулировки математических утверждений:

- 1) **Словесный** – понятный, но длинный, неудобный;
- 2) **Геометрический** – наглядный, но не всегда удобный для вычисления;
- 3) **Символьный** – краткий, легко запоминающийся.

Аль джебр — восстановление
(арабск.)

algebra



Тренировочн ые упражнения

Составьте по описанию алгебраические выражения:

1. Сумма квадратов чисел a и b .
2. Разность между числом m и удвоенной суммой чисел a и b .
3. Квадрат разности чисел b и a .
4. Разность квадратов чисел a и b , умноженная на сумму этих чисел.

**Запишите в виде степени
выражения:**

$$a^2 b^2 c^2; \quad 25a^2 b^2;$$

$$\frac{1}{125} x^3 y^3; \quad \frac{a^2 b^2}{c^2}.$$

Найдите неизвестное x :

1. $(2^4)^x = 2^{12};$

2. $10^x = 10000;$

3. $5^3 \cdot 5^4 = 5^{2+x};$

4. $0,1^x = 0,01.$

Заполните пропуски в формулах:

$$(a + \dots)^2 = \dots + 2ab + \dots ;$$

$$(a \dots b) \dots = a^2 - 2ab + \dots ;$$

$$a^3 - \dots = (a - b)(\dots + ab + \dots);$$

$$a^3 + b^3 = (\dots \dots)(a^2 \dots + b^2);$$

$$a^2 - b^2 = (\dots b)(a - \dots).$$

Расширение знаний по формулам сокращенного умножения

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Геометрическое доказательство

	a	b	c
a	a²	ab	ac
b	ab	b²	bc
c	ac	bc	c²

Найдите квадрат выражения:

а) $(a - x + y)^2$

б) $(a - b - c)^2$

Треугольник Паскаля

Блез Паскаль (1623 – 1662)



Рассмотрим двучлены:

$$(a + b)^0 = 1$$

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Составим таблицу из их коэффициентов:

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1



Закон образования коэффициентов

$$1 - 2^0$$

$$1 \ 1 - 2^1$$

$$1 \ 2 \ 1 - 2^2$$

$$1 \ 3 \ 3 \ 1 - 2^3$$

Вариации числа **100**

Рассмотрим комбинации числа 100:

$$100 = 50 + 50;$$

$$100 = 38 + 62;$$


$$100 = 99 + \frac{99}{99};$$

$$100 = 101 - \frac{101}{101};$$

$$100 = (1 + 2 + 3 + 4)^2;$$

$$100 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3.$$

Изменив положение
одной цифры, добейтесь,
чтобы равенство **102 =**
100 было верным.



Примеры вариантов некоторых формул:

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$$

$$a^2 = (a - b)(a + b) + b^2$$

The background of the slide features a pattern of stylized autumn leaves in various shades of orange and brown, set against a darker orange gradient background. The leaves are scattered across the frame, with some showing detailed vein patterns.

Вычисление квадрата числа

$$a^2 = a^2 - b^2 + b^2 = (a - b)(a + b) + b^2,$$

где b – дополнение числа a до круглого числа.

Пример.

Вычислите 986^2

1. Круглое число 1000.

$$a = 986, b = 14, a + b = 1000, a - b = 972.$$


$$2. 986^2 = 972 \cdot 1000 + 14^2 = 972000 + 196 = 972196.$$

Вычислите:

1) 195^2

2) 488^2

Математический софизм



Докажем, что 4 = 5.

1. Рассмотрим две разности: $16 - 36$ и $25 - 45$.

2. Добавим число $\frac{81}{4}$. Имеем: $16 - 36 + \frac{81}{4} = 25 - 45 + \frac{81}{4}$.


3. Представим эти выражения так:

$$4^2 - 2 \cdot 4 \cdot \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2 = 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2.$$

4. Используем формулу: $\left(4 - \frac{9}{2}\right)^2 = \left(5 - \frac{9}{2}\right)^2$.

5. Получаем: $4 - \frac{9}{2} = 5 - \frac{9}{2}$, $4 = 5$.

Домашнее задание



1. Обратите внимание на пирамиды чисел:

а) $1 \cdot 8 + 1 = 9$, $12 \cdot 8 + 2 = 98$, $123 \cdot 8 + 3 = 987$.

А как дальше?

б) $1^2 = 1$, $11^2 = 121$, $111^2 = ?$

2. Возведите в степень:

а) $(2a - b + c)^2$; б) $(a + b)^4$.

3. Вычислите: а) 976^2 ; б) 295^2 .

...Мне мудрость не чужда была
земная, Разгадки тайн ища, не
ведал сна я. За семьдесят
перевалило мне, Что ж я
узнал! - Что
ничего не знаю.

Омар Хайям



Обобщающий урок по

теме

Формулы

сокращенн

ого

умножения