

10784.36  
5x  
2.719372  
**9÷1**

10784.36  
5x  
2.719372  
**9÷1**

# Квадратные уравнения: методы решения.


10784.36  
5x  
2.719372  
**9÷1**

10784.36  
5x  
2.719372  
**9÷1**

**«Уравнение - это золотой ключ,  
открывающий все  
математические сезамы».**

**С. Коваль.**

# ***ПЛАН УРОКА***

- 1. Теоретическая разминка.***
  - 2. Энциклопедия квадратных уравнений.***
  - 3. Думающий колпак.***
  - 4. Историческая справка.***
  - 5. Копилка ценных мыслей.***
  - 6. Домашнее задание.***
- 



## Вопросы теоретической разминки:

1. Сформулируйте определение квадратного уравнения.
2. Объясните, в чём заключается смысл ограничения в определении квадратного уравнения ( $a \neq 0$ ).
3. Перечислите виды квадратных уравнений.
4. Какое квадратное уравнение называется неполным? Приведите пример. [подробнее](#)
5. Какое квадратное уравнение называется приведённым? Приведите пример.
6. Способы решения полного квадратного уравнения? [подробнее](#)



$$ax^2 + bx + c = 0$$

# Специальные методы:

1. Метод выделения квадрата двучлена.
2. Метод «переброски» старшего коэффициента.
3. На основании теорем.





# Общие методы:

Разложение на множители;

Введение новой  
переменной;

Графический метод.





# ДУМАЮЩИЙ КОЛПАК

**Большим и указательным пальцами мягко оттягивают назад и прижимают, массируя, раковины ушей.**

## УЧЕБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- **Держите голову прямо, чтобы подбородку было удобно.**
- **Упражнение повторяют трижды или более раз.**



Впервые ввёл термин «квадратное уравнение» немецкий философ **Кристиан Вольф**.




**Кристиан Вольф** - знаменитый немецкий философ, родился в 1679 г. в Бреславле, в семье простого ремесленника, изучал в Йене сначала богословие, потом математику и философию.

[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD\\_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84)





**Сильвестр Джеймс Джозеф – английский математик, который ввел термин «дискриминант».**



В 13 – 16 веках даются отдельные методы решения различных видов квадратных уравнений. Слияние этих методов произвел в 1544 году немецкий математик – **Михаэль Штифель**. Это было настоящее событие в математике.



[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C\\_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C)

# Домашнее задание

• Решите уравнение  $3x^2 + 5x + 2 = 0$ :

1. используя формулу дискриминанта – «3»,
2. двумя способами – «4»,
3. тремя способами – «5».

## Дополнительно.

• Решите уравнение  $(x^2 - x)^2 - 14(x^2 - x) + 24 = 0$  методом введения новой переменной.



# Энциклопедия квадратного уравнения

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(a \neq 0)$$



[подробнее](#)

# РЕШЕНИЕ НЕПОЛНЫХ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ

$$b=0$$

$$ax^2+c=0$$

*подробнее*

$$c=0$$

$$ax^2+bx=0$$

*подробнее*

$$b, c=0$$

$$ax^2=0$$

*подробнее*





# Алгоритм решения

$$b=0$$

$$ax^2+c=0$$

1. Переносим  $c$  в правую часть уравнения.

$$ax^2 = -c.$$

2. Делим обе части уравнения на  $a \neq 0$ .

$$x^2 = \frac{-c}{a}.$$

3. Если  $-c/a > 0$  - два решения:

$$x_1 = \sqrt{(-c)/a} \text{ и } x_2 = -\sqrt{(-c)/a}$$

Если  $\frac{-c}{a} < 0$  - нет решений.

# Алгоритм решения

$$c=0$$

$$ax^2+bx=0$$

1. Выносим  $x$  за скобки:

$$x(ax + b) = 0.$$

2. «Разбиваем» уравнение на два:

$$x = 0, ax + b = 0.$$

3. Два решения:

$$x = 0 \text{ и } x = \frac{-b}{a} \quad (a \neq 0).$$



# Алгоритм решения

$$b, c = 0$$

$$ax^2 = 0$$

1. Делим обе части уравнения на  $a \neq 0$ .

$$x^2 = 0$$

2. Одно решение:  $x = 0$ .

Подведём итог!

## Неполные квадратные уравнения:

$$ax^2 = 0$$

$$x = 0$$

$$ax^2 + bx = 0, \\ (b \neq 0)$$

$$x = 0, \\ x = -\frac{b}{a}$$

$$ax^2 + c = 0, \\ (c \neq 0)$$

Если  $-\frac{c}{a} < 0$ , то корней нет

Если  $-\frac{c}{a} > 0$ , то  $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$\underline{D < 0}$$

**Корней нет**

$$\underline{D = 0}$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

$$\underline{D > 0}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$b = 2k$  (чётное число)

$$D_1 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac$$

$$x = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{D_1}}{a}$$

$$(D_1 \geq 0)$$

# Теорема Виета

если  $x_1$  и  $x_2$  – корни уравнения  $x^2 + px + q = 0$

то  $x_1 + x_2 = -p$  ( $D \geq 0$ )

$$x_1 \cdot x_2 = q$$

если  $x_1$  и  $x_2$  – корни уравнения  $ax^2 + bx + c = 0$

то  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$  ( $D \geq 0$ )

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$



# Метод выделения квадрата двучлена.

**Суть метода:** привести квадратное уравнение общего вида к неполному квадратному уравнению.

**Пример:**  $x^2 - 6x + 5 = 0.$

[подробн  
ее](#)



# Метод «переброски» старшего коэффициента.

Корни квадратных уравнений

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{и} \quad y^2 + by + ac = 0$$

связаны соотношениями

$$x_1 = \frac{y_1}{a} \quad \text{и} \quad x_2 = \frac{y_2}{a}$$

[подробнее](#)

**Пример:**  $2x^2 - 9x - 5 = 0.$



# На основании теорем:

Если в квадратном уравнении  $a+b+c=0$ , то один из корней равен 1, а второй по теореме Виета равен  $\frac{c}{a}$

Если в квадратном уравнении  $a+c=b$ , то один из корней равен -1, а второй по теореме Виета равен  $\left(-\frac{c}{a}\right)$

Примеры:  $200x^2 + 210x + 10 = 0$ .

[подробнее](#)





# Метод разложения на множители

**Цель:** привести квадратное уравнение общего вида к виду  $A(x) \cdot B(x) = 0$ ,  
где  $A(x)$  и  $B(x)$  – многочлены относительно  $x$ .

**Способы:**

- Вынесение общего множителя за скобки;
- Использование формул сокращенного умножения;
- Способ группировки.

**Пример:**  $4x^2 + 5x + 1 = 0$ .

[подробнее](#)

# Введение новой переменной.

Удачный выбор новой переменной делает структуру уравнения более прозрачной.

**Пример:**  $(2x+3)^2 = 3(2x+3) - 2.$

[подробн  
ее](#)



## Графический метод

Для решения уравнения  $f(x) = g(x)$  необходимо построить графики функций

$$y = f(x), \quad y = g(x)$$


и найти точки их пересечения; абсциссы точек пересечения и будут корнями уравнения.

**Пример:**  $x^2 = x + 2$ .

[подробн  
ее](#)



**Графический метод часто применяют не для нахождения корней уравнения, а для определения их количества.**



# Метод выделения квадрата двучлена.

**Решим уравнение  $x^2 - 6x + 5 = 0$ .**

$$x^2 - 6x + 5 = 0.$$

$$(x - 3)^2 - 4 = 0.$$

$$(x - 3)^2 = 4.$$

$$x - 3 = 2 ; x - 3 = -2.$$

$$x = 5, x = 1.$$

**Ответ:** 5; 1.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$





# Метод “переброски” старшего коэффициента

Решите уравнение  $2x^2 - 9x - 5 = 0$ .

$$y^2 - 9y - 10 = 0.$$

$D > 0$ , по теореме, обратной теореме Виета, получаем корни: -1; 10, далее возвращаемся к корням исходного уравнения: -0,5; 5.

**Ответ:** 5; -0,5.

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ и } y^2 + by + ac = 0$$

связаны соотношениями:

$$x_1 = \frac{y_1}{a} \quad x_2 = \frac{y_2}{a}$$



**Теорема 1.** Если в квадратном уравнении  $a + b + c = 0$ , то один из корней равен 1, а второй по теореме Виета равен  $\frac{c}{a}$

**Решите уравнение  $137x^2 + 20x - 157 = 0$ .**

$$137x^2 + 20x - 157 = 0.$$

$$a = 137, b = 20, c = -157.$$

$$a + b + c = 137 + 20 - 157 = 0.$$

$$x_1 = 1, x_2 = -157/137.$$

**Ответ:** 1;  $-157/137$ .



**Теорема 2.** Если в квадратном уравнении  $a + c = b$ , то один из корней равен  $-1$ , а

второй по теореме Виета равен  $\left(-\frac{c}{a}\right)$

**Решите уравнение  $200x^2 + 210x + 10 = 0$ .**

$$200x^2 + 210x + 10 = 0.$$

$$a = 200, b = 210, c = 10.$$

$$a + c = 200 + 10 = 210 = b.$$

$$x_1 = -1, x_2 = -\frac{10}{200}$$

**Ответ:**  $-1; -0,05$



# Метод разложения на множители.

**Решите уравнение  $4x^2 + 5x + 1 = 0$ .**

$$4x^2 + 5x + 1 = 0.$$

$$4x^2 + 4x + x + 1 = 0.$$

$$4x(x+1) + (x+1) = 0.$$

$$4x(x + 1) = 0.$$

Произведение двух множителей равно нулю, если хотя бы один из них равен нулю, а второй при этом не теряет смысла, или когда оба равны нулю.

$$4x = 0 \text{ и } x + 1 = 0.$$

$$x = 0, x = -1.$$

**Ответ:** 0; -1.



# Метод введения новой переменной.

**Решите уравнение  $(2x+3)^2 = 3(2x+3) - 2$ .**

$$(2x+3)^2 = 3(2x+3) - 2.$$

Пусть:  $t = 2x + 3$ .

Произведем замену переменной:  $t^2 = 3t - 2$ .

$$t^2 - 3t + 2 = 0. D > 0.$$

По теореме, обратной теореме Виета:  $t_1 = 1, t_2 = 2$ .

Произведем обратную замену и вернемся к переменной  $x$ , получим следующие корни:

-1; -0,5.

**Ответ:** -1; -0,5.






	№ уравнения	№ метода
1	$100x^2 + 53x - 153 = 0$	
2	$20x^2 - 6x = 0$	
3	$299x^2 + 300x + 1 = 0$	
4	$3x^2 - 5x + 4 = 0$	
5	$7x^2 + 8x + 2 = 0$	
6	$35x^2 - 8 = 0$	
7	$4x^2 - 4x + 3 = 0$	
8	$(x - 8)^2 - (3x + 1)^2 = 0$	
9	$4(x - 1)^2 + 0,5(x - 1) - 1 = 0$	
10	$12x^2 = 0$	

1. $b, c = 0$ $ax^2 = 0$	4. $b$ - нечётное $ax^2 + bx + c = 0$
2. $c = 0$ $ax^2 + bx = 0$	
3. $b = 0$ $ax^2 + c = 0$	
5. $b$ - чётное $ax^2 + bx + c = 0$	
6. Теорема Виета.	
7. Метод выделения квадрата двучлена.	
8. Метод «переброски» старшего коэффициента.	
9. T1 или T2.	
10. Метод разложения на множители.	
11. Метод введения новой переменной.	



<b>№ метода</b>	<b>шифр</b>
1	!
2	те
3	но
4	тик
5	нем
6	ке
7	до
8	го
9	ма
10	по
11	эт
12	ру
13	-



№ уравнения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Слог										



<http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/158739/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81>

**Математик немного поэ**  
*Т. Вейерштрасс*

