

Логарифмы

План:

- *Определение.*
- *Свойства.*
- *Десятичные и натуральные логарифмы.*
- *Логарифмическая функция, ее свойства и график.*
- *Решение логарифмических уравнений и неравенств.*



Определение логарифма:

- Логарифмом положительного числа b по основанию a , где $a>0$, $a\neq 1$, называется показатель степени, в которую надо возвести число a , чтобы получить b .
- Основное логарифмическое тождество:
$$a^{\log ab} = b, \text{ где } b>0, a>0$$
- Действие нахождения логарифма называется **логарифмированием**.



Свойства логарифмов:

- $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$
- $\log_a(b/c) = \log_a b - \log_a c$
- $\log_a b^r = r \log_a b$
- $\log_a b = \log_c b / \log_c a$
- $\log_a b = 1 / \log_b a$
- $a^{\log bc} = c^{\log ba}$
- $\log_{ar} b = 1/r \log_a b$
- $a^{\log ab} = b$

Десятичные и натуральные логарифмы:

- *Десятичным логарифмом* числа называют логарифм этого числа по основанию 10. Записывается $\lg b$
- *Натуральным логарифмом* числа называют логарифм этого числа по основанию e , где e -иrrациональное число, приближенно равное 2,7. При этом записывается $\ln b$





Логарифмическая функция.

- **Логарифмическая функция: $y=\log_a x$**
Свойства:
 1. Множество значений логарифмической функции - множество всех положительных чисел
 2. Множество значений логарифмической функции-множество \mathbb{R} всех действительных чисел.
 3. Логарифмическая функция $y=\log_a x$ является возрастающей на промежутке $x>0$, если $a>1$, и убывающей, если $0<a<1$
 4. Если $a>1$, то функция $y=\log_a x$ принимает положительные значения при $x>1$, отрицательные при $0<x<1$. Если $0<a<1$, то функция $y=\log_a x$ принимает положительные значения при $0<x<1$, отрицательные при $x>1$.
 5. Логарифмическая функция $y=\log_a x$ и показательная функция $y=a^x$, где $a>0$, $a\neq 1$, взаимно обратны.



Логарифмическая функция и её график:



Логарифмические уравнения

Решить уравнение:

$$\log_2(x+1) + \log_2(x+3) = 3$$

Решение:

Используя свойство логарифма, получаем:

$$\log_2(x+1)(x+3) = 3$$

Из этого равенства по определению логарифма получаем:

$$(x+1)(x+3) = 8.$$

Теперь раскроем скобки и решим квадратное уравнение $x^2 + 4x - 5 = 0$,
откуда $x_1 = 1$, $x_2 = -5$

При $x_2 = -5$ числа $(x+1)$ и $(x+3) < 0$, следовательно $x = -5$ не является
корнем уравнения.

Ответ. $x = 1$



Решение систем:

Решить систему уравнений:

$$\begin{cases} \log_2 x - \log_2 y = 1, \\ 4y^2 + x - 12 = 0. \end{cases}$$

Решение:

Из первого уравнения выразим x через y :

$\log_2 x/y = \log_2 2$, $x/y = 2$, $x = 2y$. Подставив $x=2y$ во второе уравнение системы, получим $4y^2 + 2y - 12 = 0$, откуда $y_1 = \frac{3}{2}$, $y_2 = -2$. Найдем значения x : $x_1 = 3$, $x_2 = -4$. Проверка показывает, что -4 и -2 – постороннее решение.

Ответ. $x=3$, $y=\frac{3}{2}$.

Логарифмические неравенства:

- Решить неравенство:

$$\log_2(x-3) + \log_2(x-2) \leq 1$$

Решение:

О.о. $x > 3$.

Используя свойства логарифма, получаем:

$\log_2(x-3)(x-2) \leq \log_2 2$. Логарифмическая функция с основанием 2 является возрастающей, поэтому при $x > 3$ неравенство $\log_2(x-3)(x-2) \leq \log_2 2$ выполняется при $(x-3)(x-2) \leq 2$. Это неравенство можно записать в виде системы уравнений:

$$\begin{cases} (x-3)(x-2) \leq 2 \\ x > 3 \end{cases}$$



Лавенюкова