

«Логарифмы. Логарифмическая функция»

Презентацию подготовила
Ученица ФМЛ №1568 10 «А» класса
Воробьёва Алексия

Определение логарифма

Логарифмом числа b ($b>0$) по основанию a ($a>0, a \neq 1$) называется показатель степени, в которую надо возвести основание a , чтобы получить число b .

Обозначается $\log_a b$ (логарифм числа b по основанию a).

Десятичным логарифмом
называют логарифм по
основанию **10** и обозначают **lg.**
Натуральным логарифмом
называется логарифм по
основанию **e** и обозначается **ln**
($e \approx 2.71828\dots$) .

Основное логарифмическое тождество

$$a^{\log_a b} = b,$$

где $a, b > 0, a \neq 1$

Правила логарифмирования

1. Логарифм произведения равен сумме логарифмов

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c, \text{ где } b, c, a > 0, a \neq 1$$

2. Логарифм частного равен разности логарифмов

$$\log_a(b \div c) = \log_a b - \log_a c, \text{ где } b, c, a > 0, a \neq 1$$

3. Логарифм степени равен произведению показателя степени на логарифм ее основания

$$\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b, \text{ где } b, a > 0, a \neq 1$$

4. Дополнительные формулы

$$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b, \text{ где}$$

$$b, a > 0; a \neq 1; m \neq 0$$

5. Переход к новому основанию

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}, \text{ где}$$

$$b, a > 0, a \neq 1, b \neq 1; N > 0$$

**Следств
ие**

$$\log_a N = \frac{1}{\log_N a} , \text{где}$$

$$a > 0, a \neq 1, N > 0$$

Логарифмическая функция

Функция вида

$y = \log_a x$, где a – заданное число, $a > 0, a \neq 1$
называется логарифмической функцией.

Основные свойства

1. Область определения: **Множество всех положительных чисел , $[0; +\infty]$**
2. Множество значений: **Множество всех действительных чисел, $[-\infty; +\infty]$**


3. Логарифмическая функция $y = \log_a x$
является возрастающей на промежутке $x > 0$, если
 $a > 1$

Логарифмическая функция $y = \log_a x$
является убывающей на промежутке $x > 0$, если
 $0 < a < 1$

4. Если $a > 1$, то функция $y = \log_a x$ принимает положительные значения при $x > 1$, отрицательные при $0 < x < 1$.

Если $0 < a < 1$, то функция
 $y = \log_a x$ принимает положительные значения при
 $0 < x < 1$, отрицательные при $x > 1$

$$y = \log_a x, a > 1$$



$$y = \log_a x, 0 < a < 1$$

