



Математический словарь

Содержание

АРХИТ ТАРЕНТСКИЙ

АСИПТОТЫ

БИСЕКТРИСА ТРЕУГОЛЬНИКА

БЕРНУЛЛИ ЯКОБ

ВЕКТОР

ВЫСОТА ЦИЛИНДРА

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МЕСТО ТОЧЕК

ЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ

ЛОМАННАЯ

ЛУЧ

ОСТРЫЙ УГОЛ

ОСТРОГРАДСКИЙ М.В.

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ НА ПЛОСКОСТИ

ПОДОБИЕ

ТЕОРЕМА

ТОЧКА

ТОРРИЧЕЛЛИ ЭВАНДЖЕЛИСТА


АТ-ТУСИ

УГОЛ

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ НА СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ

Архит Тарентский

Архит Тарентский (428-347 г. до н.э.) - знаменитый древнегреческий математик, астроном и государственный деятель. Он обладал большим талантом и трудолюбием. Его труды оказали влияние на Платона и Евклида. Архит был неумомим: он доказывал теоремы и строил деревянного летающего голубя, решал задачу об удвоении куба и мастерил детскую трещотку.



Асимптоты


Асимптоты графика функции. Пусть $y=f(x)$ - функция, график которой имеет бесконечную ветвь, т.е. ветвь, имеющую точки, принадлежащие графику функции и находящиеся сколь угодно далеко от начала координат.

Асимптотой графика функции $y=f(x)$ называют прямую, обладающую тем свойством, что расстояние от точки $(x;f(x))$ до этой прямой стремится к нулю при движении этой точки вдоль ветви к бесконечности.

Асимптоты бывают двух видов: вертикальные и наклонные (в частности, горизонтальные).


Рассмотрим графики функций, имеющие вертикальные асимптоты:

Асимптоты




Вертикальная асимптота
 $x=0$;



Наклонная асимптота
 $y=2x$



Наклонная асимптота
(горизонтальная)
 $y = 0$



Биссектриса треугольника



Биссектриса треугольника - отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой противоположной стороны. Точка пересечения биссектрис треугольника является центром вписанной в него окружности.

Отрезки AA_1 , BB_1 и CC_1 – биссектрисы $\triangle ABC$; O – вписанный центр окружности.

Биссектриса AD треугольника ABC делит сторону BC на отрезки BD и DC , пропорциональные сторонам AB и AC .

Биссектриса AD треугольника ABC делит его на два треугольника ABD и ACD , площади которых пропорциональны длинам сторон AB и AC .

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC};$$


$$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{AB}{AC}.$$

Отрезок AD – биссектриса $\triangle ABC$



Бернулли Якоб

Бернулли Якоб (1654-1705) - швейцарский математик, один из ярких представителей семьи ученых Бернулли. Сначала Бернулли занимался изучением теологии, позднее увлекся математикой. Был профессором математики Базельского университета. Якоб Бернулли сформулировал и частично решил ряд важных задач математики и механики. В книге «Арифметические приложения о бесконечных рядах и их конечных суммах», которая была первым учебником по теории рядов, он доказал расходимость гармонического ряда. Решил также ряд задач комбинаторики теории вероятностей, оказал большое влияние на приложение теории вероятностей к практике. Его учениками были брат Иоганн Бернулли, племянник Николай Бернулли.



Вектор

Вектор. Отрезок, для которого указано, какой из его концов считается началом, а какой- концом, называется направленным отрезком, или вектором. Обозначается \overline{AB} (\vec{a}), длина этого отрезка называется длиной вектора. Обозначается $|\overline{AB}|$ ($|\vec{a}|$). Вектор, длина которого равна нулю, называется нулевым. Начало нулевого вектора совпадает с его концом. Любую точку плоскости можно считать нулевым вектором.

Противоположными векторами называются векторы, которые имеют равные длины и противоположные направления.

Ненулевые векторы называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой, или на параллельных прямых; нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору.

Коллинеарные векторы, если они одинаково направлены, называются сонаправленными, если противоположно направлены, называются противоположно направленными.

Обозначаются $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b}; \vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b}$.

Вектор

Векторы называются **равными**, если они сонаправлены и имеют равные длины $\vec{a} = \vec{b}$, если $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$ и $|\vec{a}| = |\vec{b}|$.

Три ненулевых вектора называются комплантарными, если лучи, задающие их направление, принадлежат прямым, параллельным некоторой плоскости.

Над векторами можно проводить следующие операции: сложение векторов, вычитание векторов, умножение вектора на число, скалярное произведение векторов.

Суммой векторов $\vec{a}\{a_1; a_2\}; \vec{b}\{b_1; b_2\}$ называется вектор $\vec{c} = \{a_1 + b_1; a_2 + b_2\}$.

Законы сложения векторов:

Переместительный закон

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$



Сочетательный закон

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

Высота цилиндра

Высота цилиндра - отрезок перпендикулярной прямой, с концами на плоскости основания цилиндра.

Высотой прямого кругового цилиндра является отрезок, соединяющий центры окружностей, являющихся основаниями этого цилиндра.



$$AB \perp a ;$$

AB - высота наклонного цилиндра;
a – плоскость основания.

O и O₁ – центры оснований
прямого кругового цилиндра;
OO₁ - высота.




Геометрическое место точек

Под этим термином понимается всякое множество или совокупность точек, обладающим каким – то общим для них свойством, но неприсущим остальным точкам, не принадлежащим данному или совокупности. В последнее время этот термин стал реже употребляться. **Примеры.**

Геометрическим местом точек, равноудаленных от двух данных точек A и B , является прямая, перпендикулярная отрезку AB и проходящая через его середину.

Даны точки A и B , прямая l перпендикулярна отрезку AB , причём $AO = OB$. Прямая l – геометрическое место точек, равноудалённых от точек A и B на плоскости.


Если рассматривать точки A и B в пространстве, то геометрическим местом точек, равноудалённых от точек A и B , будет плоскость, проходящая через середину отрезка AB и перпендикулярно прямой AB .



Геометрическое место точек

Геометрическим местом точек, равноудалённых от сторон угла, является биссектриса этого угла.

Дан угол ABC , BD – биссектриса $\sphericalangle ACB$. Луч BD – геометрическое место точек, равноудалённых от лучей BA и BC , т.е. $EM \perp BC$ и $EM = EN$.




Геометрическое место точек

Геометрическое место точек, удалённых от данной прямой на расстоянии d , представляет собой пару прямых, параллельных данной и отстоящих от неё на расстоянии d .

Дана прямая a , прямые l_1 и l_2 параллельны прямой a и находятся на расстоянии d от прямой a , т.е. $l_1 \parallel l_2$ и $OA \perp l_1$; $OB \perp l_2$ и $OA=OB=d$. Прямые l_1 и l_2 являются геометрическим местом точек, равноудаленных от прямой, a на плоскости.

Если рассматривать прямую a в пространстве, то геометрическим местом точек, равноудаленных от прямой a являются две плоскости, параллельных прямой, a и находящиеся от неё на одном и той же расстоянии. Эти плоскости являются параллельными плоскостями.




Геометрическое место точек

Геометрическим местом точек, удаленных от данной точки O на расстояние R , является окружность с центром в точке O и радиусом R .

Окружность является геометрическим местом точек, равноудаленных от точки на данное расстояние, на плоскости.

Если рассматривать точку O в пространстве, то геометрическим местом точек, равноудаленных от точки O на расстояние R , является сфера с центром в точке O и радиусом R : $OA=OB=R$.



Линейные функции

Линейные функции. Функция, заданная формулой $y=kx+b$, где k и b – некоторые действительные числа, называется линейной.


Свойства линейной функции (при условии $k \neq 0, b \neq 0$)

- Областью определения линейной функции является множество всех действительных чисел.
- Множество значений линейной функции при $k \neq 0$, множество всех действительных чисел.
- При $k > 0$ функция возрастает, при $k < 0$ функция убывает.
- Линейная функция не является ни четной, ни нечетной.
- Графиком линейной функции является прямая. Для построения графика линейной функции достаточно определить координаты двух точек графика и через них провести прямую.

Удобно брать точки, у которых либо абсцисса, либо ордината равны нулю:

$$A\left(-\frac{b}{a}; 0\right); B(0; b)$$



- Число k называется угловым коэффициентом прямой. Угловым коэффициентом равен тангенсу угла наклона прямой к положительному направлению оси, Ox : $k = \operatorname{tg} \alpha$.



Линейные функции

Частные случаи линейной функции:


1. Если $b=0$, то линейная функция задается формулой $y=kx$. Такая функция называется прямой пропорциональностью. Графиком прямой пропорциональности является прямая, проходящая через начало координат.



Линейные функции

Частные случаи линейной функции:

2. Если $k=0$, то линейная функция задается формулой $y=b$. Такая функция называется постоянной. Графиком постоянной функции является прямая, параллельная оси Ox . Если $k=0$ и $b=0$, то график постоянной функции совпадает с осью Ox .




Ломанная


Ломанная - геометрическая фигура, состоящая из точек, соединенных отрезками. Точки называются **вершинами** ломаной, а отрезки – **звеньями** ломаной. Длинной ломаной называется сумма длин ее звеньев.

Ломанная замкнутая – такая ломанная, если конец ее последнего звена совпадает с началом первого звена.

Ломанная называется **простой**, если ее звенья не пересекаются.



Замкнутая ломанная





Простая ломанная



Луч

Луч - часть прямой, состоящая из всех точек этой прямой, лежащих по одну сторону от данной точки. Эта точка называется началом луча. Точка делит прямую на два луча, поэтому луч иногда называют полупрямой. Различные полупрямые одной и той же прямой с общим началом называют дополнительными полупрямыми или дополнительными лучами. Обозначение: луч OA или $[O, A)$ где O – начало луча, можно обозначать луч a .



Острый угол

Острый угол – угол, градусная мера которого больше нуля, но меньше девяноста градусов. Если рассматривать острый угол как угол поворота, то острые углы принадлежат первой координатной четверти. Следовательно, \sin , \cos , tg , ctg острого угла принимают положительные значения. Наиболее известные острые углы- 30, 45, 60 градусов.


	\sin	\cos	tg	ctg
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$



Остроградский Михаил Васильевич

Остроградский Михаил Васильевич (1801-1861) – выдающийся русский математик, был членом многих академий наук. Занимался математическим анализом, алгеброй, теорией чисел, прикладными науками. Он составил учебники по высшей и элементарной математике, вел большую педагогическую деятельность.

Родился Остроградский в семье помещика Полтавской губернии. С ранних лет проявил математические способности, в 16 лет поступил на физико-математический факультет Харьковского университета. Но не смог получить диплом этого университета, так как отказывался посещать лекции по богословию. Поэтому продолжил образование в Париже, где обратил на себя внимание великих математиков того времени. М.И. был одним из тех ученых, которые прославили русскую науку того времени.



Параллелограмм

Параллелограмм – четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Свойства параллелограмма:

- a. Противоположные стороны и противоположные углы параллелограмма равны.
- b. Диагональ параллелограмма делит его на два равных треугольника.
- c. Диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения пополам, эта точка является центром симметрии параллелограмма.
- d. Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов его сторон: $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$, где d_1 и d_2 – диагонали, a и b – стороны параллелограмма.


Параллелограмм

Признаки параллелограмма:

Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны, то этот четырехугольник – параллелограмм.

Если в четырехугольнике противоположные стороны попарно равны, то этот четырехугольник – параллелограмм.

Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник – параллелограмм.



BK и BM - высоты параллелограмма ABCD, AD и CD – основания.

Высотой параллелограмма называется перпендикуляр, опущенный из вершины параллелограмма на прямую, содержащую противоположную сторону.

Площадь параллелограмма можно найти по следующим формулам:

$S_{ABCD} = AD \cdot BK = CD \cdot MB = a \cdot h_a$ где a - основание, h_a - высота, проведенная к основанию.



$S = ab \sin \alpha$, где a и b - соседние стороны параллелограмма, α – угол между a и b .



Параллельные плоскости

Параллельные плоскости -
плоскости, которые не пересекаются.
Обозначение: $\alpha \parallel \beta$.

Признаки параллельности двух
плоскостей: если две пересекающиеся
прямые одной плоскости
соответственно параллельны двум
прямым другой плоскости, то эти
плоскости параллельны.



Если $a \parallel a_1$ и $b \parallel b_1$, причем a и b
пересекаются, $\alpha \parallel \beta$

Параллельные плоскости



Свойства параллельных плоскостей:

Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения параллельны.

Если $\alpha \parallel \beta$, плоскость γ пересекает плоскости α и β по прямым a и b , то $a \parallel b$.

Отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными плоскостями, равны.


Если $\alpha \parallel \beta$, $a \parallel b$, то $AB=CD$.



Параллельные прямые на плоскости

Параллельные прямые на плоскости. Две прямые на плоскости не имеют общих точек, то они называются параллельными прямыми. Обозначаются: $a \parallel b$.

Отрезки, лежащие на параллельных прямых, называются параллельными отрезками.



Признаки параллельности двух прямых:

Если при пересечении двух прямых третьей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

Если при пересечении двух прямых третьей соответственные углы, то прямые параллельны.

Если при пересечении двух прямых сумма односторонних углов равна 180 градусам, то прямые параллельны.




Подобие

Подобие- отображение плоскости или пространства на себя, при котором расстояние между точками изменяется в одном и том же отношении $k \neq 0$. Другими словами, расстояние между точками или увеличивается, или уменьшается в k раз. Число k называется коэффициентом подобия. Если $k=1$, то подобие является движением. Гомотетия является преобразованием подобия, но не всякое подобие является гомотетией.

Свойства подобия:

При преобразовании подобия прямые переходят в прямые, отрезки в отрезки, лучи в лучи, плоскости в плоскости, углы в равные им углы.

При преобразовании подобия три точки A, B, C , лежащие на одной прямой, переходят в точки A_1, B_1, C_1 , лежащие на одной прямой в том же порядке, что и точки $\triangle ABC$ подобен треугольникам $\triangle A_1, B_1, C_1$ и $\triangle A_2, B_2, C_2$, но гомотетичен только $\triangle A_1, B_1, C_1$. $\triangle A_1, B_1, C_1$ и $\triangle A_2, B_2, C_2$ являются подобными, но не являются гомотетичными.



Подобие

Подобные фигуры Φ_1 и Φ_2 , если существует преобразование подобия, переводящее одну фигуру в другую. Если фигура Φ_1 переходит в фигуру Φ_2 при преобразовании подобия с коэффициентом k , то фигура Φ_2 переходит в фигуру Φ_1 с коэффициентом $\frac{1}{k}$.

Особое внимание в школьной программе уделяется подобным треугольникам. Подобные треугольники- треугольники, у которых соответствующие углы равны, а соответствующие стороны пропорциональны.

Обозначение: $\Delta ABC \sim \Delta A_1 B_1 C_1$.

Если треугольники подобны, то отношение площадей равно квадрату коэффициента подобия, т.е. если $\Delta ABC \sim \Delta A_1 B_1 C_1$, то

$$\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta A_1 B_1 C_1}} = k^2 \quad .$$

Подобие

Признаки подобия треугольников:

Первый признак подобия: если два угла одного треугольника соответственно равны углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Второй признак подобия: если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы между этими сторонами равны, то треугольники подобны.

Третий признак подобия: если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Частные случаи подобия треугольников:

Прямоугольные треугольники подобны, если острый угол одного треугольника равен острому углу другого треугольника.

Прямоугольные треугольники подобны, если гипотенуза и катет одного треугольника пропорциональны гипотенузе и катету другого треугольника.

Равнобедренные треугольники подобны, если у них углы между боковыми сторонами равны.

Равнобедренные треугольники подобны, если угол при основании одного треугольника равен углу при основании другого треугольника.

При решении задач удобно использовать такие свойства подобных треугольников:

- Средняя линия треугольника отсекает треугольник, подобный данному.
- Отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.

Теорема

Теорема – математическое предложение, правильность или истинность которого доказывается с помощью аксиом или других теорем. Классическая теорема состоит из двух частей из условия и заключения. Условие обыкновенно начинается со слов «если», а заключение - со слова «то».

И сейчас существуют теоремы, истинность которых не могут доказать в течении длительного периода времени, например, теорему Ферма о решении некоторого уравнения с тремя переменными в натуральных числах.

Теорема Виета: сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену, т.е. если x_1 и x_2 – корни уравнения $x^2+px+q=0$, то $x_1 + x_2 = -p$ и $x_1x_2 = q$.

Для нахождения корней пользуются теоремой, обратной теореме Виета: если сумма двух чисел равна $-p$, а произведение равно q , то эти числа являются корнями уравнения $x^2+px+q=0$.

Теорема косинусов


Теорема косинусов: квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними, т.е.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A;$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B;$$


$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Теорему косинусов называют обобщенной теоремой Пифагора.




Теорема о биссектрисе равнобедренного треугольника

**Теорема о биссектрисе
равнобедренного треугольника:**
в равнобедренном треугольнике
биссектриса, проведенная к
основанию, является медианой и
высотой, т.е. если BD -
биссектриса угла B , а AC -
основание равнобедренного
треугольника ABC , то BD
является высотой и медианой
треугольника ABC .



Теорема о средней линии трапеции


Теорема о средней линии трапеции: средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их половине, т.е. если MN - средняя линия трапеции $ABCD$, то $MN \parallel BC$; $MN \parallel AD$ и $MN = \frac{BC + AD}{2}$



Теорема о средней линии треугольника

Теорема о средней линии треугольника:

средняя линия
треугольника
параллельна одной из
его сторон и равна
половине этой стороны,
т.е.если MN -средняя
линия $\triangle ABC$, то $MN \parallel AC$
и $MN = AC \cdot \frac{1}{2}$




Теорема Пифагора

Теорема Пифагора:

квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, т.е. $AB^2=AC^2+CB^2$, где AB - гипотенуза, а AC и CB - катеты прямоугольного треугольника ABC .

Важными теоремами являются признаки параллелограмма, параллельности двух плоскостей, параллельности прямой и плоскости, перпендикулярности двух плоскостей, подобия треугольников.




Теорема синусов

Теорема синусов:


стороны
пропорциональны
синусам противолежащих
углов, т.е.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



Теорема Фалеса

Теорема Фалеса: если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают отрезки и на другой его стороне, т.е. если $A_1A_2=A_2A_3$ и $A_1B_1 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_3$, то $B_1B_2=B_2B_3$.



Точка

Точка - одно из основных неопределяемых понятий геометрии. Обозначается: A, B, C, \dots
Точка вместе с прямой и плоскостью является отправным понятием при изложении геометрии. Связь между основными понятиями показана в аксиомах. Например, какова бы ни была прямая, существуют точки принадлежащие прямой и точки не принадлежащие этой прямой.


Точки A, B, C , принадлежат прямой a

Точки K, N, M , не принадлежат прямой a .

Или такая аксиома: какова бы ни была плоскость, существуют такие точки ей принадлежащие и ей не принадлежащие.

Точки A, B, C принадлежат плоскости α .

В аксиомах также утверждается, что две точки однозначно задают прямую, а три точки однозначно задают плоскость.



Торричелли Эванджелиста



Торричелли Эванджелиста (1608-1647)- известный итальянский ученный, ученик Галилея. Сделал род математических открытий.

Внес весомый вклад в создание интегрального исчисления.

Торричелли открыл атмосферное давление и изобрел ртутный термометр.

Ат-Туси



Ат-Туси (1201-1274) - азербайджанский астроном и математик, уроженец иранского города Тус. Его полное имя в одних переводах звучит как Насирэддин Туси Ад-Дин Ат-Туси, а в других Насир Ад-Дин Ат-Туси . Этот ученый был выдающимся государственным деятелем. Он организовал обсерваторию, в которую приглашались известные ученые из разных стран.

В этом научном центре было создано много замечательных научных трудов.

Ат-Туси написал много трудов по математике, астрономии, минералогии, медицине и логике, которые оказали влияние на европейских ученых.



Угол

Угол - геометрическая фигура, состоящая из двух лучей с общим началом. Общее начало называется вершиной угла, а сами лучи или полупрямые называются сторонами угла.

Точка A – вершина угла, лучи AB и AC – стороны угла.

Обозначается A или BAC .


Если стороны угла лежат на одной прямой или являются дополнительными лучами, то такой угол называется **развернутым**.




Угол

Если угол равен половине развернутого угла, то он называется **острым**.


Если угол больше прямого, но меньше развернутого, то он называется **тупым**.



$\angle ABC$
прямой



$\angle KNP$ острый



$\angle XYZ$ тупой

Текстовые задачи на составление уравнений.

Текстовые задачи на составление уравнений.

Большая часть текстовых задач в школьном курсе математики решается путем составления уравнений или систем уравнений. Поэтому этот метод должен освоить каждый учащийся. **Рассмотрим алгоритм решения задач с помощью уравнений:**

- Обозначить неизвестную величину переменной (при решении задач с помощью системы уравнений вводят несколько переменных);
- Выразить через нее другие величины;
- Составить уравнение (или систему уравнений), показывающее зависимость неизвестной величины от других величин;
- Решить уравнение (или систему уравнений);
- Сделать проверку при необходимости;
- Выбрать из решений уравнения (или системы уравнений) те, которые подходят по смыслу задачи;
- Оформить ответ.

Текстовые задачи на составление уравнений можно условно разбить на следующие типы:

- Задачи на движение;
- Задачи на совместную работу;
- Задачи на смеси и сплавы;
- Задачи с геометрическим содержанием;
- Другие задачи.

Рассмотрим решения задач перечисленных типов.

Задачи на движение

Задача 1. Катер прошел расстояние между пристанями по течению за 2 ч, а обратно против течения за 3 ч. Найдите собственную скорость катера, если скорость катера реки 2 км/ч.

Решение.

Пусть x км/ч – собственная скорость катера, тогда $(x+2)$ км/ч – скорость катера по течению; $(x-2)$ км/ч – скорость катера против течения.

Так как по течению реки катер прошел расстояние между пристанями за 2 часа, а против течения – за 3 часа, то расстояние между пристанями можно выразить двумя выражениями $2(x+2)$ и $3(x-2)$. Приравняв эти выражения, получим уравнение:

$$2(x+2) = 3(x-2);$$

$$2x+4=3x-6;$$

$$x=10.$$

Следовательно, собственная скорость катера равна 10 км/ч.

Ответ: 10 км/ч.

Задачи на движение

Задача 2. Из пункта А в пункт В вышел товарный поезд. Спустя 3 ч вслед за ним вышел пассажирский поезд, скорость которого на 30 км/ч больше скорости товарного поезда. Через 15 ч после своего выхода пассажирский поезд оказался впереди товарного на 300 км. Определите скорость товарного поезда.

Решение.

Пусть x км/ч – скорость товарного поезда.

Составим таблицу:

Товарный поезд	Пассажирский поезд
$V_m = x$ км/ч	$V_n = (x+30)$ км/ч
$t_m = (15+3)$ ч	$T_n = 15$ ч
$S_m = 18x$ км	$S_n = 15(x+30)$ км

Так как пассажирский поезд прошел на 300 км больше, получаем уравнение:

$$15(x+30) - 18x = 300$$

Решив уравнение, получаем $x = 50$.

Следовательно, скорость товарного поезда 50 км/ч.

Ответ: 50 км/ч.

Задачи на смеси и сплавы

Задача1. Имеется руда из двух пластов с содержанием меди 6% и 11%. Сколько «бедной» руды надо взять, чтобы получить при смешивании с «богатой» 20 т руды с содержанием меди 8%?

Решение.

Переведем проценты в дроби:

$$6\%=0,06; 11\%= 0,11; 8\%=0,08$$

Пусть необходимо взять x т «бедной» руды, которая будет содержать $0,06x$ т меди. Тогда «богатой» руды необходимо взять $(20-x)$ т, которая будет содержать $0,11 \cdot (20-x)$ т меди.

Так как получившиеся 20 т руды будут содержать $20 \cdot 0,08$ т меди, то имеет уравнение:

$$0,06x + 0,11 \cdot (20-x) = 20 \cdot 0,08.$$

$$x=12.$$

Ответ: $x=12$.

Задачи с геометрическим содержанием

Задача 1. Найти площадь прямоугольника, длина которого в 4 раза больше, чем ширина, а площадь численно равна периметру.

Решение.

Пусть x см – ширина прямоугольника, тогда $4x$ см – длина прямоугольника, $2(4x+x)$ см – периметр прямоугольника. Так как площадь равна периметру, получаем следующее уравнение:

$$2(4x+x) = 4x \cdot x \text{ или } 10x = 4x^2.$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 2,5.$$

Условию задачи удовлетворяет только корень $= 2,5$

Получаем, что ширина прямоугольника равна 2,5 см. Длина $= 2,5 \cdot 4 = 10$ см², площадь прямоугольника $= 2,5 \cdot 10 = 25$ см².

Ответ: 25 см²

Задачи с геометрическим содержанием

Задача 2. Бассейн имеет прямоугольную форму. Одна из его сторон на 6 м больше другой. Вокруг него проходит дорожка, ширина которой 0,5 м. Найти стороны бассейна, если площадь окружающей его дорожки 15 м².

Решение.

$$AB = x \text{ м}; BC = (x+6) \text{ м};$$

$$A_1B_1 = (x+0,5+0,5) \text{ м};$$

$$B_1C_1 = (x+6+0,5+0,5) \text{ м};$$

$$S_{ABCD} = x(x+6) \text{ м}^2;$$

$$S_{A_1B_1C_1D_1} = (x+1)(x+7) \text{ м}^2$$

Составим уравнение:

$$(x+1)(x+7) - x(x+6) = 15$$

$$x = 4$$

$$4 + 6 = 10 \text{ м}$$

Ответ: 4 м, 10 м

