

# *Нестандартные методы решения иррациональных уравнений*

Выполнила  
Тимкова Татьяна Андреевна  
МБОУ «Лицей 21»  
10 класс

Руководитель проекта  
Малахова Людмила Алексеевна  
Учитель математики

# *План*

- Введение
- Историческая справка
- Определение уравнения, виды уравнений
- Свойства функций
- Нестандартные методы решения уравнений
- Заключение

# *Актуальность*




Актуальность моей работы заключается в том, что приобретенные знания и навыки будут в дальнейшем использованы в работе ЕГЭ, в будущей профессии, в различных жизненных ситуациях.

**Цель** моей работы- ознакомление  
с нестандартными методами  
решения уравнений, в частности,  
на ЭТОТ ГОД- для решения  
иррациональных уравнений

## *Задачи:*

- собрать сведения из истории математики о решении уравнений
- применить имеющиеся знания по теме «Функция» к решению иррациональных уравнений
- изучить теорию по нестандартным методам решения иррациональных уравнений (в перспективе и другие виды уравнений: тригонометрические, логарифмические и т. д.).

# Ограниченность функции



# Пример 1

Решите уравнение.

$$\sqrt{3-x} + \sqrt{x+5} \cdot x^2 = 5+2x$$

Решение. Перепишем уравнение:


$$\sqrt{3-x} + \sqrt{x+5} = 5+2x + x^2$$

$$\text{Пусть } t = \sqrt{3-x} + \sqrt{x+5}$$

$$\text{Тогда } t^2 = 15 - 2x - x^2$$

Наибольшее значение подкоренного выражения достигается при  $x=-1$  (в вершине параболы  $y=15-2x-x^2$ ). При этом  $t_2 = 16$ . Отсюда следует, что 4. Наименьшее значение правой части исходного уравнения достигается также при  $x=-1$  и тоже равно 4. При  $x < -1$  левая часть (когда она существует) меньше правой.

# *Монотонность функции*





# *Теорема о корне.*

**Пусть функция  $f$  возрастает (или убывает) на промежутке  $I$ , число  $a$  - любое из значений, принимаемых  $f$  на этом промежутке. Тогда уравнение  $f(x)=a$  имеет единственный корень на этом промежутке  $I$ .**

Доказательство. Рассмотрим возрастающую функцию  $f$  (в случае, если  $f$  - убывающая функция, рассуждения аналогичны). По условию в промежутке  $I$  существует такое число  $b$ , что  $f(b)=a$ . Надо показать, что  $b$  - единственный корень уравнения  $f(x)=a$ .

Допустим, что на промежутке  $I$  есть еще число  $c \neq b$ , такое, что  $f(c)=a$ . Тогда или  $c < b$  или  $c > b$ . Но функция  $f$  возрастает на промежутке  $I$ , поэтому соответственно либо  $f(c) < f(b)$ , либо  $f(c) > f(b)$ . Это противоречит равенству  $f(c)=f(b)=a$ . Следовательно, сделанное предположение неверно и кроме числа  $b$ , других корней на промежутке  $I$  у уравнения  $f(x)=a$  нет.

## Пример 2

Решите уравнение.

$$\sqrt{7x+9} + \sqrt{15x+1} + \sqrt{2x-1} =$$

Решение. Заметим, что левая часть уравнения — возрастающая функция. Но это значит, что больше одного корня такое уравнение иметь не может. Итак,  $x=1$  -единственный корень.

Ответ: 1

$$f(f(x))=x \Leftrightarrow f(x)=x$$

Если функция  $f(x)$  возрастающая, то уравнение  $f(f(x))=x$  равносильно уравнению  $f(x)=x$ .

*Доказательство.* Всякий корень уравнения  $f(x)=x$  есть корень уравнения  $f(f(x))=x$ . Пусть  $x_0$  - корень уравнения  $f(f(x))=x$ , причем  $f(x) \neq x_0$ . Тогда либо  $f(x_0) > x_0$ , но при этом  $f(f(x_0)) = x_0 > f(x_0)$ , противоречие; либо  $x_0 > f(x_0)$ , но в этом случае  $x_0 = f(f(x_0)) < f(x_0)$ , т.е.  $x_0 < f(x_0)$ , что также невозможно. Утверждение доказано.

## Пример 3

Решите уравнение

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + x}} = x$$

Пусть  $f(x) = \sqrt{1 + x}$ . Наше уравнение имеет вид  $f(f(x)) = x$

Чтобы завершить решение, достаточно решить уравнение

$$x = \frac{(1 + \sqrt{5})}{2}$$

. Ответ:.

# ОДЗ

## Пример 4

Решите уравнение:

$$\sqrt{4-x^2} + \sqrt{x-2} = \sqrt{x+7} - \sqrt{4x+1}$$

Решение:

$$4-x^2 \geq 0$$

$$x-2 \geq 0$$

$$x+7 \geq 0$$



$$4x+1 \geq 0$$

$$x=2$$

В области определения данного уравнения должны одновременно выполняться неравенства  $4-x^2 \geq 0$  и  $x \geq 2$  что возможно только при  $x=2$ . Проверкой убеждаемся, что 2 - корень.

Ответ: 2.

# Четность функции



# *Умножение на сопряженное*

В основе рассматриваемого способа лежит формула :

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b}) (\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$$

Выражения  $\sqrt{a} - \sqrt{b}$  и  $\sqrt{a} + \sqrt{b}$  мы будем называть сопряженными. Иногда использование этой формулы облегчает решение.

# Пример 6

Решите уравнение.

$$\sqrt{5x+1} \sqrt{x+3} = 2x-1$$

Решение:

Домножим левую и правую части уравнения на сумму радикалов стоящих в левой части. Получается уравнение:

$$2(2x-1) = (2x-1)(\sqrt{5x+1} + \sqrt{x+3})$$

равносильное такому:

$$(2x-1)(2 - (\sqrt{5x+1} + \sqrt{x+3})) = 0$$

откуда либо  $x = \frac{1}{2}$ , либо  $\sqrt{5x+1} + \sqrt{x+3} = 2$ .

Последнее уравнение решим уже рассмотренным способом: пусть

$$t = \sqrt{x+3} \geq 0$$

Тогда приходим к уравнению :

$$\sqrt{5t^2 - 14} = 2 - t$$

$$\text{Откуда } t = \frac{-1 + \sqrt{19}}{2}, \text{ а } x = \frac{4 - \sqrt{19}}{2}$$


Ответ:  $\frac{1}{2}, \frac{4 - \sqrt{19}}{2}$



# Метод половинного деления

Алгоритм:

1. Найдем середину отрезка  $[a; b] = (a+b):2$
2. Вычислим значения функции в точках  $a$  и  $c$  и найдем произведение полученных значений :  $d=f(c) \cdot f(a)$
3. Если  $d > 0$ , то теперь точкой  $a$  станет  $c$ :  $a=c$ ;  
Если  $d < 0$ , то точкой  $b$  станет  $c$ :  $b=c$ ;
4. Вычислим разность  $a$  и  $b$ , сравним ее, если меньше  $0$   
то идем в пункт 1, если нет, то корень с нужной нам точностью найден,  
и он равен :  $x=(a+b)/2$ .



# Заключение

В процессе работы над темой «Нестандартные методы решения иррациональных уравнений» я узнала новые теоремы, научилась применять свойства функций к решению иррациональных уравнений, нашла множество применений данных знаний в решении сложных жизненных задач в разных сферах науки: экономике, строительстве, транспорте.

Данные методы значительно облегчают решение уравнений.

В жизни нужно не только следовать инструкциям, но уметь действовать по ситуации - применять все имеющиеся знания, т.е. иметь «вторую грамотность» - знания в действии.

***Спасибо за внимание!!!***