

## §5. Некоторые теоретико-числовые приложения комбинаторики

- **Определение 1.**
- **Натуральное число называется простым,** если оно имеет ровно два разных делителя:  $1$  и само себя.
- **Натуральное число называется составным,** если оно имеет более двух различных делителей.

- **Примеры.** Числа  $2, 3, 5, 7, 11$  простые, числа  $4, 6, 18, 100$  составные. Отметим, что число  $1$  не является ни простым, ни составным.
- Существует стандартная система обозначений простых чисел:  $P_1$  – первое по величине простое число (ясно, что  $P_1 = 2$ ),
- $P_2$  – следующее простое число,
- $(P_2 = 3), (P_3 = 5), (P_4 = 7), (P_5 = 11), (P_6 = 13), (P_7 = 17), (P_8 = 19)$  и т.д.
- Вообще  $P_n$  –  $n$ -ое простое число.
- К сожалению, не существует аналитической формулы  $f(n)$ , которая позволила бы вычислять любое простое число  $P_n$ .

- **Теорема 2.** Простых чисел существует бесконечно много.
- **Доказательство.** Допустим, существует лишь конечное число простых чисел. Перечислим их:
- $P_1, P_2, \dots, P_N$ .
- Значит, любое другое натуральное число содержит в качестве делителя по крайней мере одно из
- $P_i$  ( $i = 1, 2, \dots, N$ ).
- Рассмотрим число
- $P = P_1 P_2 \dots P_N + 1$ .
- Очевидно, что это число не делится ни на одно из чисел

$$P = P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_N$$

- так как при делении на любое из этих чисел  $P$  дает в остатке  $1$ .
- Значит, допущение о конечности множества простых чисел неверно. Простых чисел существует бесконечно много.
- **Замечание.** По дошедшим до нас историческим источникам это доказательство принадлежит Евклиду и является первым примером в математике доказательства «методом от противного».
- Простые числа являются «кирпичиками» из которых строятся все остальные натуральные и целые числа, отличные от  $0, -1, 1$ .

- **Теорема 3. (основная теорема арифметики).**  
Для любого натурального числа  $a \neq 1$  имеет место равенство
- $$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_k^{\alpha_k}$$
- для некоторых неотрицательных целых
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  и натурального  $k$ .
- Правая часть равенства называется разложением числа  $a$  в произведение простых чисел. Такое разложение при фиксированной нумерации множества простых чисел единственно.

## Пример.

$$10 = 2 \cdot 5 = 2^1 \cdot 3^0 \cdot 5^1, \quad 81 = 3^4 = 2^0 \cdot 3^4,$$

$$200 = 2 \cdot 100 = 8 \cdot 25 = 2^3 \cdot 5^2 = 2^3 \cdot 3^0 \cdot 5^2.$$

- **Определение 4.** Пусть  $a, b \in \mathbb{N}$ . Число  $c$  называется общим делителем  $a$  и  $b$ , если оба они делятся на  $c$  без остатка.
- **Примеры.** Пусть  $a = 24$ ,  $b = 36$ .
- Тогда общими делителями  $a$  и  $b$  будут числа  $1, 2, 3, 4, 6$  и  $12$ .
- Число  $8$  не будет общим делителем чисел  $24$  и  $36$ .
- Пусть  $a = 10$ ,  $b = 30$ .
- Общие делители –  $1, 2, 5$ .
- Пусть  $a = 16$ ,  $b = 35$ .
- Общий делитель, равный  $1$ , единственный.

## Теорема 5. Пусть

$$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

и

$$b = P_1^{\beta_1} \cdot P_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n}$$

- Число ***b*** является делителем ***a*** в том и только в том случае, когда  $\beta_i \leq \alpha_i$  для любого  $i = 1, \dots, n$ .



- **Следствие 6.**

- Пусть для натурального числа  $a$  имеет место равенство

$$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

- Тогда число делителей  $a$  вычисляется по формуле  $(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_n + 1)$ .

- Теорема 7. Пусть

$$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

и

$$b = P_1^{\beta_1} \cdot P_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n}$$

- Тогда число

$$c = P_1^{\gamma_1} \cdot P_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\gamma_n}$$

- является общим делителем чисел  $a$  и  $b$  в том и только в том случае, когда

$$\gamma_1 \leq \min(\alpha_1, \beta_1), \gamma_2 \leq \min(\alpha_2, \beta_2), \dots, \gamma_n \leq \min(\alpha_n, \beta_n).$$

- **Определение 8.**
- Число  $c$  называется **наибольшим общим делителем** чисел  $a$  и  $b$
- (обозначение:  $c = \text{НОД}(a, b)$ ),
- если  $c$  является самым большим из всех общих делителей чисел  $a$  и  $b$ .
- **Примеры.** Пусть  $a = 24, b = 30$ .
- Тогда  $\text{НОД}(24, 30) = 6$ .
- Если  $a = 10, b = 33$ , то  $\text{НОД}(10, 33) = 1$ ;
- $\text{НОД}(a, a) = a$ .
- Пусть  $a = 12, b = 48$ .
- Тогда  $\text{НОД}(12, 48) = 12$ .

- **Теорема 9.** Пусть  $a$  и  $b$  натуральные числа,

$$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

$$b = P_1^{\beta_1} \cdot P_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n}$$

- Тогда **НОД**  $(a,b)=$

$$P_1^{\gamma_1} \cdot P_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\gamma_n}$$

- где  $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .

- **Следствие 10.**
- Любой общий делитель чисел  $a$  и  $b$  является также делителем НОД  $(a, b)$ .
- **Определение 11.**
- Число  $a$  называется кратным числу  $b$  ( $a, b \in \mathbb{N}$ ), если  $a$  делится на  $b$  или, что тоже самое,  $b$  есть делитель  $a$ .
- Тот факт, что  $a$  делится на  $b$ , будет обозначать как  $b \mid a$ .

- **Пример.** Пусть  $b = 3$ .
- Тогда кратным ему будут числа  $3, 6, 9, 12, \dots$ . Их можно описать общей формулой  $a = 3n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ).
- Этот пример показывает, что в отличие от делителей, количество кратных любому натуральному числу  $b$  бесконечно.

- **Определение 12.**

- Если число  $a$  делится на число  $b$  и  $c$ , то  $a$  называется общим кратным чисел  $b$  и  $c$ .

- **Примеры.**

- Если  $b = 6$ ,  $c = 8$ , то общее кратное этих чисел равно  $24$ .

- Также общими кратными являются числа  $48, 72, \dots$ .

- **Теорема 13.** Пусть,

$$c = P_1^{\gamma_1} \cdot P_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\gamma_n}$$

$$b = P_1^{\beta_1} \cdot P_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n}$$

- Тогда число

$$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

- является общим кратным чисел  $b$  и  $c$  тогда и только тогда, когда
- $\alpha_1 \geq \max(\beta_1, \gamma_1)$ ,  $\alpha_2 \geq \max(\beta_2, \gamma_2)$ ,  $\dots$ ,  $\alpha_n \geq \max(\beta_n, \gamma_n)$ .



## Доказательство.

Пусть  $a$  – общее кратное  $b$  и  $c$ .

Так как  $a$  делится на  $b$ , то

$$\alpha_i \geq \beta_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Так как  $a$  делится на  $c$ , то

$$\alpha_i \geq \gamma_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Так как  $\alpha_i \geq \beta_i$  и  $\alpha_i \geq \gamma_i$ , то  $\alpha_i \geq \max(\beta_i, \gamma_i)$ .

Докажем

в другую сторону.

Так как  $\alpha_i \geq \max(\beta_i, \gamma_i)$ , то  $\alpha_i \geq \beta_i$

для каждого  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ ,

значит  $a$  делится на  $b$ .

Аналогично,  $a$  делится на  $c$ , то есть

$a$  – общее кратное  $b$  и  $c$ .

- **Определение 14.**
- **Самое маленькое** из всех общих кратных натуральных чисел  $b$  и  $c$  называется **наименьшим общим кратным**  $b$  и  $c$  и обозначается **НОК**  $(b, c)$ .
- **Примеры.**
- $\text{НОК}(3, 5) = 15,$        $\text{НОК}(4, 6) = 12,$
- $\text{НОК}(36, 64) = 576,$        $\text{НОК}(2, 8) = 8,$
- $\text{НОК}(a, a) = a,$        $\text{НОК}(1, a) = a.$

- Теорема 15. Пусть

$$b = P_1^{\beta_1} \cdot P_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n}$$

$$c = P_1^{\gamma_1} \cdot P_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\gamma_n}$$

- Число

$$a = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

- является НОК  $(b, c)$  в том и только в том случае, когда
- $\alpha_i = \max(\beta_i, \gamma_i), i = 1, 2, 3, \dots, n$

- **Следствие 16.**
- Любое общее кратное чисел  $b$  и  $c$  делится на  $\text{НОК}(b, c)$ .
  
- **Лемма 17.** Для любых чисел  $x, y$
- $\max(x, y) + \min(x, y) = x + y$ .

- **Доказательство.** Рассмотрим три случая:
- 1)  $x = y$ , тогда
- $\max(x, y) = x$ ,  $\min(x, y) = x$ , ПОЭТОМУ  
 $\max(x, y) + \min(x, y) = 2x$  и  $x + y = 2x$  ;
- 2)  $x > y$ , тогда
- $\max(x, y) = x$ ,  $\min(x, y) = y$ ,
- следовательно  
 $\max(x, y) + \min(x, y) = x + y$  ;
- 3)  $x < y$ , тогда
- $\max(x, y) = y$ ,  $\min(x, y) = x$ ,
- ПОЭТОМУ  $\max(x, y) + \min(x, y) = y + x = x + y$ .

- **Теорема 18.**

- Для любых натуральных чисел  $b$  и  $c$

$$\text{НОД}(b, c) \cdot \text{НОК}(b, c) = b \cdot c.$$

- **Доказательство.** Пусть

$$b = P_1^{\beta_1} \cdot P_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n}$$

и

$$c = P_1^{\gamma_1} \cdot P_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\gamma_n}$$

- Тогда

$$b \cdot c = P_1^{\beta_1 + \gamma_1} \cdot P_2^{\beta_2 + \gamma_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n + \gamma_n}$$

- $\text{НОД}(b, c) * \text{НОК}(b, c) =$

$$= P_1^{\min(\beta_1, \gamma_1) + \max(\beta_1, \gamma_1)} \cdot \dots \cdot P_n^{\min(\beta_n, \gamma_n) + \max(\beta_n, \gamma_n)}$$

$$= P_1^{\beta_1 + \gamma_1} \cdot \dots \cdot P_n^{\beta_n + \gamma_n} =$$

$$= b \cdot c$$

- **Определение 19.** Числа  $a$  и  $b$  называются *взаимно простыми*, если  $\text{НОД}(a, b) = 1$ . Другими словами, если  $a$  и  $b$  не имеют общих делителей, отличных от  $1$ .
- **Примеры.**
  - $3, 8$  – взаимно просты,
  - $1, 5$  взаимно просты,
  - $4, 6$  – не взаимно просты.



- **Определение 20.**
- **Функцией Эйлера  $\varphi(n)$**  называется количество чисел меньших, либо равных  $n$ , которые взаимно просты с  $n$ .
- **Примеры.**
- **1)  $\varphi(12) = 4$ .**
- Перечислим все числа  $\leq 12$  и взаимно простые с 12: 1, 5, 7, 11;
- **2)  $\varphi(36) = 12$ .**
- Перечислим все необходимые числа: 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35;
- **3)  $\varphi(7) = 6$ .**

- Теорема 21.

- Пусть

- $n = P_{k_1}^{\alpha_1} \cdot P_{k_2}^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_{k_m}^{\alpha_m}$ ,

- причем  $\alpha_i > 0$  и  $k_i \neq k_j$  ( $i \neq j$ ),

- $i, j = 1, 2, \dots, m$ . Тогда

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{P_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{P_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{P_m}\right)$$

- **Примеры.**

- 1)  $n=56=2^3 7^1,$

$$\varphi(56) = 56\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{7}\right) = 4 \cdot 1 \cdot 6 = 24;$$

- 2)  $n=16=2^4,$

$$\varphi(16) = 16\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 8;$$

- 3)  $\varphi(11) = 11\left(1 - \frac{1}{11}\right) = 10.$