


05.09.2017

Классная работа

Обратная функция

ФУНКЦИИ



Если каждому значению x из некоторого множества действительных чисел поставлено в соответствие по определённому правилу f число y , то, говорят, что на этом множестве определена функция.

Прямая Задача.

$$y = f(x), x - !$$

Найти значение **y** при заданном значении **x**.

Дано: $y = 2x + 3$

Найти: $y(5)$

Решение:

$$y(5) = 2 \cdot 5 + 3 = 13$$

Ответ: $y(5) = 13$

Обратная Задача.

$$y = f(x), y - !$$

Найти значение **x** при заданном значении **y**.

Дано: $y = 2x + 3, y(x) = 42$

Найти: x

Решение:

$$42 = 2x + 3$$

$$2x = 39$$

$$x = 19,5$$

Ответ: $y(19,5) = 42$

Дано: $v(t) = v_0 - gt$

Найти: $t - ?$

Решение:

$$v_0 - gt = v$$

$$gt = v_0 - v$$

$$t = \frac{v_0 - v}{g} \quad , \text{т.е.} \quad t(v) = \frac{v_0 - v}{g}$$

Обратимая функция


Обратная функция к $v(t)$

Если функция $y = f(x)$ принимает каждое своё значение y только при одном значении x , то эту функцию называют **обратимой**.

$$y = 2x + 2$$

$$y = 2 + \frac{1}{x}$$

$$y = x^3$$

$$y = x^2$$

$$x_1 = \sqrt{y} \qquad x_2 = -\sqrt{y}$$

Пусть $y = f(x)$ – обратимая функция. Тогда каждому y из множества значений функции соответствует одно определённое число x из области её определения, такое, что $f(x) = y$. Это соответствие определяет функцию x от y , которую обозначим $x = g(y)$. Поменяем местами x и y : $y = g(x)$.

Функцию $y = g(x)$ называют **обратной** к функции $y = f(x)$.

Дано: $y = \frac{1}{x-2}$

Найти функцию, обратную данной $y = f^{-1}(x)$.


Решение:

$$\frac{1}{x-2} = y$$


$$x-2 = \frac{1}{y}$$

$$x = 2 + \frac{1}{y} \quad \longrightarrow \quad y = 2 + \frac{1}{x}$$

Ответ: $f^{-1}(x) = 2 + \frac{1}{x}$



1. $D(y) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$
2. $E(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$



1. $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$
2. $E(y) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$


Свойства обратных функций.


1. Область определения обратной функции f^{-1} совпадает с множеством значений исходной f , а множество значений обратной функции f^{-1} совпадает с областью определения исходной функции f :

$$D(f^{-1}) = E(f), E(f^{-1}) = D(f).$$


2. Монотонная функция является обратимой:
 - если функция f возрастает, то обратная к ней функция f^{-1} также возрастает;
 - если функция f убывает, то обратная к ней функция f^{-1} также убывает.

3. Если функция имеет обратную, то график обратной функции симметричен графику данной функции относительно прямой $y = x$.





1. $D(f)=\mathbb{R}$
2. $E(f)=\mathbb{R}$
3. возрастающая




1. $D(g)=\mathbb{R}$
2. $E(g)=\mathbb{R}$
3. возрастающая

1. $D(y)=(-\infty; 0]$
2. $E(y)=[0; +\infty)$
3. убывающая

1. $D(y)=[0; +\infty)$
2. $E(y)=(-\infty; 0]$
3. убывающая

Построить график функции, обратной данной.





Дано: $y = x^3$

Построить функцию,
обратную к данной.

Решение: $x^3 = y$

$$x = \sqrt[3]{y} \Rightarrow y = \sqrt[3]{x}$$



Задание

Выполнить:

№ 3.1 (а, б);

№ 3.2 (а, б);

№ 3.4.

Домашнее задание

Выучить

§ 3,

Выполнить:

№ 3.3; 3.2 (в, г); 3.1 (в, г).

