


Обыкновенные дроби





ИЗ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ:

«ЗАПИСЬ ДРОБЕЙ»

• Народы прошли через многие варианты записи дробей, пока не пришли к современной записи.

- **Черта дроби** стала постоянно использоваться лишь около **300** лет назад.
- Первым европейским ученым, который стал использовать и распространять современную запись дробей, был итальянский купец и путешественник, сын городского писаря **Фибоначчи** (Леонардо Пизанский). В **1202** г. он ввел слово «**дробь**».
- Названия «**числитель**» и «**знаменатель**» ввел в **XIII** веке **Максим Плануд** – греческий монах, ученый математик.



-
- Решите примеры, запишите ответы в порядке возрастания и расшифруйте фамилию греческого монаха, ученого-математика, который в XIII веке ввел название “числитель” и “знаменатель”:

$$43\frac{3}{11} - 9 \quad \text{Д}$$

$$7\frac{3}{8} - \frac{2}{8} \quad \text{У}$$

$$7 - \frac{3}{8} \quad \text{Н}$$

$$6\frac{6}{11} - 5\frac{2}{11} \quad \text{Л}$$


$$2 - 1\frac{7}{8} \quad \text{П}$$

$$7\frac{5}{9} - 2\frac{7}{9} \quad \text{А}$$

Заполните таблицу

<i>a</i>	$5\frac{7}{13}$	$9\frac{11}{15}$	$4\frac{5}{11}$	12		
<i>b</i>	$\frac{3}{13}$	$5\frac{8}{15}$	$1\frac{6}{11}$		$2\frac{5}{19}$	$6\frac{2}{17}$
<i>a+b</i>					$4\frac{14}{19}$	
<i>a-b</i>				$8\frac{7}{10}$		$3\frac{11}{17}$






Рыцарский турнир

$$\boxed{6\frac{2}{7}} \xrightarrow{+1\frac{5}{7}} \boxed{} \xrightarrow{-5\frac{2}{9}} \boxed{} \xrightarrow{+1\frac{5}{9}} \boxed{} \xrightarrow{-\frac{8}{9}} \boxed{} \xrightarrow{-3} \boxed{}$$

$$\boxed{5\frac{2}{3}} \xrightarrow{+1\frac{1}{3}} \boxed{} \xrightarrow{-5\frac{2}{8}} \boxed{} \xrightarrow{+1\frac{5}{8}} \boxed{} \xrightarrow{-\frac{7}{8}} \boxed{} \xrightarrow{+36} \boxed{}$$



Задача:

Магазин продал в первый день 160кг яблок, что составило $\frac{1}{3}$ всех яблок, во второй день $\frac{4}{5}$ оставшихся яблок. Сколько килограмм яблок осталось продать в третий день?

1-?



Сокращение дробей

Сокращение дроби


$$\frac{8 : 4}{36 : 4} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{\cancel{8}^2}{\cancel{36}^9} = \frac{2}{9}$$

Деление числителя и знаменателя на их общий делитель, отличный от единицы, называют сокращением дроби.

$$\frac{\cancel{8}^2}{\cancel{36}^9} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{8}{36}$$



$$\frac{2}{9}$$

Несократимая дробь

$$\frac{2}{9}$$



Эту дробь сократить нельзя, так как её
числитель и знаменатель

взаимно простые числа.

$$\text{НОД}(2;9) = 1$$

Последовательное сокращение дроби



$$\frac{\cancel{210}^{70}}{\cancel{315}^{105}} = \frac{\cancel{70}^{14}}{\cancel{105}^{21}} = \frac{\cancel{14}^2}{\cancel{21}^3} = \frac{2}{3}$$

Сократим на 3 Сократим на 5 Сократим на 7

Верно ли, что дробь при таком сокращении становится все меньше и меньше???

Запиши множество значений переменной x , при которых дробь $\frac{x}{12}$ является правильной несократимой дробью.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

$$M = \left\{ \frac{1}{12}; \frac{5}{12}; \frac{7}{12}; \frac{11}{12} \right\}$$



Запиши множество значений переменной y , при которых дробь $\frac{18}{y}$ является неправильной несократимой дробью.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17

$$M = \left[\frac{18}{1}; \frac{18}{5}; \frac{18}{7}; \frac{18}{11}; \frac{18}{11}; \frac{18}{17} \right]$$



Найди несократимые дроби.

А 0,7

А $\frac{5}{49}$

Д 0,1

Я $\frac{8}{36}$

Ш 0,8

У 0,23

М 0,25

Р $\frac{8}{25}$

Г $\frac{2007}{2008}$

