



ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ
естественных наук
при Саратовском государственном аграрном
университете им. Н.И. Вавилова

Понятие логарифма, основные свойства логарифмов.

Решите уравнение.

1) Решить уравнение $a^x = b$, где $a > 0$ и $a \neq 1$, $b > 0$,
 $0,5^x = 32$, мы искали показатель степени,
в который надо возвести основание $0,5$,
значит, найти показатель степени,
 $x = -5$. чтобы получить 32 .

2) в который надо возвести основание a ,
 $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 27$, мы искали показатель степени,
чтобы получить число b , в который надо возвести основание
чтобы получить 27 .

$$x = -3.$$

3) Показатель степени – это и есть логарифм
 $4^{x+1} = 320$, мы искали показатель степени,
 $4^x(4+1) = 320$, для чего надо возвести в степень 4 ,
 $4^x = 64$, чтобы получить 64 .
 $x = 3$.

Определение.

Логарифмом числа b ($b > 0$) по основанию a ($a > 0, a \neq 1$) называется показатель степени c , в которую нужно возвести основание a , чтобы получить число b , т.е. если $a^c = b$, то можно записать $\log_a b = c$.

Примеры.

1) $\log_2 32$, здесь $b = 32$, $a = 2$, $c = 5$.

$$\log_2 32 = 5, \text{ т. к. } 2^5 = 32.$$

2) $\log_5 0,04$,

здесь $b = 0,04$, $a = 5$, $c = -2$.

$$\log_5 0,04 = -2, \text{ т. к. } 5^{-2} = 1/25 = 0,04.$$

3) Найти x , такое, что $\log_8 x = 1/3$.

По определению логарифма

$$x = 8^{1/3} = 2.$$

Основное логарифмическое тождество.

$$a^c = b \iff \log_a b = c$$

Откуда получаем основное
логарифмическое тождество

$$(b > 0, a > 0, a \neq 1)$$

$$a^{\log_a b} = b$$

Примеры.

$$1) \ 0,5^{\log_{0,5} 6} = 6 .$$

$$\begin{aligned} 2) \ \sqrt{5}^{2\log_5 3} &= ((\sqrt{5})^2)^{\log_5 3} \\ &= 5^{\log_5 3} = 3. \end{aligned}$$

Свойства логарифмов.

$$1) \log_a 1 = 0.$$

$$2) \log_a a = 1.$$

$$3) \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$4) \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$$

$$5.1) \log_a x^p = p \cdot \log_a x.$$

$$5.2) \log_{a^p} b = \frac{1}{p} \log_a b.$$

$$6) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\text{Следствие: } 1) \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$\text{Следствие: } 2) \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b.$$

$$\text{Следствие: } 3) \log_a b = \log_{a^\gamma} b^\gamma$$

Свойства логарифмов, примеры.

$$\begin{aligned}1) \log_2 27 - 2\log_2 3 + \log_2 \frac{2}{3} &= \log_2 3^3 - 2\log_2 3 + \log_2 2 - \log_2 3 = \\&= 3\log_2 3 - 2\log_2 3 + \log_2 2 - \log_2 3 = \log_2 2 = 1\end{aligned}$$

Использовались свойства 4 , 5.1 и 2.

$$\begin{aligned}2) \log_{\frac{1}{3}} 2 + \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}} 8 - \log_{\frac{1}{3}} (4\sqrt{18}) &= \log_{\frac{1}{3}} 2 + \log_{\frac{1}{3}} 8^{\frac{1}{2}} - \log_{\frac{1}{3}} (4\sqrt{18}) = \\&= \log_{\frac{1}{3}} (2 \cdot 8^{\frac{1}{2}}) - \log_{\frac{1}{3}} (4 \cdot \sqrt{18}) = \log_{\frac{1}{3}} \frac{2 \cdot 8^{\frac{1}{2}}}{4 \cdot \sqrt{18}} = \log_{\frac{1}{3}} \frac{2^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \cdot 3 \cdot 2^{\frac{1}{2}}} = \\&= \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1\end{aligned}$$

**Использовались свойства
5.1, 3, 4 и 2.**

Свойства логарифмов, примеры.

$$\begin{aligned}3) \log_9(\log_4 \sqrt[3]{4}) &= \log_9\left(\frac{1}{3} \cdot \log_4 4\right) = \log_{3^2}(3^{-1}) = \\&= -\frac{1}{2} \log_3 3 = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Свойства 5.1, 2 , следствие 2 .

Логарифмы с основанием 10

называют десятичными логарифмами.

$$\lg \sqrt[3]{1000} - \frac{3}{5} \lg \sqrt[3]{10^5} = \frac{2}{3} \cdot (-3) \lg 10 = \lg \frac{3}{5} \lg 10^{\frac{5}{3}} =$$

Примеры: 1) $\lg 100 = 2$
2) $\lg 0,0001 = -4$

3) $\lg 100000000 = 8$


Формула перехода от одного основания логарифма к другому, примеры.

$$1) \frac{\log_5 0,5}{\log_5 24 - \log_5 3} = \frac{\log_5 0,5}{\log_5 \frac{24}{3}} = \frac{\log_5 0,5}{\log_5 8} = \log_8 0,5 = \\ = \log_{2^3} 2^{-1} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$2) \log_3 10 \cdot \lg 27 + \log_{27} 1 = \frac{\lg 10}{\lg 3} \cdot \lg 3^3 + 0 = \frac{1}{\lg 3} \cdot 3 \lg 3 = 3$$

Домашнее задание.

- 1) Разобрать и выучить лекцию.
- 2) Никольский, 10 кл., п.5.1, 5.2
№ 5.4, 5.8(а, б, в, е, и), 5.9(1,2 стр.)



Свойства логарифмов.

$$a^{\log_a b} = b \quad a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$$

$$1) \log_a 1 = 0.$$

$$2) \log_a a = 1.$$

$$3) \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$4) \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$5.1) \log_a x^p = p \cdot \log_a x.$$

$$5.2) \log_{a^p} b = \frac{1}{p} \log_a b.$$

$$6) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Следствия:

$$1) \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$2) \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b.$$

$$3) \log_a b = \log_{a^\gamma} b^\gamma$$