

Понятие степени.  
Свойства степени.  
Преобразование степеней.

Понятие корня.  
Свойства корня натуральной  
степени.

# Понятие степени с натуральным показателем

1. Степенью числа  $a$  с показателем  $k$ , где  $k \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{Q}$ , называется произведение  $k$  множителей, каждый из которых равен  $a$ :

$$a^k = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{k \text{ раз}}$$

Число  $a$  называется основанием степени, а число  $k$  — показателем степени.

2. Четная степень отрицательного числа есть число положительное. Например,  $(-3)^{24} > 0$ .

Нечетная степень отрицательного числа есть число отрицательное. Например,  $\left(-\frac{3}{4}\right)^{17} < 0$ .

Любая степень положительного числа есть число положительное. Например,  $12^k > 0$ .

3. При возведении нуля в любую натуральную степень  $k$  получается нуль, т. е.  $0^k = 0$ .

4. При возведении единицы в любую натуральную степень  $k$  получается единица, т. е.  $1^k = 1$ .

# Свойства степени с натуральным показателем

1. При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складываются, а основание остается прежним:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; m, n \in N.$$

Например,  $a^2 \cdot a^3 = a^{2+3} = a^5$ .

2. При делении степеней с одинаковыми основаниями показатели степеней вычитаются, а основание остается прежним:

$$a^m : a^n = a^{m-n}; m, n \in N.$$

Например,  $a^5 : a^3 = a^2$ .

3. При возведении степени в степень показатели степеней перемножаются, а основание остается прежним:

$$(a^m)^n = a^{mn}; m, n \in N.$$

Например,  $(a^4)^3 = a^{12}$ .

4. Степень произведения равна произведению степеней множителей:

$$(abc)^k = a^k b^k c^k; k \in N.$$

Например,  $(a \cdot b)^2 = a^2 b^2$ .

5. Степень частного равна частному степеней делимого и делителя:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^k = \frac{a^k}{b^k}; b \neq 0, k \in N.$$

Например,  $\left(\frac{a}{b}\right)^4 = \frac{a^4}{b^4}$ .

# Степень с целым и дробным показателем

Рассмотрим степень  $a^p$ , где  $p \in \mathbf{Z}$ .

1. Если  $p=0$ , то по определению  $a^0=1$  (при  $a \neq 0$ ). Например,  $5^0=1$ .

2. Если  $p < 0$ , то по определению  $a^p = \frac{1}{a^{-p}}$  (при  $a \neq 0$ ). Например,  $2^{-1} = \frac{1}{2}$ ;  $5^{-2} = \frac{1}{5^2}$ ;  $(-3)^{-1} = -\frac{1}{3}$ ;  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$ .

3. Рассмотрим степень  $a^{\frac{p}{q}}$ , где  $\frac{p}{q}$  — рациональное число. Выражение  $a^{\frac{p}{q}}$  имеет в общем виде смысл только при  $a > 0$ . Если  $a > 0$ ,  $p \in \mathbf{Z}$ ,  $q \in \mathbf{N}$ , то по определению  $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$ ;  $0^q = 0$ .

Например,  $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2}$ . Выражения  $(-8)^{\frac{1}{2}}$  и  $(-8)^{\frac{3}{4}}$  смысла не имеют.

4. Степень с рациональным показателем обладает теми же свойствами, что и степень с натуральным показателем, а именно если  $a > 0$  и  $n \in \mathbf{Q}$ ,  $m \in \mathbf{Q}$ , то:

а)  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ; б)  $a^m : a^n = a^{m-n}$ ; в)  $(a^n)^m = a^{mn}$ ; г)  $(ab \cdot \dots \times \times k)^n = a^n b^n \cdot \dots \cdot k^n$ ; д)  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ .

# Понятие корня

1. Корнем  $k$ -й степени, где  $k \in \mathbb{N}$  и  $k \neq 1$ , из действительного числа  $a$  называется действительное число  $x$ ,  $k$ -я степень которого равна  $a$ .

2. Корень  $k$ -й степени из числа  $a$  обозначается символом  $\sqrt[k]{a}$ . Согласно определению  $(\sqrt[k]{a})^k = a$ .

3. Нахождение корня  $k$ -й степени из числа  $a$  называется извлечением корня. Число  $k$  называют показателем корня, число  $a$  — подкоренным выражением.

4. Заметим, что  $\sqrt[n]{a}$ , где  $n \in \mathbb{N}$  и  $a < 0$ , не существует. Например, выражения  $\sqrt{-4}$ ,  $\sqrt[4]{-16}$  не имеют смысла. Корень нечетной степени извлекается и из отрицательного числа. Например  $\sqrt[3]{-8} = -2$ , так как  $(-2)^3 = -8$ .

5. Чтобы устранить двузначность корня  $k$ -й степени из числа  $a$ , вводится понятие арифметического корня. Арифметическим корнем  $k$ -й степени из числа  $a$  ( $a \geq 0$ ) называется неотрицательное число  $b$ ,  $k$ -я степень которого равна  $a$ , где  $k > 1$  — натуральное число.

Например: а)  $\sqrt[k]{a^k} = |a|$ ; б)  $\sqrt{x^2+2x+1} + \sqrt{x^2-2x+1} = |x+1| + |x-1|$ ; в)  $\sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3$ ; г)  $\sqrt{9} = 3$  (но не  $\pm 3$ ).

**З а м е ч а н и е.** В школьном курсе рассматривается только арифметическое значение корня, т. е.  $\sqrt[k]{a}$  имеет смысл лишь при  $a \geq 0$  и принимает только неотрицательные значения.

# Преобразования арифметических корней

1. Корень  $k$ -й степени из произведения неотрицательных чисел равен произведению корней той же степени из сомножителей:  $\sqrt[k]{ab} = \sqrt[k]{a} \cdot \sqrt[k]{b}$ , где  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$  (правило извлечения корня из произведения).

2. Если  $a \geq 0$ ,  $b > 0$ , то  $\sqrt[k]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[k]{a}}{\sqrt[k]{b}}$  (правило извлечения корня из дроби).

3. Если  $a \geq 0$ ,  $k, c \in \mathbb{N}$ ,  $k > 1$ ,  $c > 1$ , то  $\sqrt[k]{\sqrt[c]{a}} = \sqrt[kc]{a}$  (правило извлечения корня из корня).

4. Если  $a \geq 0$ , то  $(\sqrt[k]{a})^m = \sqrt[k]{a^m}$  (правило возведения корня в степень).

5. Если  $a \geq 0$ , то  $\sqrt[k]{a^m} = \sqrt[nk]{a^{nm}}$ , где  $m \in \mathbb{N}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , т. е. показатель корня и показатель подкоренного выражения можно умножить на одно и то же число.

6. Если  $a_1 > a_2 > 0$ , то  $\sqrt[k]{a_1} > \sqrt[k]{a_2} > 0$ , т. е. большему положительному подкоренному выражению соответствует и большее значение корня.

7. Все указанные выше формулы часто применяются в обратном порядке (т. е. справа налево). Например,

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3 \cdot 2} = \sqrt{6} \quad (\text{правило умножения корней});$$

$$\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2} \quad (\text{правило деления корней});$$

$$\sqrt[6]{5} = \sqrt[3]{\sqrt{5}}.$$

8. Правило вынесения множителя из-под знака корня. При  $a \geq 0, b \geq 0$   $\sqrt[k]{ba^k} = a\sqrt[k]{b}$ .

9. Обратная задача — внесение множителя под знак корня. Например,

$$b\sqrt{3} = \begin{cases} \sqrt{3b^2}, & \text{если } b \geq 0, \\ -\sqrt{3b^2}, & \text{если } b \leq 0. \end{cases}$$

10. Уничтожение иррациональности в знаменателе дроби. Рассмотрим некоторые типичные случаи.

$$\text{а) } \frac{m}{\sqrt[k]{a}} = \frac{m\sqrt[k]{a^{k-1}}}{\sqrt[k]{a} \cdot \sqrt[k]{a^{k-1}}} = \frac{m\sqrt[k]{a^{k-1}}}{\sqrt[k]{a^k}} = \frac{m\sqrt[k]{a^{k-1}}}{a}, \quad \text{так как } a > 0.$$

$$\text{Например, } \frac{5}{\sqrt[3]{3}} = \frac{5 \cdot \sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{3^2}} = \frac{5\sqrt[3]{9}}{3}.$$

$$\text{б) } \frac{m}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{m(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})} = \frac{m(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}.$$

$$\text{Например, } \frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = \sqrt{5} + \sqrt{2}.$$

$$\text{в) } \frac{m}{\sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{c}} = \frac{m((\sqrt{a} + \sqrt{b}) + \sqrt{c})}{((\sqrt{a} + \sqrt{b}) - \sqrt{c})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) + \sqrt{c}} \text{ и т. д.}$$

11. Применение тождеств сокращенного умножения к действиям с арифметическими корнями:

$$1) (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b;$$

$$2) (\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = a \pm b;$$

$$3) a\sqrt{a} \pm b\sqrt{b} = (\sqrt{a})^3 \pm (\sqrt{b})^3 = (\sqrt{a} \pm \sqrt{b})(a \mp \sqrt{ab} + b).$$

12. Множитель, стоящий перед корнем, называется его коэффициентом. Например,  $3\sqrt{7}$ . Здесь 3 является коэффициентом.

13. Корни (радикалы) называются подобными, если они имеют одинаковые показатели корней и одинаковые подкоренные выражения, а отличаются только коэффициентом. Чтобы судить о том, подобны данные корни (радикалы) или нет, нужно привести их к простейшей форме.

Например,  $\sqrt[3]{54}$  и  $\sqrt[3]{16}$  подобны, так как  $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$ , а  $\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{8 \cdot 2} = 2\sqrt[3]{2}$ .





