

# Производная функции

- Определение производной
- Геометрический смысл производной
- Связь между непрерывностью и дифференцируемостью
- Производные основных элементарных функций
- Правила дифференцирования
- Производная сложной функции
- Производная неявно заданной функции
- Логарифмическое дифференцирование

# Определение производной


Пусть функция  $y = f(x)$  определена в некотором интервале  $(a; b)$ .

Аргументу  $x$  придадим некоторое приращение  $\Delta x$ :

$$x + \Delta x \in (a; b)$$

Найдем соответствующее приращение функции:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$



Если существует предел  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

то его называют производной функции  $y = f(x)$  и обозначают одним из символов:

$$y'; \quad f'(x); \quad \frac{dy}{dx}$$

# Определение производной

Итак, по определению:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Функция  $y = f(x)$ , имеющая производную в каждой точке интервала  $(a; b)$ , называется *дифференцируемой* в этом интервале; операция нахождения производной функции называется *дифференцированием*.


Значение производно функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  обозначается одним из символов:

$$y'(x_0); \quad f'(x_0); \quad y' \Big|_{x_0}$$

Если функция  $y = f(x)$  описывает какой – либо физический процесс, то  $f'(x)$  есть скорость протекания этого процесса – физический смысл производной.

# Геометрический смысл производной

Возьмем на непрерывной кривой  $L$  две точки  $M$  и  $M_1$ :



Через точки  $M$  и  $M_1$  проведем секущую и обозначим через  $\varphi$  угол наклона секущей.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi &= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \\ &= \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \end{aligned}$$

При  $\Delta x \rightarrow 0$  в силу непрерывности функции  $\Delta y$  также стремится к нулю, поэтому точка  $M_1$  неограниченно приближается по кривой к точке  $M$ , а секущая  $MM_1$  переходит в касательную.

$$\varphi \rightarrow \alpha \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi = \alpha \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \alpha$$

# Геометрический смысл производной

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \operatorname{tg} \alpha = k = y'$$

Производная  $f'(x)$  равна угловому коэффициенту касательной к графику функции  $y = f(x)$  в точке, абсцисса которой равна  $x$ .

Если точка касания  $M$  имеет координаты  $(x_0; y_0)$ , угловой коэффициент касательной есть  $k = f'(x_0)$ .

Уравнение прямой с угловым коэффициентом:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

Уравнение касательной  
Уравнение нормали

Прямая, перпендикулярная касательной в точке касания, называется **нормалью** к кривой.

$$k_{\text{норм}} = -\frac{1}{k_{\text{кас}}} = -\frac{1}{f'(x_0)} \Rightarrow y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

# Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции

## Теорема

Если функция  $f(x)$  дифференцируема в некоторой точке, то она непрерывна в ней.

### Доказательство:

Пусть функция  $y = f(x)$  дифференцируема в некоторой точке  $x$ , следовательно существует предел:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(x) \Rightarrow$$

[где  $\alpha(x) \rightarrow 0$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ ]

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(x)\Delta x \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \Rightarrow$$

По теореме о связи функции, ее предела и бесконечно малой функции

Функция  $y = f(x)$  – непрерывна.

Обратное утверждение не верно: непрерывная функция может не иметь производной.

# Производные основных элементарных функций

**1** Степенная функция:  $y = x^n \quad n \in \mathbb{Z}$

Придадим аргументу  $x$  приращение  $\Delta x$ , тогда функция получит приращение:

$$\Delta y = (x + \Delta x)^n - x^n$$

*Формула бинома Ньютона:*

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \square + \frac{n(n-1)\square(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k + \square + b^n$$

*$k$  – факториал*

$$k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \square \cdot k$$

# Производные основных элементарных функций

По формуле бинома Ньютона имеем:

$$\Delta y = (x + \Delta x)^n - x^n =$$

$$= (\cancel{x^n} + nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x^2 + \square + \Delta x^n) - \cancel{x^n}$$

Тогда: 
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \square + \Delta x^{n-1}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left( nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \square + \Delta x^{n-1} \right) =$$

$$= nx^{n-1} \Rightarrow \boxed{(x^n)' = nx^{n-1}}$$



# Производные основных элементарных функций

2 Логарифмическая функция:  $y = \ln x$

$$\Delta y = \ln(x + \Delta x) - \ln x = \ln\left(\frac{x + \Delta x}{x}\right) = \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \sim \frac{\Delta x}{x}$$

Аналогично выводятся правила дифференцирования других основных элементарных функций.

при  $\Delta x \rightarrow 0$

# Правила дифференцирования

Пусть  $u(x)$ ,  $v(x)$  и  $w(x)$  – дифференцируемые в некотором интервале  $(a; b)$  функции,  $C$  – постоянная.

- $(C)' = 0$

- $(u \pm v)' = u' \pm v'$

- $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v' \Rightarrow (C \cdot u)' = C \cdot u'$

$$(u \cdot v \cdot w)' = u' \cdot v \cdot w + u \cdot v' \cdot w + u \cdot v \cdot w'$$

- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2} \Rightarrow \left(\frac{C}{v}\right)' = \frac{-C \cdot v'}{v^2}$

# Производная сложной функции

Пусть  $y = f(u)$  и  $u = \varphi(x)$ , тогда  $y = f(\varphi(x))$  – сложная функция с промежуточным аргументом  $u$  и независимым аргументом  $x$ .

## Теорема

Если функция  $u = \varphi(x)$  имеет производную  $u'_x$  в точке  $x$  а функция  $y = f(u)$  имеет производную  $y'_u$  в соответствующей точке  $u$ , то сложная функция имеет производную  $y'_x$ , которая находится по формуле:

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x$$

Это правило остается в силе, если промежуточных аргументов несколько:

$$y = f(u); \quad u = \varphi(v); \quad v = g(x) \quad \Rightarrow \quad y = f(\varphi(g(x)))$$

$$y'_x = y'_u \cdot u'_v \cdot v'_x$$

# Пример

Вычислить производную функции  $y = \frac{1 + \sin x}{x^3 \cdot \ln x}$

$$y' = \left( \frac{1 + \sin x}{x^3 \cdot \ln x} \right)'$$

$$= \frac{(1 + \sin x)' \cdot (x^3 \cdot \ln x) - (1 + \sin x) \cdot (x^3 \cdot \ln x)'}{(x^3 \cdot \ln x)^2}$$

$$= \frac{(1' + (\sin x)') \cdot (x^3 \cdot \ln x) - (1 + \sin x) \cdot ((x^3)' \cdot \ln x + x^3 (\ln x)')}{(x^3 \cdot \ln x)^2}$$

$$= \frac{\cos x \cdot x^3 \cdot \ln x - (1 + \sin x) \cdot (3x^2 \cdot \ln x + x^2)}{(x^3 \cdot \ln x)^2}$$

# Пример

Вычислить производную функции  $y = \cos(\ln^{12} x)$

Данную функцию можно представить следующим образом:

$$y = \cos u; \quad u = v^{12}; \quad v = \ln x$$

$$y'_x = y'_u \cdot u'_v \cdot v'_x$$

$$y'_u = -\sin u = -\sin v^{12} = -\sin(\ln^{12} x)$$

$$u' = 12v^{11} = 12\ln^{11} x$$

$$v' = \frac{1}{x}$$

$$y' = -\sin(\ln^{12} x) \cdot 12\ln^{11} x \cdot \frac{1}{x}$$

*Коротко:*

$$y' = (\cos(\ln^{12} x))' = -\sin(\ln^{12} x) \cdot (\ln^{12} x)'$$

$$= -\sin(\ln^{12} x) \cdot 12\ln^{11} x \cdot (\ln x)' =$$

# Производная неявно заданной функции

Если функция задана уравнением  $y = f(x)$ , разрешенным относительно  $y$ , то говорят, что функция задана в **явном виде**.

Под неявным заданием функции понимают задание функции в виде уравнения не разрешенного относительно  $y$ :

$$F(x; y) = 0$$

Для нахождения производной неявно заданной функции необходимо продифференцировать уравнение по  $x$ , рассматривая при этом  $y$  как функцию от  $x$ , и полученное выражение разрешить относительно производной.

$$[x^3 + y^3 - 3xy]' = [0]' \Rightarrow (x^3)' + (y^3)' - 3(xy)' = 0 \Rightarrow$$

$$\cancel{3}x^2 + \cancel{3}y^2 \cdot y' - \cancel{3}(x'y + xy') = 0 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 \cdot y' - y - xy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$$

# Логарифмическое дифференцирование

В ряде случаев для нахождения производной целесообразно заданную функцию сначала **прологарифмировать**, а затем результат **продифференцировать**.

Такую операцию называют **логарифмическим дифференцированием**.

$$y = \frac{x^2 \cdot \sqrt[4]{(x-1)^3} \cdot e^x}{(2x+5)^5} \Rightarrow \ln y = \ln \frac{x^2 \cdot \sqrt[4]{(x-1)^3} \cdot e^x}{(2x+5)^5} \Rightarrow$$

$$[\ln y]' = \left[ 2 \ln x + \frac{3}{4} \ln(x-1) + x - 5 \ln(2x+5) \right]' \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x} + \frac{3}{4} \cdot \frac{(x-1)'}{x-1} + 1 - 5 \frac{(2x+5)'}{2x+5} \Rightarrow$$

$$y' = \left( \frac{2}{x} + \frac{3}{4x-4} + 1 - \frac{10}{2x+5} \right) \cdot \frac{x^2 \cdot \sqrt[4]{(x-1)^3} \cdot e^x}{(2x+5)^5}$$

# Логарифмическое дифференцирование

Пусть  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  – дифференцируемые функции.

Функция  $y = u(x)^{v(x)}$  называется **степенно – показательной**.

Производная такой функции находится только с помощью логарифмического дифференцирования.

$$y = (\sin x)^{x^2+1} \Rightarrow \ln y = \ln(\sin x)^{x^2+1} \Rightarrow$$

$$(\ln y)' = [(x^2 + 1) \cdot \ln(\sin x)]' \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = (x^2 + 1)' \cdot \ln(\sin x) + (x^2 + 1) \cdot (\ln(\sin x))' \Rightarrow$$

$$y' = \left( 2x \cdot \ln(\sin x) + (x^2 + 1) \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right) \cdot (\sin x)^{x^2+1}$$