

**Тема урока:**

**«Простейшие вероятностные задачи».**

**11 класс**


Учитель математики Гомонова Галина Васильевна  
ГБОУ СОШ п. Масленниково Хворостянского района Самарской области

**Замечательно, что наука, которая начала с рассмотрения азартных игр, обещает стать наиболее важным объектом человеческого знания. Ведь большей частью жизненные вопросы являются на самом деле задачами из теории вероятностей.**

**П. Лаплас**

# Что такое событие?

- В теории вероятностей под событием понимают то, относительно чего после некоторого момента времени можно сказать одно и только одно из двух. Да, оно произошло. Нет, оно не произошло.
- Возможный исход эксперимента, называется элементарным событием, а множество таких исходов называется просто событием.
- Событие – это результат испытания.



Из урны наудачу берут один шар.

**Извлечение** шара из урны есть испытание.

**Появление** шара определенного цвета – событие.

# Непредсказуемые события называются случайными.

В жизни мы постоянно сталкиваемся с тем, что некоторое событие может произойти, а может и не произойти.

## Пример.

- При бросании кубика выпадет шестерка.
- У меня есть лотерейный билет.

После опубликования результатов розыгрыша лотереи интересующее меня событие – выигрыш тысячи рублей, либо происходит, либо не происходит.



**Два события, которые в данных условиях могут происходить одновременно, называются совместными, а те, которые не могут происходить одновременно, - несовместными.**

**Пример.**

Брошена монета. Появление «герба» исключает появление надписи. События «появился герб» и «появилась надпись» - несовместные.



**Равновозможными** называются события, когда в их наступлении нет преимуществ.

**Неравновозможные** события те, у которых в наступлении одного из событий есть какое то преимущество.



### Примеры.

- Появление герба или надписи при бросании монеты представляют собой равновероятные события.
- Пусть бросают игральную кость. В силу симметрии кубика можно считать, что появление любой из цифр 1, 2, 3, 4, 5 или 6 одинаково возможно (равновероятно).


**Событие, которое происходит всегда, называют достоверным.**

**Событие, которое не может произойти, называется невозможным.**



### Примеры.

- В следующем году снег не выпадет. При бросании кубика выпадет семерка. Это невозможные события.
- В следующем году снег выпадет. При бросании кубика выпадет число, меньше семи. Ежедневный восход солнца. Это достоверные события.
  - Пусть, например, из урны, содержащей только черные шары, вынимают шар. Тогда появление черного шара – достоверное событие; появление белого шара – невозможное событие.



# Классическое определение вероятности.

Вероятностью события  $A$  при проведении некоторого испытания называют отношение числа тех исходов, в результате которых наступает событие  $A$ , к общему числу всех (равновозможных между собой) исходов этого испытания.





# Алгоритм нахождения вероятности случайного события.



Для нахождения вероятности случайного события  $A$  при проведении некоторого испытания следует найти:

- 1) число  $N$  всех возможных исходов данного испытания;
- 2) количество  $N(A)$  тех исходов, в которых наступает событие  $A$ ;
- 3) частное  $\frac{N(A)}{N}$ , оно и будет равно вероятности события  $A$ .

Принято вероятность события  $A$  обозначать так:  $P(A)$ .

Значит 
$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

## Пример.

На завод привезли партию из 1000 подшипников. Случайно в эту партию попало 30 подшипников, не удовлетворяющих стандарту. Определить вероятность  $P(A)$  того, что взятый наудачу подшипник окажется стандартным.

### Решение.

Число стандартных подшипников равно  $1000 - 30 = 970$ . Будем считать, что каждый подшипник имеет одинаковую вероятность быть выбранным. Тогда полная группа событий состоит из  $N = 1000$  равновероятных исходов, из которых событию  $A$  благоприятствуют  $N(A) = 970$  исходов.

$$\text{Поэтому } P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{970}{1000} = 0.97$$

Ответ: 0,97.



# Для вычисления вероятности часто используют правило умножения.

Для того, чтобы найти число всех возможных исходов независимого проведения двух испытаний  $A$  и  $B$ , следует перемножить число всех исходов испытания  $A$  и число всех исходов испытания  $B$ .

## Пример.

Найдем вероятность того, что при подбрасывании двух костей суммарное число очков окажется равным 5.

Решение.

Возможно следующее сочетание очков на первой и второй костях:  $1 + 4$ ,  $2 + 3$ ,  $3 + 2$ ,  $4 + 1$  – четыре благоприятных случая ( $N(A) = 4$ ). Всего возможных исходов  $N = 6 \cdot 6 = 36$  (по шесть для каждой кости).

Тогда вероятность рассматриваемого события

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

Ответ:  $\frac{1}{9}$ .



# Свойство вероятностей противоположных событий.

События  $A$  и  $B$  называются противоположными, если всякое наступление события  $A$  означает ненаступление события  $B$ , а ненаступление события  $A$  – наступление события  $B$ .

Событие, противоположное событию  $A$ , обозначают символом  $\bar{A}$ . Сумма вероятностей противоположных событий равна 1.  $P(A)+P(\bar{A})=1$ .

Пример.

1. Бросаем один раз игральную кость. Событие  $A$  – выпадение четного числа очков, тогда событие  $\bar{A}$  – выпадение нечетного числа очков.



## Пример.


2. В среднем из 1000 аккумуляторов, поступивших в продажу, 6 неисправны. Найдите вероятность того, что один купленный аккумулятор окажется исправным.

### Решение.

Элементарный исход – случайно выбранный аккумулятор. Поэтому  $N = 1000$ . Событию  $A = \{\text{аккумулятор исправен}\}$  благоприятствуют  $1000 - 6 = 994$  исхода. Поэтому  $N(A) = 994$ .

Тогда  $P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{994}{1000} = 0,994$ .

Ответ: 0,994.



Эту задачу можно решить с помощью формулы вероятности противоположного события  $\bar{A} = \{\text{аккумулятор неисправен}\}$ .

$N(\bar{A})=6$ . Имеем  $P(\bar{A}) = \frac{N(\bar{A})}{N} = \frac{6}{1000} = 0,006$ .

Значит,  $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,006 = 0,994$ .

Ответ: 0,994.

## Решение задач.

1. Монета бросается два раза. Какова вероятность того, что:  
а) герб выпадет хотя бы один раз?      б) герб выпадет два раза?

**Решение.**

а) Пусть  $A$  - событие, состоящее в том, что в результате проведенного испытания герб выпал хотя бы один раз.

Равновозможными элементарными исходами здесь являются: ГГ, ГР, РГ, РР, т.е.  $N = 4$ .

Событию  $A$  благоприятствуют исходы: ГГ, ГР, РГ, т.е.

$$N(A) = 3. \text{ Следовательно, } P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{3}{4} = 0,75$$

б) Пусть  $B$  - событие, состоящее в том, что в результате проведенного испытания герб выпал два раза.

Событию  $B$  благоприятствует один исход: ГГ, т.е.  $N(B) = 1$ .

$$\text{Следовательно, } P(B) = \frac{N(B)}{N} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Ответ: а) 0,75; б) 0,25.

**2. Игральная кость бросается два раза. Какова вероятность того, что сумма выпавших очков равна 6 ?**

**Решение.**

Равновозможными элементарными исходами здесь являются пары  $(x, y)$ , где  $x$  и  $y$  принимают значения: 1,2,3,4,5,6. Таким образом, общее число

элементарных исходов равно  $N = 6 \cdot 6 = 36$ . Событию  $A$  благоприятствуют пары  $(1;5)$ ,  $(2;4)$ ,  $(3;3)$ ,  $(4;2)$ ,  $(5;1)$ , число которых равно  $N(A) = 5$ .

Следовательно,  $P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{5}{36}$ .


Ответ:  $\frac{5}{36}$ .






3. В ящике лежат 6 красных и 6 синих шаров. Наудачу вынимают 8 шаров. Определите вероятность события  $A$  - все выбранные шары красные.

Решение.  $P(A) = 0$ , т.к. это событие  $A$  - невозможное.  
Ответ: 0.



4. Научная конференция проводится 3 дня. Всего запланировано 50 докладов: в первый день – 30 докладов, а остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?



**Решение.**

Так как в третий день будут слушать 10 докладов, то благоприятных исходов  $N(A) = 10$ , а всего докладов 50, т.е. равновозможных исходов  $N = 50$ .

Поэтому  $P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{10}{50} = 0,2$ .

Ответ: 0,2.

5. Перед началом первого тура чемпионата по теннису разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 теннисистов, среди которых 19 участников из России, в том числе Ярослав Исаков. Найдите вероятность того, что в первом туре Ярослав Исаков будет играть с каким – либо теннисистом из России.



**Решение.**

Число всех исходов  $N = 45$ . Число элементарных событий, благоприятствующих событию  $A$  равно 18. Все элементарные события равновозможны по условию задачи, поэтому  $P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{18}{45} = 0,4$ .  
Ответ: 0,4.

# Итог урока



## Домашнее задание:

ВЫПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ТЕСТ

по адресу

<http://gomonova.ucoz.ru/>

[index/test/0-32.](http://gomonova.ucoz.ru/index/test/0-32)



## Литература.

1. А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник;
2. А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник;
3. И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В10. Теория вероятностей. Рабочая тетрадь/ Под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко. Москва. Издательство МЦНМО, 2012;
4. Задача В10. Открытый банк заданий по математике. ЕГЭ 2012.
5. Интернет – источники:
  - [http://www.toehelp.ru/theory/ter\\_ver/1\\_3/](http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/1_3/)
  - <http://ssau2011.narod2.ru/11.htm>
  - [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%E0%E8%FF\\_%E2%E5%F0%E0%FF%F2%ED%E0%F1%F2%E5%E9](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%E0%E8%FF_%E2%E5%F0%E0%FF%F2%ED%E0%F1%F2%E5%E9)
  - [http://redpencil.ru/index2.php?option=com\\_content&task=view&id=92&pop=1&page=0&Itemid=35](http://redpencil.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=92&pop=1&page=0&Itemid=35)