



Решение



иrrациональных неравенств

11 класс

УМК: любой

Разработано учителем математики
МОУ «СОШ» п. Аджером
Корткеросского района Республики Коми
Мишариной Альбиной Геннадьевной

Содержание

Теория: - определение

- свойства
- способы решения

Задания для решения вместе

**Задания для самостоятельной
работы**

Задания для работы в парах

Теория

- Иррациональными называются неравенства, содержащие переменную под знаком корня
- При решении иррациональных неравенств надо находить ОДЗ, т.к. сделать проверку труднее
- Если обе части неравенства не отрицательны, то их можно возвести в четную степень и знак неравенства при этом не изменится
- Неравенство можно возвести в нечетную степень не проверяя неотрицательность левой части.

Теория

- Основным методом решения иррациональных неравенств является сведение его к системе неравенств или к совокупности систем неравенств.

Чаще всего используются следующие случаи:

A)

$$\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}$$

Б) $\sqrt{f(x)} \geq \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x) \end{cases}$

В) $\sqrt{f(x)} \rangle g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \rangle g^2(x) \end{cases}$

Γ)

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} g(x) \leq 0 \\ f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g^2(x) \end{cases}$$

Δ)

$$\sqrt{f(x)} \langle g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \rangle 0 \\ f(x) \langle g^2(x) \end{cases}$$

E) $\sqrt{f(x)} \langle g(x), \quad g(x) \leq 0$

то неравенство не имеет решения

Ж)

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g^2(x) \end{cases}$$

Решаем

$$1) \sqrt{x - 2} > 3$$

$$2) \sqrt{x - 2} \leq 1$$

$$3) \sqrt{2 - x} \geq x$$

$$4) \sqrt{2 - x} < x$$

$$5) \sqrt{5x + 11} > x + 3$$

$$6) \sqrt{x + 3} \leq x + 1$$

Самостоятельная работа

$$1) \sqrt{5 - y} \leq 3 \quad \text{Ответ: } [-4; 5]$$

$$2) \sqrt{x^2 + 26} > x + 2 \quad \text{Ответ:}$$

Работа в парах

$$1) \sqrt{x^2 - 8x} > 3$$

Ответ: $(-\infty; -1) \cup (9; +\infty)$

$$2) \sqrt{x^2 - 3x} < 2$$

Ответ: $(-1; 0) \cup (3; 4)$

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Ш.А.Алимов и др. «Алгебра и начала анализа»
10-11 кл., М., Просвещение, 2003г.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Nuvola_apps_edu_mathematics_blue-p.svg/800px-Nuvola_apps_edu_mathematics_blue-p.svg.png



http://hijos.ru/wp-content/uploads/2013/02/number36_1.jpg

- Автор, заимствованного шаблона, неизвестен