

Курсовая работа по элективному курсу «решение нестандартных задач.»

Тема: «Решение отдельных видов уравнений
n-й степени ($n > 2$)»

Подготовили ученики 10 класса МОУСОШ №1 им. А. М. Денисова
Михаил Исполатов,
Дмитрий Шефер

п. Хвойная , 2009г.

Предисловие.

В школьном курсе алгебры известны методы решения уравнений 1 и 2 степеней по формулам. Методов решений высших степеней (3, 4 и т.д.) нет. А такие уравнения часто встречаются на вступительных экзаменах в вузы, в заданиях части «С» ЕГЭ, на олимпиадах. Мы представляем решение таких уравнений, в которых показываем несколько методов.

При овладении этими методами решения отдельных уравнений, метод будет являться стандартным. Эти методы не являются исчерпаемыми. Наша цель, показать как анализировать, видеть и организовывать поиск метода решения. Некоторые уравнения взяты из указанной ниже литературы, некоторые составлены авторами.

При желании эта тема может быть продолжена, расширена другими методами (графическим, функционально-аналитическим, графоаналитическим, логическими и другими), можно рассматривать сложно-степенные уравнения.

Нашей задачей из всего многообразия уравнений и методов решений выделить отдельные, на наш взгляд представляющих интерес.

План

- **1. Биквадратные уравнения.**
- **2. Симметричные уравнения.**
- **3. Степенные уравнения.**
 - 3.1) *Кубические уравнения.*
 - 3.2) *Уравнения 4-й степени.*
- **4. Графический метод решения уравнений.**

1. Решение биквадратных уравнений.

Биквадратные уравнения имеют общий вид:

$ax^4 + bx^2 + c = 0$ где a, b и c некоторые числа, а x – переменная. Такие уравнения решаются методом замены переменной. Например:

$2x^4 - 5x^2 + 2 = 0$ пусть $x^2 = a$, тогда получим уравнение вида $2a^2 - 5a + 2 = 0$

$$D = b^2 - 4ac = 25 - 16 = 9.$$

$$a_1 = \frac{5 - 3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{5 + 3}{4} = 2$$

$$x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x^2 = 2 \Rightarrow x_{3,4} = \pm \sqrt{2}$$

Ответ: $x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; x_{3,4} = \pm \sqrt{2}$

Биквадратные уравнения для
самостоятельного решения

1). $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

2). $3X^4 - 11X^2 + 2,5 = 0$

3). $5X^4 - 3X^2 - 5 = 0$

4). $2X^4 + 3x^2 + 1 = 0$

5). $X^4 - 2X^2 + 1 = 0$

2. Решения симметричных уравнений.

Симметричные уравнения имеют общий вид:

$$ax^4 + vx^3 + cx^2 + vx + a = 0 \quad \text{где } a \neq 0$$

Например: $2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 2 = 0$

Так как 0 не является корнем этого уравнения, то разделим его на

x^2 , в результате получим: $2x^2 - 5x + 6 - \frac{\square\square}{x} + \frac{\square\square}{x^{\square}} = 0$.

Далее произведём группировку: $(2x^2 + \frac{2}{x^2}) + 6 - (5x + \frac{\square\square}{x}) = \square\square$

Вынесем за скобки общие множители: $2(x^2 + \frac{\square\square}{x^2}) + 6 - 5(x + \frac{\square\square}{x}) = 0$

Заменим $x + \frac{\square\square}{x} = t$, возведём это выражение в квадрат: $(x + \frac{\square\square}{x})^2 = t^2$

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = t^2 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$$

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

Найдём t: $D = b^2 - 4ac = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 9$

$$t_1 = \frac{\square\square + \square\square}{\square} = 2 \quad ; \quad t_2 = \frac{\square\square - \square\square}{\square} = \frac{\square\square}{\square}$$

В результате получим 2 уравнения :

1. $x + \frac{1}{x} = 2$ До множим это уравнение на x

$$x^2 - 2x + 1 = 0 \quad (x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

2. $x + \frac{2}{x} = \frac{2}{x}$

$$2x^2 - 2x + 2 = 0;$$

Найдём дискриминант: $D = 1 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = -15;$

$D < 0 \Rightarrow$ нет корней на множестве \mathbf{R} .

Ответ : $x = 1$

Симметричные уравнения для самостоятельного решения.

1). $5x^4 - 2x^3 - 6x^2 - 2x + 5 = 0$

2). $6x^4 - 35x^3 - 62x^2 - 35x + 6 = 0$

3). $3x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 2x + 3 = 0$

3. Решение сложных степенных уравнений.

3.1 Кубические уравнения содержащие радикалы.

$$\sqrt[3]{x^3 - 22x^2 + 17x - 6} = 0; \text{ Заменяем } x = \frac{y}{\sqrt[3]{3}}$$

В результате получим уравнение, не содержащее радикал:

$$2y^3 - 11y^2 + 17y - 6 = 0$$

Запишем уравнение в виде :

$$2y^3 - y^2 - 10y^2 + 5y + 12y - 6 = 0$$

Разложим левую часть на множители способом группировки:

$$y^2(2y - 1) - 5y(2y - 1) + 6(2y - 1) = 0$$

$$(2y - 1) \cdot (y^2 - 5y + 6) = 0$$

Получаем совокупность уравнений:

$$\begin{cases} 2y - 1 = 0 \\ y^2 - 5y + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2} \\ y = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

Для каждого y найдём x :

$$x_1 = \frac{y_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$x_2 = \frac{y_2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$x_3 = \frac{y_3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Ответ: $\left\{ \frac{\sqrt{2}}{4}; \sqrt{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\}$

Уравнения для самостоятельного решения.

1. $5\sqrt{5}x^3 - 10x^2 + 8\sqrt{5}x - 6 = 0$

2. $7\sqrt{7}x^3 - 14x^2 + 6\sqrt{7}x - 5 = 0$

3.2. Решение уравнений четвёртой степени различными способами.

3.2.1. Метод понижения степени

$$x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4 = 0$$

Так как 0 не является корнем данного уравнения, то разделим его на x^2

В результате получим:

$$x^2 - 5x + 10 - \frac{10}{x} + \frac{4}{x^2} = 0$$

Представим уравнение в виде:

$$\left(x^2 + \frac{4}{x^2}\right) + 10 - \left(5x + \frac{10}{x}\right) = 0$$

$$4\left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right) + 10 - 10\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{x}\right) = 0$$

Пусть $\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = a$, тогда $(\frac{x}{2} + \frac{1}{x})^2 = a^2$

$$\frac{x^2}{4} + 1 + \frac{1}{x^2} = a^2 \Rightarrow \frac{x^4}{4} + \frac{1}{x^2} = a^2 - 1$$

$$4 \cdot [a^2 - 1] + 10 - 10a = 0$$

$$4a^2 - 10a + 6 = 0$$

$$D = D^2 - 4ac = 100 - 96 = 4$$

$$a_1 = \frac{10 - 2}{8} = 1$$

$$a_2 = \frac{10 + 2}{8} = \frac{3}{2}$$

Т.к. $a = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$, то получим 2 следующих уравнения:

1) $\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = 1$ Приводим всё к общему знаменателю и избавляемся от него:

$x^2 - 2x - 2 = 0$; $D = 4 - 8 = -4$ $D < 0$ (нет корней на множестве R)

2) $\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$ умножаем на x это уравнение.

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad D = 9 - 8 = 1$$

$$x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

Ответ: $\boxed{1}$; $\boxed{2}$

3.2.2. Метод разложения на множители.

$$x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4 = 0$$

Преобразуем левую часть уравнения:

$$(x^4 - x^3) - (4x^3 - 4x^2) + (6x^2 - 6x) - (4x - 4) = 0$$

$$x^3(x - 1) - 4x^2(x - 1) + 6x(x - 1) - 4(x - 1) = 0$$

$$(x - 1) \cdot (x^3 - 4x^2 + 6x - 4) = 0$$

$$1) x - 1 = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$2) x^3 - 4x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$x^3 - x^2 - 3x^2 + 3x + 3x - 3 - 1 = 0$$

$$x^2(x-1) - 3x(x-1) + 3(x-1) - 1 = 0$$

$$(x-1) \cdot (x^2 - 3x + 3) - 1 = 0$$

$$(x-1) \cdot (x^2 - x - 2x + 2 + 1) - 1 = 0$$

$$(x-1) \cdot (x \cdot (x-1) - 2(x-1) + 1) - 1 = 0$$

$$(x-1) \cdot ((x-1) \cdot (x-2) + 1) - 1 = 0$$

$$(x-1)^2 \cdot (x-2) + x - 1 - 1 = 0$$

$$(x-2)((x-1)^2 + 1) = 0$$

$$x-2 = 0 \quad \text{и} \quad (x-1)^2 + 1 = 0$$

$$x_2 = 2 \quad x^2 - 2x + 2 = 0 \quad D = 4 - 4 \cdot 2 = -4 \quad D < 0$$

(нет корней на множестве \mathbf{R})

Ответ: $\boxed{1: 2}$

3.2.3 Применение бинома Ньютона

$$x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4 = 0$$

Так как **0** не корень этого уравнения, то умножим его на **x**.

В результате получим уравнение: $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 4x = 0$

Запишем уравнение в виде: $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1 + 1 - x = 0$

Докажем что выражение: $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1 = (x - 1)^5$

Доказательство: разложим по биному Ньютона выражение: $(x - 1)^5$

$$\begin{aligned}(x - 1)^5 &= x^5 + C_5^1 x^4 \cdot (-1) + C_5^2 x^3 \cdot (-1)^2 + C_5^3 x^2 \cdot (-1)^3 + C_5^4 x \cdot (-1)^4 + C_5^5 \cdot (-1)^5 = \\ &= x^5 - C_5^1 x^4 + C_5^2 x^3 - C_5^3 x^2 + C_5^4 x - 1\end{aligned}$$

По коэффициентам треугольника Паскаля видим, что выражение :

$$x^5 - C_5^1 x^4 + C_5^2 x^3 - C_5^3 x^2 + C_5^4 x - 1 = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1 \Rightarrow$$

$(x - 1)^5 = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1$ является справедливым равенством.

С учетом этого, получим уравнение:

$$(x - 1)^5 - (x - 1) = 0. \text{ Заменяем: } x - 1 = a$$

$$a^5 - a = 0$$

$$a \cdot [a^4 - 1] = 0$$

$$a_1 = 0 \quad \text{и} \quad a^4 - 1 = 0$$

$$a = \pm 1$$

$$x - 1 = 0 \quad \text{и} \quad x - 1 = 1 \quad x - 1 = -1$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 2$$

$x_3 = 0$ - посторонний корень

Ответ: $x_1 = 1; x_2 = 2$

Уравнения для самостоятельного решения.

$$1. x^3 + 2x^2 + 3x^2 + 4x^2 + 5x^2 + 6x + 7 = 8$$

$$2. 3x^3 - 4x^3 + 5x^3 - 6x - 7 = 8$$

$$3. x^3 - 2x^3 + 3x^3 - 4x = 5$$

$$4. x^3 + 2x^3 + 3x + 4 = 5$$

$$5. x^3 - x^3 - x^3 = x^3 - x^3 - x$$

Графический метод решения уравнений повышенной степени.

$$\frac{-x^7 + 4x^5 + x^3 - x^2 - 4x}{x^3 + x} = 0 \quad \text{Выносим из числителя и знаменателя за знак скобок } X \text{ и сокращаем его.}$$

$$\frac{-x^6 + 4x^4 + x^2 - x - 4}{x^2 + 1} = 0$$

$$\frac{-x^6 + 4x^4 + x^2 - 4}{x^2 + 1} - \frac{x}{x^2 + 1} = 0$$

$$\frac{-x^4(x^2 - 4) + (x^2 - 4)}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\frac{(x^2 - 4)(1 - x^4)}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\frac{(x^2 - 4)(1 - x^2)(1 + x^2)}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$-x^4 + 5x^2 - 4 = \frac{x}{x^2 + 1}$$

Корнями данного уравнения будут являться точки пересечения графиков функций: $y = -x^4 + 5x^2 - 4$

и $y = \frac{x}{x^2 + 1}$. Исследуем и отобразим на графике данные функции.

$$1. y = -x^4 + 5x^2 - 4$$

$$1) D(y) = (-\infty; +\infty)$$

2) $y(-x) = -x^4 + 5x^2 - 4$ значит $y(x) = y(-x) \Rightarrow$ функция чётная.


3) Вертикальных и горизонтальных асимптот не имеет.

$$4) y' = -4x^3 + 10x = -2x(2x^2 - 5)$$

Найдём стационарные точки: $-2x(2x^2 - 5) = 0$

$$x_1 = 0 \quad x_{2,3} = \pm\sqrt{2,5}$$

Определим поведение функции



5) Дополнительные точки. При $x = -2; -1; 1; 2$ $y = 0$

$$2. \quad y = \frac{x}{x^2+1}$$


$$1) D(y) = (-\infty; +\infty)$$

$$2) y(-x) = -\frac{x}{x^2+1} = -y(x) \Rightarrow \text{Функция нечётная.}$$

3) Вертикальная асимптота отсутствует горизонтальная асимптота =


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+\frac{1}{x}} = 0$$

$$4) y' = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \text{ Найдём стационарные точки: } 1-x^2 = 0$$



5) Дополнительные точки:

x	-3	-2	2	3
y	-0,3	-0,4	0,4	0,3



$$x^{\log_x 2 \cdot 16 - \log_{\sqrt{x}} 7} + x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3 \frac{4}{49} = 0$$

Упростим степень: $\log_{x^2} 16 - \log_{\sqrt{x}} 7 = \frac{1}{2} \log_x 16 - 2 \log_x 7 =$
 $= \log_x 4 - \log_x 49 = \log_x \frac{4}{49}$

$$x^{\log_x \frac{4}{49}} + x^5 + x^4 - 6x^3 - 4x^2 - 11x - 3 - \frac{4}{49}$$

$$x^5 + x^4 - 6x^3 - 4x^2 - 11x - 3 = 0$$

Для решения этого уравнения воспользуемся свойством уравнений вида $x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$, где $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ являются целыми коэффициентами, причём корень $x_0 \neq 0$ целое число, а $\frac{a_n}{x_0}$ тоже целое число.

$-\frac{3}{x_0} \in \mathbb{Z} \Rightarrow x$ может быть равным -3, -1, 1, 3. Проверкой

исключим посторонние корни. Ответ: $x_1=1; x_2=3$

Литература

•

1. «Задачи по элементарной математике» - В. Б. Лидинский и др. Издательство «Наука» - 1968г.
2. «Дидактические материалы по алгебре и началу анализа.» – ЭЛ. И. Звавич и др. Издательство «Дрофа» 1999г.
3. «Задачи по математике для внеклассных занятий», И. Х. Сивашенский и др. Издательство «Просвещение» - 1968г.
4. «Алгебраический тренажёр» А. Г. Мерзляк и др. Издательство «Илекса» Москва – 1998г.
5. «Материалы ЕГЭ последних лет».

**Спасибо за
внимание.**