

# Решение уравнений

Математика, 5 класс

Преподаватель математики и информатики  
ГБОУ СПО РО «Константиновский педагогический  
колледж»  
Алексей Юлия Вадимовна

Рассмотрим алгоритм  
решения уравнений на  
одном из примеров

$$64 + 36 : (x \cdot 3 - 15) = 70$$

1. Рассмотрим уравнение и определим порядок действий

$$64^4 + 36^3 : (x^1 \cdot 3^2 - 15) = 70$$

2. Определим последнее действие и соответствующие компоненты

$$64 + 36 : (x \cdot 3 - 15) = 70$$

слагаемое

слагаемое

сумма

3. Определим неизвестный компонент и правило его нахождения

$$64 + \overset{4}{36} : (x \cdot 3 - 15) = 70$$

слагаемое

Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое.

4. В соответствии с правилом,  
выполняем вычисления

$$64 + 36 : (x \cdot 3 - 15) = 70$$

$$36 : (x \cdot 3 - 15) = 70 - 64$$

$$36 : (x \cdot 3 - 15) = 6$$

5. Рассмотрим получившееся уравнение и выполним те же действия

$$36 : (x \cdot 3 - 15) = 6$$

1. Рассмотрим уравнение и определим порядок действий

2. Определим последнее действие и соответствующие компоненты

$$\textcircled{36} : \overset{3}{\textcircled{(x \cdot 3 - 15)}} = 6$$

делимое

делитель

частное



3. Определим неизвестный компонент и правило его нахождения

$$36 : (x \cdot 3 - 15) = 6$$

делитель

Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое разделить на частное.

4. В соответствии с правилом,  
выполняем вычисления

$$36 : (x \cdot 3 - 15) = 6$$

$$x \cdot 3 - 15 = 36 : 6$$

$$x \cdot 3 - 15 = 6$$

Повторяем алгоритм еще раз с получившимся уравнением.

1. Рассмотрим уравнение и  
определим порядок действий

$$x \cdot 3 - 15 = 6$$

1      2

2. Определим последнее действие и соответствующие компоненты

$$\overset{2}{(x \cdot 3) - 15} = 6$$

уменьшаемое    вычитаемое    разность

### 3. Определим неизвестный компонент и правило его нахождения

$$\textcircled{x \cdot 3} - 15 = 6$$

уменьшаемое

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое.

4. В соответствии с правилом,  
выполняем вычисления

$$x \cdot 3 - 15 = 6$$

$$x \cdot 3 = 6 + 15$$

$$x \cdot 3 = 21$$

На этот раз получено простое уравнение, первый этап (расстановка действий) пропускаем, решаем уравнение по упрощенному алгоритму.

## 2. Определим соответствующие компоненты действия

$$\textcircled{x} \cdot \textcircled{3} = 21$$

множитель    множитель    произведение

3. Определим неизвестный компонент и правило его нахождения

$$\text{X} \cdot 3 = 21$$

множитель

Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель.



4. В соответствии с правилом,  
выполняем вычисления

$$x \cdot 3 = 21$$

$$x = 21 : 3$$

$$x = 7$$

ОТВЕТ: 7

УРАВНЕНИЕ РЕШЕНО

1. Рассмотрим уравнение и определим порядок действий.

2. Определим последнее действие и соответствующие компоненты.

3. Определим неизвестный компонент и правило его нахождения.

4. В соответствии с правилом, выполняем вычисления.

**АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ**