




Сфера и шар.




МОУ СОШ №256 г.Фокино.



O – центр сферы и шара
R – радиус сферы и шара

Сферой называется поверхность, которая состоит из всех точек пространства, находящихся на заданном расстоянии от данной точки. Эта точка называется **центром**, а заданное расстояние – **радиусом** сферы, или шара – тела, ограниченного сферой. **Шар** состоит из всех точек пространства, находящихся на расстоянии не более заданного от данной точки.





OA – радиус
BC – диаметр
B и C – диаметрально
противоположные точки

Отрезок, соединяющий центр шара с точкой на его поверхности, называется **радиусом шара**. Отрезок, соединяющий две точки на поверхности шара и проходящий через центр, называется **диаметром шара**, а концы этого отрезка – **диаметрально противоположными точками шара**.

?

**Чему равно
расстояние между
диаметрально
противоположными
точками шара, если
известна
удаленность точки,
лежащей на
поверхности шара от
центра?**







**Шар можно
рассматривать как
тело, полученное от
вращения полукруга
вокруг диаметра как
оси.**

?

Пусть известна
площадь
полукруга.
Найдите радиус
шара, который
получается
вращением этого
полукруга вокруг
диаметра.



Теорема. Любое сечение шара плоскостью есть круг. Перпендикуляр, опущенный из центра шара на секущую плоскость, попадает в центр этого круга.



Дано:

шар (O, R)

α – секущая плоскость

$OO_1 \perp \alpha$


Доказать:

сечение – круг

O_1 – центр круга

Доказательство:

Рассмотрим прямоугольный треугольник, вершинами которого являются центр шара, основание перпендикуляра, опущенного из центра на плоскость, и произвольная точка сечения.



$$OA = R \quad OO_1 = d$$


$$AO^2 = OO_1^2 + AO_1^2$$

$$R^2 = d^2 + AO_1^2$$

$$AO_1 = \sqrt{R^2 - d^2}$$

$$AO_1 = \text{const}$$

Следствие. Если известны радиус шара и расстояние от центра шара до плоскости сечения, то радиус сечения вычисляется по теореме Пифагора.



$$O_1K^2 + d^2 = R^2$$


$$O_1K = \sqrt{R^2 - d^2} = r$$

r – радиус сечения




Пусть известны диаметр шара и расстояние от центра шара до секущей плоскости. Найдите радиус круга, получившегося сечения.

$$r = 10$$



Чем меньше расстояние от центра шара до плоскости, тем больше радиус сечения.



$$r = \sqrt{R^2 - d^2}$$


$$d_1 = OO_1$$

$$d_2 = OO_2$$


$$r_1 > r_2 \quad \longrightarrow \quad d_1 < d_2$$



В шаре радиуса пять проведен диаметр и два сечения, перпендикулярных этому диаметру. Одно из сечений находится на расстоянии три от центра шара, а второе – на таком же расстоянии от ближайшего конца диаметра. Отметьте то сечение, радиус которого больше.



На сфере радиуса R взяты три точки, являющиеся вершинами правильного треугольника со стороной a . На каком расстоянии от центра сферы расположена плоскость, проходящая через эти три точки?



Задача.

Дано:

сфера (O, R)

A, B, C – точки на сфере

$$AB = BC = AC = a$$


Найти:

$$d(O, (ABC))$$



Решение:

Рассмотрим пирамиду с вершиной в центре шара и основанием – данным треугольником.



OH – высота пирамиды

$$OA = OB = OC = R$$



*H – центр описанной
окружности*




Решение:

Найдем радиус описанной окружности, а затем рассмотрим один из треугольников, образованных радиусом, боковым ребром пирамиды и высотой. Найдем высоту по теореме Пифагора.

BK – высота в $\triangle ABC$,

$$BK = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$


$$r = \frac{2}{3} BK = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{3} a$$



$$d = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{3}}$$

r – радиус описанной окр.







Наибольший радиус сечения получается, когда плоскость проходит через центр шара. Круг, получаемый в этом случае, называется **большим кругом**. Большой круг делит шар на два **полушара**.



В шаре, радиус которого известен, проведены два больших круга. Какова длина их общего отрезка?



Плоскость и прямая, касательные к сфере.





α – касательная плоскость
 $OA \perp \alpha$

Плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, называется касательной плоскостью. Касательная плоскость перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания.



Пусть шар, радиус которого известен, лежит на горизонтальной плоскости. В этой плоскости через точку касания и точку B проведен отрезок, длина которого известна. Чему равно расстояние от центра шара до противоположного конца отрезка?






Прямая называется **касательной**, если она имеет со сферой ровно одну общую точку. Такая прямая перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания. Через любую точку сферы можно провести бесчисленное множество касательных прямых.



Дан шар, радиус которого известен. Вне шара взята точка, и через нее проведена касательная к шару. Длина отрезка касательной от точки вне шара до точки касания также известна. На каком расстоянии от центра шара расположена внешняя точка?



4

Стороны треугольника 13см,
14см и 15см. Найти расстояние
от плоскости треугольника до
центра шара, касающегося
сторон треугольника. Радиус
шара равен 5 см.

Задача.

Дано:


$$AB = 15\text{см}$$

$$AC = 14\text{см}$$


$$BC = 13\text{см}$$

Найти:

$$d(O, FDC)$$



Решение:



Окружность (O_1, r) вписана
в $\triangle ABC$.

Сечение сферы, проходящее через точки касания, - это вписанная в треугольник ABC окружность.



Решение:

Вычислим радиус окружности, вписанной в треугольник.


$$S = \sqrt{p \cdot (p - a)(p - b)(p - c)}$$

$$p = \frac{14 + 15 + 13}{2} = 21$$

$$S = 84$$


$$S = r \cdot p$$

$$r = \frac{S}{p} = \frac{84}{21} = 4$$



Решение:

*Зная радиус сечения и радиус шара, найдем
искомое расстояние.*



Из $\triangle OO_1K$:

$$R^2 = r^2 + d^2$$


$$d = \sqrt{R^2 - r^2} = 3$$

$$d(O, ABC) = 3 \text{ см}$$







Через точку на сфере, радиус которой задан, проведен большой круг и сечение, пересекающее плоскость большого круга под углом шестьдесят градусов. Найдите площадь сечения.




Взаимное расположение двух шаров.



Если два шара или сферы имеют только одну общую точку, то говорят, что они касаются. Их общая касательная плоскость перпендикулярна линии центров (прямой, соединяющей центры обоих шаров).



Внешнее касание:
 $O_1O_2 = R_1 + R_2$





Внутреннее касание:
 $O_1O_2 = R_1 - R_2$

**Касание шаров
может быть
внутренним и
внешним.**

?

Расстояние между центрами двух касающихся шаров равно пяти, а радиус одного из шаров равен трем. Найдите те значения, которые может принимать радиус второго шара.







Две сферы пересекаются **по окружности**.
Линия центров перпендикулярна плоскости этой окружности и проходит через ее центр.

?


Две сферы одного радиуса, равного пяти, пересекаются, а их центры находятся на расстоянии восьми. Найдите радиус окружности, по которой сферы пересекаются. Для этого необходимо рассмотреть сечение, проходящее через центры сфер.



Вписанная и описанная сферы.



Сфера, описанная
около пирамиды $SABCD$






Вписанная призма




Сфера (шар)
называется
описанной около
многогранника,
если все вершины
многогранника
лежат на сфере.



**Какой
четыреугольник
может лежать в
основании
пирамиды,
вписанной в сферу?**




Ромб



Квадрат




Прямоугольная трапеция



Сфера называется **вписанной** в многогранник, в частности, в пирамиду, если она касается всех граней этого многогранника (пирамиды).

В основании треугольной пирамиды лежит равнобедренный треугольник, основание и боковые стороны известны. Все боковые ребра пирамиды равны 13. Найти радиусы описанного и вписанного шаров.

Задача.



Дано: $AB = 8$

$$AC = CB = 4\sqrt{5}$$

$$SA = SB = SC = 13$$

Найти:

r (вписанного шара)

R (описанного шара)




Решение:

I этап.

Нахождение радиуса вписанного шара.


1) Центр описанного шара удален от всех вершин пирамиды на одинаковое расстояние, равно радиусу шара, и в частности, от вершин треугольника ABC .

Поэтому он лежит на основании окружности перпендикуляре к плоскости основания этого треугольника, который восстановлен из центра описанной окружности. В данном случае этот перпендикуляр совпадает с высотой пирамиды, поскольку ее боковые ребра равны.



Решение:

2) Вычислим радиус описанной около основания окружности.



$$CK = \sqrt{(4\sqrt{5})^2 - 4^2} = 8$$

Из $\triangle AHK$:


$$HK = CK - R_1 = 8 - R_1$$

$$R_1 = 5$$



Решение:

3) Найдем высоту пирамиды.




Из $\triangle SAH$:

$$SH = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$$



Решение:

4) Радиус описанного шара найдем из треугольника, образованного радиусом шара и частью высоты, прилежащей к основанию пирамиды.



Из $\triangle AHO$:

$$OH = 12 - R$$

$$R^2 = 5^2 + (12 - R)^2$$

$$R^2 = 25 + 144 + R^2 - 24R$$


$$R = \frac{169}{24} = 7 \frac{1}{24}$$



Решение:

II этап.

Нахождение радиуса вписанного шара.




Соединим центр вписанного шара со всеми вершинами пирамиды, тем самым $OSAB$, $OSBC$, $OSAC$ и $OABC$ разделим ее на несколько меньших пирамид. В данном случае их четыре. Высоты всех пирамид одинаковы и равны радиусу вписанного шара, а основания – это грани исходной пирамиды.



Решение:

1) Найдем площадь каждой грани пирамиды и ее полную поверхность.



$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CK = 32$$

$$S_{SBC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot SL = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{149}$$

$$S_{SAC} = S_{SBC} = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{149}$$


$$S_{SAB} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot SK = 4\sqrt{153}$$

$$S_{\text{полн}} = 32 + 4\sqrt{5} \cdot \sqrt{149} + 4\sqrt{153}$$



Решение:

2) Вычислим объем пирамиды и радиус вписанного шара.




$$SH = 12 \quad S_{ABC} = 32$$

$$V = \frac{1}{3} SH \cdot S_{ABC} = 128$$

$$r = \frac{3V}{S_{\text{полн}}} = \frac{96}{8 + \sqrt{745} + \sqrt{153}}$$

$$R_{\text{опис}} = 7 \frac{1}{24} \quad r = \frac{96}{8 + \sqrt{745} + \sqrt{153}}$$





Второй способ
вычисления радиуса
вписанной сферы
основан на том, что
центр шара,
вписанного в
двугранный угол,
равноудален от его
сторон, и,
следовательно, лежит
на **биссекторной**
плоскости.

Сторона основания правильной
четырёхугольной пирамиды равна
6, а угол между основанием и
боковой гранью равен 60° .


Определить радиус вписанной
сферы.

Задача.

Дано: $SABCD$ – правильная
четырёхугольная
пирамида

$$AB = 6 \quad \angle BSC = 60^\circ$$


Найти:
 r вписанного шара



Решение:

Проведем сечение через вершину пирамиды и середины двух противоположных сторон основания.

- Отрезок, соединяющий центр сферы с серединой стороны основания, делит пополам двугранный угол при основании.*




$LK = AB = 6; \quad \angle LKS = 60^\circ$
 OK – биссектриса $\angle LKS$

$$\angle HKO = 30^\circ$$



Решение:

Рассмотрим треугольник, полученный в сечении, и найдем искомый радиус из тригонометрических соотношений.



$$HK = \frac{1}{2}LK = 3$$

Из $\triangle OHK$:

$$r = HK \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \sqrt{3}$$

Радиус вписанного шара $\sqrt{3}$

