

2. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

2.1. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Система m линейных уравнений с n переменными в общем случае имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$



Где числа a_{ij} ($i = 1, 2 \dots m, \quad j = 1, 2 \dots n$)

называются коэффициентами при переменных;

b_i - свободные члены;

x_j - переменные.

Иначе систему (1) можно записать:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, 2 \dots m)$$

**Решением системы линейных
уравнений
называется такая совокупность чисел
 k_1, k_2, \dots, k_n
при подстановке которых каждое
уравнение обращается в верное
равенство.**

Система называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение.

Система называется определенной, если она имеет ровно одно решение.

**Система называется неопределенной,
если
она имеет более одного решения.**

Система называется несовместной, если она не имеет решений.

Запишем систему уравнений в матричной форме.

Обозначим:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

– матрица коэффициентов при переменных
или матрица системы

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \square \\ x_n \end{pmatrix}$$

-матрица-столбец переменных

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \square \\ b_m \end{pmatrix}$$

**-матрица-столбец
членов**

свободных

Рассмотрим произведение:

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

- матрица-столбец, элементами которой являются левые части системы (1).

Тогда в матричной форме систему (1) можно записать:

$$AX=B$$