

Giacomo Puccini  
Giacomo Puccini

Giacomo Puccini  
Giacomo Puccini  
Giacomo Puccini  
Giacomo Puccini

На вопрос,  
как ученикам преуспеть,  
Аристотель ответил:  
«Догонять тех, кто впереди,  
и не ждать тех, кто позади».

Опр.: Уравнение вида

$$nx+my=c$$

называется  
линейным уравнением  
с двумя переменными

Опр.: Запись вида

$$\left\{ \begin{array}{l} n_1x + m_1y = c_1 \\ n_2x + m_2y = c_2 \end{array} \right.$$

называют  
системой линейных уравнений.

# Способы решения систем линейных уравнений.

## 1. Графический

*a)* В КАЖДОМ уравнении  
выразить  $y$  через  $x$ , то есть  
привести к виду  $y = kx + b$

*б)* На СК построить графики данных  
функций

в) Находим КООРДИНАТЫ точки  
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ графиков функций  
(показать на СК пунктиром)

Пример:

$$\begin{cases} 3y - 15x - 1 = 2 \\ 2x + 2y + 10 = 0 \end{cases} \begin{cases} 3y = 15x + 3 \\ 2y = -10 - 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3y}{2} = \frac{15x + 3}{2} \\ \frac{2y}{2} = \frac{-10 - 2x}{2} \end{cases} \begin{cases} y = \frac{15x}{2} + \frac{3}{2} \\ y = \frac{-10}{2} - \frac{2x}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 5x + 1 \\ y = -5 - x \end{cases}$$


Рассм. функции


$$y = 5x + 1$$

$x$	0	1
$y$	1	6

$$y = -5 - x$$

$x$	0	-5
$y$	-5	0





**Ответ: (-1; -4)**

**2. Аналитический (с помощью алгебраических преобразований)**

*a) Метод подстановки . Алгоритм:*

1) Из какого-либо уравнения  
ВЫРАЗИТЬ ОДНУ переменную  
ЧЕРЕЗ другую.

2) Подставить ПОЛУЧЕННОЕ  
выражение для переменной в  
*другое* уравнение и решить его

**3) Сделать подстановку найденного значения переменной и вычислить значение второй переменной**

**4) Записать ответ.**

**Пример:**

$$\left[ \begin{array}{l} y - 2x = 4, \\ 7x - y = 1; \end{array} \right. \quad \left[ \begin{array}{l} y = 2x + 4, \\ 7x - y = 1; \end{array} \right.$$

$$\left[ \begin{array}{l} y = 2x + 4, \\ 7x - (2x + 4) = 1; \end{array} \right. \quad \left[ \begin{array}{l} y = 2x + 4, \\ 5x = 5; \end{array} \right.$$

$$\left[ \begin{array}{l} y = 2x + 4, \\ x = 1; \end{array} \right. \quad \left[ \begin{array}{l} y = 2 \cdot 1 + 4, \\ x = 1; \end{array} \right. \quad \left[ \begin{array}{l} y = 6, \\ x = 1. \end{array} \right.$$

Ответ: (1; 6)

## **б) Метод сложения. Алгоритм:**

- 1) Преобразовать уравнения ТАК, чтобы соответствующие коэффициенты были противоположными числами**
- 2) Соответственно СЛОЖИТЬ ЧАСТИ уравнений**
- 3) К полученному уравнению ДОБАВИТЬ одно из уравнений системы, которое попроще**

**4) Решив уравнение с одной переменной, подставляем найденное значение во второе уравнение для определения второй переменной**

**5) Записать ответ.**

**Пример:**

$$\left[ \begin{array}{l} 7x+2y=1, \\ 17x+6y=-9; \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} -21x-6y=-3, \\ 17x+6y=-9; \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} -4x = -12, \\ 7x+2y=1; \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} x=3, \\ 7x+2y=1; \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} x=3, \\ 7\cdot 3+2y=1; \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} x=3, \\ y=-10. \end{array} \right. \quad \text{Ответ: } (3; -10)$$

*Сильное желание чему-то научиться —  
это уже 50% успеха.*

*Дейл Карнеги (американский педагог, психолог, писатель)*