

# Степенные ряды

Лекции 12, 13, 14

# Функциональные ряды

Ряд, члены которого являются функциями, называется *функциональным* и обозначается

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

Если при  $x = x_0$  ряд сходится, то  $x_0$  называется точкой сходимости функционального ряда.

**Определение.** Множество значений  $x$ , для которых функциональный ряд сходится, называется областью сходимости этого ряда.

# Пример функционального ряда

Рассмотрим геометрическую прогрессию со знаменателем  $x$ :

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$$

Геометрическая прогрессия сходится, если ее знаменатель  $|x| < 1$ . Тогда она имеет сумму  $S = \frac{1}{1-x}$ , которая очевидно является функцией от  $x$ .

# Степенные ряды

**Определение.** Ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

называется степенным по степеням  $x$ .

Ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots + a_n (x - x_0)^n + \dots$$

является степенным по степеням  $(x - x_0)$

# Интервал сходимости степенного ряда

Для любого степенного ряда существует конечное неотрицательное число  $R$  - радиус сходимости - такое, что если  $R > 0$ , то при  $|x| < R$  ряд сходится, а при  $|x| > R$  расходится.

Интервал  $(-R, R)$  называется интервалом сходимости степенного ряда. Если  $R = +\infty$ , то интервал сходимости представляет собой всю числовую прямую. Если же  $R = 0$ , то степенной ряд сходится лишь в точке  $x=0$ .

# Нахождение интервала сходимости по признаку Даламбера

Составим ряд из абсолютных величин членов степенного ряда и найдем интервал, в котором он будет сходиться, Тогда в этом интервале данный степенной ряд будет сходиться абсолютно. Согласно признаку Даламбера , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}| |x|^{n+1}}{|a_n| |x|^n} < 1 \quad , \text{то}$$

степенной ряд абсолютно сходится для всех  $x$ , удовлетворяющих этому условию.

# Продолжение

В этом случае ряд будет сходиться внутри интервала  $(-R, R)$ , где  $R$ -это радиус сходимости ряда:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

За пределами этого интервала ряд будет расходиться, а на концах интервала, где

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}| |x|^{n+1}}{|a_n| |x|^n} = 1, \text{ требуется}$$

дополнительное исследование.

# Примеры

Найти интервал сходимости ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1} .$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x^{n+1}|(2n+1)}{(2n+3) \cdot |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{2n+1}{2n+3} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n} = |x| < 1$$

Следовательно, ряд сходится абсолютно в интервале  $(-1, 1)$ .



# Примеры

Положим  $x = 1$ . Тогда получим числовой ряд  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ . Этот ряд расходится

(сравните его с гармоническим рядом).

Полагая  $x = -1$ , имеем знакочередующийся ряд  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ , который сходится условно в силу теоремы Лейбница.

Итак, степенной ряд сходится в промежутке  $[-1, 1)$ .

# Примеры

Найти интервал сходимости степенного

ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ . Здесь  $u_n = \frac{x^n}{n!} = \frac{x^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}$ ,

$u_{n+1} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{x^{n+1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n(n+1)}$ . Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n(n+1) |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1}$$

# Продолжение

$$= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = |x| \cdot 0 = 0 \quad .$$

Но  $0 < 1$  всегда, т.е. независимо от  $x$ . Это означает, что степенной ряд сходится независимо от  $x$ , т.е. на всей числовой прямой.

Итак, интервал сходимости ряда - это промежуток  $(-\infty, \infty)$ .

# Пример

Найти интервал сходимости ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n (n+1) |x|}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)$$

Этот предел может быть меньше единицы, если только  $x=0$  (иначе он будет равен бесконечности). Это означает, что степенной ряд сходится лишь в точке  $x=0$ .

# Свойства степенных рядов. Непрерывность суммы ряда

## 1. Сумма степенного ряда

$$S(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

является непрерывной функцией в каждой точке интервала сходимости этого ряда.

Например,

$$S(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$$

непрерывна, если  $|x| < 1$ .

# Почленное дифференцирование

2. Ряд, полученный почленным дифференцированием степенного ряда, является степенным рядом с тем же интервалом сходимости, что и данный ряд, причем :если

$$S(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots ,$$

ТО

$$S'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

# Почленное интегрирование

3. Степенной ряд можно почленно интегрировать на любом промежутке, целиком входящем в интервал сходимости степенного ряда, при этом

$$\int_{\alpha}^{\beta} S(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} a_0 dx + \int_{\alpha}^{\beta} a_1 x dx + \dots + \int_{\alpha}^{\beta} a_n x^n dx + \dots$$

где  $(\alpha, \beta) \subset (-R, R)$  .

# Разложение функций в степенные ряды



# Определения

**Определение.** Если бесконечно дифференцируемая функция является суммой степенного ряда, то говорят, что она разлагается в степенной ряд .

**Опр.** Рядом Тейлора функции  $f(x)$  называется ряд, коэффициенты которого определяются

по формулам  $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$  , т.е. ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \text{или} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n .$$

# Степенной ряд как ряд Тейлора

**Теорема.** Если в некоторой окрестности точки  $x_0$

$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots$ ,  
то ряд справа есть ее ряд Тейлора.

*Короче:* если функция представлена в виде степенного ряда, то этот ряд является ее рядом Тейлора.

Представление функции ее рядом Тейлора единственно.

# Формула Тейлора

Рассмотрим  $n$ -ю частичную сумму ряда Тейлора:

$$S_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Этот многочлен называется  
многочленом Тейлора функции  $f(x)$ .

Разность  $R_n(x) = f(x) - S_n(x)$  называется  
остаточным членом ряда Тейлора.

# Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Остаточный член в форме Лагранжа имеет вид:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \text{ где } c \in (x_0, x)$$

Тогда

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

называется формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

# Условия сходимости ряда Тейлора к функции $y=f(x)$

*Для того чтобы функцию можно было разложить в ряд Тейлора на интервале  $(-R, R)$ , необходимо и достаточно, чтобы функция на этом интервале имела производные всех порядков и чтобы остаточный член формулы Тейлора стремился к нулю при всех  $x \in (-R, R)$  при  $n \rightarrow \infty$*

# Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора

*Если функция  $f(x)$  на интервале  $(-R, R)$  бесконечно дифференцируема и ее производные равномерно ограничены в совокупности, т. е. существует такая константа  $M$ , что для всех  $x \in (-R, R)$  выполняется условие  $|f^{(n)}(x)| \leq M$  при  $n=0, 1, 2, \dots$ , то функцию можно разложить в ряд Тейлора на этом интервале.*

# Разложение $f(x) = e^x$

Все производные этой функции совпадают с самой функцией, а в точке  $x=0$  они равны 1.

Составим для функции формально ряд

Маклорена:

$$1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Этот ряд, очевидно, сходится на всей числовой оси. Но все производные функции равномерно ограничены, т. к.  $f^{(n+1)}(c) = e^c < e^R$ , где  $R$ -любое число из интервала сходимости. Поэтому этот ряд сходится именно к функции  $e^x$ .

# Разложение в ряд синуса.

Вычислим производные синуса:

$$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f(0) = 0,$$

$$f'(0) = 1,$$

$$f''(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f''(0) = 0$$

$$f'''(0) = -1$$

$$f'''(x) = \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f^{(4)}(0) = 0$$

.....

.....

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right).$$

$$f^{(2n-1)}(0) = (-1)^{n-1}$$

.....



# Продолжение

Ясно, что все производные синуса не превосходят по модулю единицу. Так что запишем ряд, который будет разложением синуса:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

при этом видно, что этот ряд сходится на всей числовой оси.

# Разложения некоторых функций в ряд Тейлора

При решении задач удобно пользоваться разложениями:

$$1. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, \infty)$$

$$2. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$3. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

# Продолжение

Геометрическую прогрессию мы получили выше:

$$4. \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1$$

Интегрируя по  $x$  обе части равенства, получим логарифмический ряд:

$$5. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n},$$

# Биномиальный ряд

$$6. \quad \operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

$$7. \quad (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \\ + \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + \dots = \\ = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n$$

**Биномиальный, логарифмический ряды и ряд для арктангенса сходятся в интервале  $(-1,1)$ .**

# Пример

Разложить в ряд Тейлора по степеням  $x$  функцию

$$f(x) = \sqrt[3]{27-x}$$

**Решение.** Зная разложение функции в биномиальный ряд, сходящийся на интервале  $(-1, 1)$ , преобразуем данную функцию так, чтобы воспользоваться биномиальным рядом.

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{27-x} &= \sqrt[3]{27\left(1-\frac{x}{27}\right)} = \sqrt[3]{1-\frac{x}{27}} = \left(1-\frac{x}{27}\right)^{\frac{1}{3}} \\ \left(1-\frac{x}{27}\right)^{\frac{1}{3}} &= \left[1 + \frac{1}{3}\left(-\frac{x}{27}\right) + \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\left(-\frac{x}{27}\right)^2 + \dots + \right. \\ &\left. + \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)\left(\frac{1}{3}-2\right)\dots\left(\frac{1}{3}-n+1\right)}{n!}\left(-\frac{x}{27}\right)^n + \dots\right], \text{ где } \left|\frac{x}{27}\right| < 1\end{aligned}$$

# *Применение степенных рядов*

# Приближенное вычисление интегралов

Разложения 1–7 позволяют, используя соответствующее разложение, вычислять приближенно значения функций, интегралы, приближенно интегрировать дифференциальные уравнения.

*Пример*. С помощью степенного ряда вычислить с точностью до 0,0001

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

# Решение

Разложим подынтегральную функцию в степенной ряд:

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{(x^2)^2}{2!} - \frac{(x^2)^3}{3!} + \frac{(x^2)^4}{4!} + \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \int_0^1 (1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots) dx = \\ &= \int_0^1 dx - \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 \frac{x^4}{2!} dx - \int_0^1 \frac{x^6}{3!} dx + \int_0^1 \frac{x^8}{4!} dx - \dots = \\ &= x \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{x^5}{2 \cdot 5} \Big|_0^1 - \frac{x^7}{6 \cdot 7} \Big|_0^1 + \frac{x^9}{24 \cdot 9} \Big|_0^1 - \dots = \end{aligned}$$



# Продолжение

$$= x \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{x^5}{2 \cdot 5} \Big|_0^1 - \frac{x^7}{6 \cdot 7} \Big|_0^1 + \frac{x^9}{24 \cdot 9} \Big|_0^1 - \dots =$$
$$= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \dots$$

Так как получившийся ряд является знакочередующимся, то сумма знакочередующегося ряда не превосходит первого члена такого ряда. Ясно, что часть ряда, которую в задаче следует отбросить, также является знакочередующимся рядом и его сумма не превзойдет модуля первого отброшенного члена ряда. Таким образом, первый отброшенный член ряда должен быть меньше заданной погрешности, т.е. 0,0001.

# Продолжение

Вычислив еще несколько членов ряда

$$-\frac{1}{1320}, -\frac{1}{9360}, -\frac{1}{75600}$$

ВИДИМ, ЧТО  $\frac{1}{75600} \approx 0,0001$

Отбросив этот и следующие за ним члены ряда, получим:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} + \frac{1}{9360} = 0,7468$$

# Приближенное вычисление значений функций

Вычислить  $\sqrt[3]{10}$  с точностью до 0,001.

Преобразуем

$$\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{8 \frac{10}{8}} = 2 \sqrt[3]{1 + \frac{2}{8}} = 2 \sqrt[3]{1 + 0,25} = 2(1 + 0.25)^{\frac{1}{3}}$$

Воспользуемся биномиальным рядом при  $x=0,25$  и  $m = \frac{1}{3}$ .

# Продолжение

Получим

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{10} &\approx 2\left(1 + \frac{1}{3}0,25 + \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right)}{2!}0,25^2 + \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right)\left(\frac{1}{3} - 2\right)}{3!}0,25^3\right) \approx \\ &\approx 2(1 + 0,0833 - 0,0069 + 0,0009) \approx 2(1 + 0,0833 - 0,0069) \approx \\ &\approx 2,1528 \approx 2,153.\end{aligned}$$