

**Теорема (формула дополнения для гамма-функции):**

$$\text{при } x \in R \setminus Z \quad \Gamma(1 - x) * \Gamma(x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

**Следствие (интеграл Эйлера-Пуассона):**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

**Определение (второй интеграл Эйлера):**

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt, \quad \alpha > 0, \quad \beta > 0.$$

**Утверждение:**

$$B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha)$$

$$B(p, q+1) = \frac{q}{p} B(p, q) - \frac{q}{p} B(p, q+1)$$

$$B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q)$$

**Теорема (связь бета и гамма-функций):**

$$\text{при } \alpha > 0, \quad \beta > 0 \quad B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) * \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

**Пример:**

Вычислим  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^a x \cos^b x dx.$

**Теорема (формула Стирлинга):**

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \left(1 + \frac{\alpha}{\sqrt{n}}\right), \quad |\alpha| < 1$$