

**Теория вероятностей и математическая статистика**

**Основные понятия. Классическое  
определение вероятности**

**доцент кафедры высшей алгебры, элементарной математики и методики  
преподавания математики, кандидат педагогических наук, доцент,**

**Солдатенков Роман Михайлович**

# Содержание

- Понятие события
- Достоверное и невозможное события
- Противоположные события
- Несовместные события
- Полная группа событий
- Классическое определение вероятности
- Следствия из классического определения вероятности

# Событие

Под **событием** мы будем понимать всякое явление, которое происходит или не происходит.

# Достоверное и невозможное события

Событие называют **достоверным**, если оно непременно должно произойти.

Событие называют **невозможным**, если оно заведомо не наступит.

# Противоположные события

Пусть  $A$  – некоторое событие. Под событием, **противоположным** ему, будем понимать событие, состоящее в том, что  $A$  не наступило.

Его обозначают  $\bar{A}$ .

# Несовместные события

События  $A$  и  $B$  называют **несовместными**, если наступление одного из них исключает возможность наступления другого.

# Полная группа событий

Рассмотрим некоторую совокупность событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$ . Эти события принято называть **единственно возможными**, если в результате каждого испытания хотя бы одно из них **наверное наступит**. Говорят также, что рассматриваемые события образуют **полную группу событий**.



# Полная группа событий

Рассмотрим систему конечного числа событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$  относительно которой сделаем следующие предположения:

1. Эти события попарно несовместны; иначе говоря, для любых двух событий  $A_i$  и  $A_k$  ( $i, k = 1, 2, \dots, n, i \neq k$ ) появление одного из них исключает появление другого.
2. События  $A_1, A_2, \dots, A_n$  единственно возможны, т. е. какое-либо одно из них непременно должно наступить.
3. События  $A_1, A_2, \dots, A_n$  равновозможны. Это означает, что не существует никаких объективных причин, вследствие которых одно из них должно бы наступать чаще, чем какое-либо другое.

Пусть имеется событие  $A$ , которое наступает при появлении некоторых из наших «элементарных» событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$  и не наступает при появлении других. Мы будем говорить в таком случае, что те из «элементарных» событий  $A_i$ , при наступлении которых наступает также событие  $A$ , благоприятствуют событию  $A$ .



# Классическое определение вероятности

Допустим, что из общего числа  $n$  рассматриваемых событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$  событию  $A$  благоприятствует  $m$  из них. Тогда вероятностью события  $A$  называется отношение числа событий, благоприятствующих событию  $A$ , к общему числу всех равновозможных событий. Если, как это принято, обозначить вероятность события  $A$  через  $P(A)$ , то мы получаем, по определению,

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

# Следствия из классического определения вероятности

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Вероятность достоверного события равна 1,  
т.е.

$$P(E) = 1$$

Вероятность невозможного события равна 0,  
т.е.

$$P(U) = 0$$