

# **Геометричні місця точок**


**Властивість точки,  
рівновіддаленої від вершин  
многокутника**

**Творчий проект Фотенюк Надії**

# Що ж таке геометричне місце точок ?

На площині ГМТ визначається так:


**Геометричним місцем точок** називається **фігура**, що складається з усіх точок площини, які мають певну властивість.




Геометричне місце точок, кожна з яких віддалена від даної точки  $O$  на відстань, рівну  $a$ , є коло радіуса  $a$  з центром у точці  $O$ .

Геометричне місце точок, відстань яких від даної точки  $O$  не перевищує довжини  $a$  даного відрізка, є круг з центром у точці  $O$  радіуса  $a$ .

Геометричне місце точок, кожна з яких рівновіддалена від двох даних точок  $A$  і  $B$ , є пряма  $l$ , яка проходить через середину  $C$  відрізка  $AB$  перпендикулярно до нього.



Геометричне місце точок, кожна з яких рівновіддалена від трьох неколінеарних точок  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , є точка  $O$  – центр кола, описаного навколо трикутника  $ABC$ .



У просторі ГМТ визначається так:


*Геометричним місцем точок у просторі називається деяка фігура, що складається з усіх об'єктів простору, положення яких задовольняє одній або кільком певним умовам.*

Геометричне місце точок, кожна з яких віддалена від даної точки  $O$  на відстань, рівну  $a$ , є сфера радіуса  $a$  з центром у точці  $O$ .




Геометричне місце точок, відстань яких від даної точки  $O$  не перевищує довжини  $a$  даного відрізка, є куля з центром у точці  $O$  радіуса  $a$ .

Геометричне місце точок, кожна з яких рівновіддалена від двох даних точок  $A$  і  $B$ , є площина, яка проходить через середину  $C$  відрізка  $AB$  перпендикулярно до нього.




Геометричне місце точок, кожна з яких рівновіддалена від трьох неколінеарних точок  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , є пряма, яка проходить через точку  $O$  – центр кола, описаного навколо трикутника  $ABC$ , перпендикулярно до площини трикутника  $ABC$ .



**Опорна задача (про точку, рівновіддалену від усіх вершин многокутника)**  
Якщо точка поза площиною многокутника рівновіддалена від усіх його вершин, то основою перпендикуляра, проведеного з даної точки до площини многокутника, є центр кола, описаного навколо многокутника.

Опустимо з точки  $P$  перпендикуляр  $PO$   
до площини  $ABC$ . Відрізки  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$   
проекції рівних похилих  $PA=PB=PC$ .  
Тому  $OA=OB=OC$ .

Точка  $O$  площини  $ABC$  рівновіддалена  
від вершин трикутника (многокутника),  
тобто є центром кола, описаного  
навколо нього,  
що й треба було довести






**Обернена задача (про точку, рівновіддалену від усіх вершин многокутника)**  
Якщо через центр кола, описаного навколо многокутника, проведено пряму, перпендикулярну до площини многокутника, то точки даної прямої рівновіддалені від усіх вершин многокутника.

РО- перпендикуляр до площини ABC.

Відрізки OA, OB, OC – радіуси описаного кола, тому  $OA=OB=OC$ .

Прямокутні трикутники  
POA, POB, POC рівні  
за двома катетами.

Звідси  $AP=BP=CP$  як  
відповідні сторони  
Точка P рівновіддалена  
від вершин трикутника (многокутника),  
що й треба було довести



**Задача 1.** Катети прямокутного трикутника дорівнюють 6 см і 8 см. Точка простору віддалена від кожної вершини трикутника на 13 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини трикутника.

**Дано:**  $\triangle ABC$ ,  $\angle C=90^\circ$ ,  $KO \perp$   
( $ABC$ ),

$AC = 6$  см,  $BC = 8$  см,

$AK=BK=CK= 13$  см

Знайти:  $KO$


### Розв'язання

Перпендикуляр  $KO$  до площини  $ABC$  проектується в центр описаного навколо трикутника кола.

Тому точка  $O$  – середина гіпотенузи  $AO=OB$ .

З  $\triangle ABC$  за теоремою Піфагора маємо

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10(\text{см})$$



**Дано:**  $\triangle ABC$ ,  $\angle C=90^\circ$ ,  $KO \perp$   
(ABC),

$AC = 6$  см,  $BC = 8$  см,

$AK=BK=CK= 13$  см

Знайти:  $KO$

**Розв'язання** (продовження)


$AO=0,5AB=0,5 \cdot 10=5$ (см)

З прямокутного трикутника  $AKO$   
за наслідком з теореми Піфагора

$$KO = \sqrt{AK^2 - AO^2} =$$

$$= \sqrt{13^2 - 5^2} = 12(\text{см})$$

Відповідь: 12 см



**Задача 2.** Точка, рівновіддалена від усіх вершин рівнобедреного трикутника, розміщена на відстані 60 см від площини трикутника. Знайдіть відстані від даної точки до вершин трикутника, якщо його основа дорівнює 48 см, а бічна сторона 40 см.

**Дано:**  $\triangle ABC$ ,  $AB=BC=40\text{см}$ ,  $PO \perp (ABC)$ ,

$AC = 48\text{см}$ ,  $AP=BP=CP$ ,  $PO=60\text{ см}$

Знайти:  $AP$ ,  $BP$ ,  $CP$


**Розв'язання**

Перпендикуляр  $PO$  до площини  $ABC$  проектується в центр описаного навколо трикутника кола.

Для знаходження радіуса описаного кола можна

використати формулу

$$R_{\text{опис.кола}} = \frac{abc}{4S_{\Delta}}$$



**Дано:**  $\triangle ABC$ ,  $AB=BC=40\text{ см}$ ,  $PO \perp (ABC)$ ,

$AC = 48\text{ см}$ ,  $AP=BP=CP$ ,  $PO=60\text{ см}$

Знайти:  $AP$ ,  $BP$ ,  $CP$

**Розв'язання** (продовження)

Площу трикутника легко обчислити за формулою Герона, враховуючи, що  $a=c=40\text{ см}$ ,  $b=48\text{ см}$

$$p=(40+40+48):2=64\text{ (см)}$$

Тому знаходимо


$$S_{\triangle} = \sqrt{64 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 16} = 768(\text{см}^2)$$

$$AO = R = \frac{abc}{4S_{\triangle}} = \frac{40 \cdot 40 \cdot 48}{4 \cdot 768} = 25(\text{см})$$

З  $\triangle APO$  за теоремою Піфагора

$$AP = \sqrt{AO^2 + PO^2} = \sqrt{25^2 + 60^2} = 65(\text{см})$$

$$AP=BP=CP=65\text{ см}$$



**Задача 3.** Точка простору віддалена від усіх вершин квадрата на 40 см. Інша точка віддалена від даної точки і від усіх вершин даного квадрата на 25 см. Знайдіть площу квадрата.


**Дано:**  $ABCD$  - квадрат,  $AP=BP=CP=DP=40\text{ см}$ ,  
 $PO \perp (ABC)$ ,  
 $AK=BK=CK=DK=PK=25\text{ см}$   
Знайти:  $S_{ABCD}$

### Розв'язання

Перпендикуляр  $PO$  до площини  $ABC$  проектується в центр описаного навколо квадрата кола – точку  $O$  перетину діагоналей.

Прямокутні трикутники  $ARO$  та  $AKO$  мають спільний катет  $AO$

Введемо змінну  $x$  для позначення довжини відрізка  $KO$ :  $KO=x$



**Дано:** ABCD - квадрат, AP=BP=CP=DP=40см,  
PO ⊥ (ABC),  
AK=BK=CK=DK=PK=25 см  
Знайти: S<sub>ABCD</sub>

**Розв'язання** (продовження)

За наслідком з теореми Піфагора  
з Δ APO маємо

$$AO^2 = AP^2 - PO^2 = 40^2 - (25 + x)^2$$

Аналогічно з Δ AKO маємо


$$AO^2 = AK^2 - KO^2 = 25^2 - x^2$$

Прирівнявши вирази,  
Знаходимо x

$$40^2 - (25 + x)^2 = 25^2 - x^2,$$

$$1600 - 625 - 50x - x^2 = 625 - x^2,$$

$$1600 - 625 - 625 = 50x,$$



**Дано:** ABCD - квадрат, AP=BP=CP=DP=40см,  
PO ⊥ (ABC),  
AK=BK=CK=DK=PK=25 см  
Знайти: S<sub>ABCD</sub>

**Розв'язання** (продовження)

$$50x = 350, x = 7(\text{см})$$

Обчислимо з Δ AKO катет AO

$$AO = \sqrt{AK^2 - KO^2} = \sqrt{25^2 - 7^2} = 24(\text{см})$$

Тоді

$$AC=BD=2 \cdot AO=2 \cdot 24=48(\text{см})$$

Площа квадрата

дорівнює

$$S_{ABCD} = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{48^2}{2} = 1152(\text{см}^2)$$

