



УРАВНЕНИЯ N-ОЙ СТЕПЕНИ

*Федотова Т.В., учитель математики,
МОУ Увельская СОШ № 1
п.Увельский Челябинская область*





***Большинство жизненных
задач решаются как
алгебраические уравнения:
приведением их к самому
простому виду.***

Толстой Л.Н.




Задачи:

- рассмотреть основные виды уравнений
- познакомиться с различными методами решения уравнений



28.02.2017





Метод решения хорош, если с самого начала мы можем предвидеть – и впоследствии подтвердить это, - что следуя этому методу, мы достигнем цели.

Лейбниц



Методы решения уравнений

- разложение многочлена на множители
- метод введения новой неизвестной
- комбинирование различных методов
- метод неопределенных коэффициентов



Разложение многочлена на множители

Любой многочлен может быть представлен в виде произведения. Самые известные методы разложения многочленов это: вынесение общего множителя, применение формул сокращенного умножения, выделение полного квадрата, группировка, разложение квадратного трехчлена на множители по формуле



$$\underline{2x^5 - 10x^4 + 14x^3 - 10x^2 + 12x = 0}$$

$$2x(x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 6) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 6 = 0$$

$$(x-2)(x^3 - 3x^2 + x - 3) = 0$$

$$(x-2)(x^2 \cdot (x-3) + (x-3)) = 0$$

$$(x-2)(x-3)(x^2 + 1) = 0$$

$$x - 2 = 0 \quad \text{или} \quad x - 3 = 0 \quad \text{или} \quad x^2 + 1 = 0$$

$$x = 2$$

$$x = 3$$

корней нет



Ответ: **0, 2, 3**

Метод введения новой неизвестной

В некоторых случаях путем замены выражения $f(x)$, входящего в многочлен $P_n(x)$, через y можно получить многочлен относительно y , который уже легко разложить на множители. Затем после замены y на $f(x)$ получаем разложение на множители многочлена $P_n(x)$



$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}$$

пусть $x^2 + 2x + 2 = t$

$$\frac{t-1}{t} + \frac{t}{t+1} = \frac{7}{6}$$

умножим обе части уравнения на $6t(t+1)$, где $t \neq 0$, $t \neq -1$

$$6t^2 - 6 = 26t^2 - 7t^2 - 67t = 0$$

$$5t^2 - 7t - 6 = 0$$



$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}$$

1) $x^2 + 2x + 2 = 2$
 $x^2 + 2x = 0$
 $x(x+2) = 0$
 $x = 0$ или $x = -2$

2) $x^2 + 2x + 2 = -0,6$
 $5x^2 + 10x + 13 = 0$
 $D = -169 < 0$
корней нет

Ответ: -2; 0



Метод неопределенных коэффициентов

Суть метода неопределённых коэффициентов состоит в том, что вид сомножителей, на которые разлагается данный многочлен, угадывается, а коэффициенты этих сомножителей (также многочленов) определяются путём перемножения сомножителей и приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях переменной.



$$\underline{x^4 + 4x^3 - 20x^2 + 21x - 16 = 0}$$

$$x^4 + 4x^3 - 20x^2 + 21x - 16 = (x^2 + px + g)(x^2 + bx + c)$$

$$(x^2 + px + g)(x^2 + bx + c) =$$

$$(x^2 - x + 1)(x^2 + 5x - 16) = 0 \quad x^2 + 5x - 16 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1) \quad p + b = 4 \\ \quad \quad D = -3 < 0 \\ c + g + pb = -20 \\ \quad \quad \text{Корней нет} \\ pc + gb = 21 \end{array} \right. \quad \text{или} \quad \left\{ \begin{array}{l} 2) \quad x^2 + 5x - 16 = 0 \\ p = -1, b = 5, c = -16, g = 1. \end{array} \right.$$

$$gc = -16$$

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{89}}{2}$$

$$x_2 = \frac{-5 + \sqrt{89}}{2}$$



Ответ:

$$\frac{-5 \pm \sqrt{89}}{2}$$

Виды уравнений

- квадратные уравнения
- биквадратные уравнения
- возвратные уравнения
- уравнения вида $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)=A$
- уравнения вида:
$$(ax^2 + bx + c)(ax^2 + b_1x + c_1)=Ax^2$$
- уравнения, однородные относительно многочленов



Возвратные уравнения

общий вид :

Алгебраическое уравнение $f(x)=0$ называется возвратным, если у многочлена в левой его части, представленного в каноническом виде, равны коэффициенты членов, равноудаленных от его концов: первого и последнего, второго и предпоследнего и т.д.



Рассмотрим алгоритм
решения возвратных
уравнений четной степени

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$$
$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$$

$$t = x + \frac{1}{x} \qquad t^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$at^2 + bt + c - 2a = 0$$



$$\underline{2x^5 + 5x^4 - 13x^3 - 13x^2 + 5x + 2 = 0}$$

	2	5	-13	-13	5	2
-1	$x - 1 = 0$	или	$2x^4 + 3x^3 - 16x^2 + 3x + 2 = 0$			
	2	3	-16	3	2	0

$$(x-1) \left(2 \left(x^2 + \frac{1}{x} \right) + 3 \left(x + \frac{1}{x} \right) - 16 \right) = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = t, \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$$

$$2t^2 + 3t - 20 = 0$$

$$t_1 = \frac{5}{2}, \quad t_2 = -4$$



$$\underline{2x^5+5x^4-13x^3-13x^2+5x+2=0}$$

$$x+1=0 \quad \text{или} \quad 2x^4+3x^3-16x^2+3x+2=0$$

$$x=-1$$

$$1) 2x^2+5x+2=0$$

$$x_1=2, x_2=0,5$$

$$2) x^2+4x+1=0$$

$$x_3 = -2 + \sqrt{3}$$

$$x_4 = -2 - \sqrt{3}$$



Ответ: 0,5; 2; $-2 \pm \sqrt{3}$

$$(x^2 - x + 1)^4 - 6x^2(x^2 - x + 1)^2 = -5x^2$$

Пусть $(x^2 - x + 1)^2 = a$; $x^2 = b$

$$a^2 - 6ab + 5b^2 = 0$$

$$x^2 - x + 1 = a \quad (a-b) - 5b(a-b) = 0$$

$$(a-b)(a-5b) = 0$$

$$a = b \quad \text{или} \quad a = 5b$$

1) $(x^2 - x + 1)^2 = 1$ 2) $(x^2 - x + 1)^2 = 5x^2$

Ответ: $1; \frac{x^2 \pm \sqrt{5} \pm \sqrt{2 \pm 2\sqrt{5}}}{2} = 5x^2$



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

